

蘑菇

全世界500多种蘑菇的
彩色图鉴



平盖伞类



松乳菇



白毒伞



群伞类



侧耳类



毒蝇鹅膏



墨汁鬼伞



绿头菇



侧耳类



侧耳类



侧耳类



A Dorling Kindersley Book

www.dkchina.com

Original Title: DK Handbook: Mushroom

Copyright © 1998, 2000 Dorling Kindersley Limited, London

Text copyright © 1998, 2000 Thomas Laessle

Chinese Translation © 2008 Anno Domini Media Co. Ltd., Guangzhou

图书在版编目 (CIP) 数据

蘑菇/[丹]莱瑟斯(Laessle, T.)著;董晓黎译.

—北京:中国友谊出版公司,2008.3

(自然珍藏图鉴丛书)

ISBN 978-7-5057-2102-9

书名原文: Mushrooms

I. 蘑... II. ①莱... ②董... III. 食用菌类—图集 IV. S646-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第005180号

书名 蘑菇——自然珍藏图鉴丛书

作者 [丹麦] 托马斯·莱瑟斯

出版 中国友谊出版公司

发行 中国友谊出版公司

经销 新华书店/外文书店

制作 ◆广州公元传播有限公司

印刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司

规格 889×1194毫米 32开本 9.5印张

版次 2008年3月第1版第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5057-2102-9

定价 49.00元

合同登记号: 图字19-2007-004 版权所有, 侵权必究

若有印装质量问题, 请致电020-38865309联系调换。

自然珍藏图鉴丛书

蘑菇

[英] 托马斯·莱瑟斯 著



[点此下载PDF图书](#)

摄影：尼尔·弗莱彻

顾问：戈登·路特

中国友谊出版公司

PDF

目 录

前 言 6

前 言 6

如何使用此书 9

蘑菇概述 10

形态各异的子实体 12

菌盖特征 14

孢子和孢子扩散 16

蘑菇的生存方式 18

蘑菇的生长环境 20

蘑菇的采集 22

蘑菇的识别 24



菌褶延生的伞菌 28

纤维质菌肉、漏斗形 28

菌盖球状、菌肉纤维质的蘑菇 37

菌肉会泌“乳”的乳汁菌 43

菌褶凹生至直生的伞菌 56

子实体无明显菌幕、多肉 56

子实体表面有蛛网状菌幕 69

菌柄有菌环或环带 78

菌盖纤维质、孢子深色 98

菌盖光滑、子实体大小中等 103

菌肉易碎型 120

菌盖平滑、子实体小型 132

菌盖粗糙、子实体小型 142

菌褶离生、有菌盖和菌柄的真菌 145

有菌托或菌幕鳞片 145

有菌环或环带 156

无菌幕 171

菌盖变黑 174

菌褶呈环状 177

有菌盖但菌柄侧生或缺失的真菌 178



有菌盖、菌柄的多孔真菌 184

菌肉松软 184

菌肉坚硬 202

菌盖蜂巢状、脑状或鞍状 207



杯状真菌 264

杯中无“卵” 264

杯中有“卵” 274

喇叭形真菌 275

星形、笼形真菌 277

子实体覆瓦形或皮壳状 211

多孔 211

底面多皱或平滑 228

子实体皮状或硬壳状 232

有刺齿真菌 234

棒型真菌 240

平滑或多毛 240

表面多突起或粉末状 244

阳具形 246

角形、珊瑚形真菌 248

球形真菌 253

地上部球形 253

地下部球形 258

梨形、乳钵形真菌 260

耳形、脑形胶质真菌 281



孢子表 284

术语表 289

索引 290

前言

真菌种类繁多、庞大，遍布世界各种生态环境：小如酵母菌，只能在显微镜下才能见到，大至蘑菇，肉厚肥美；大大小小的真菌奇形怪状、千姿百态。各种真菌以其独特的生存方式与地球上其他生物相互依存，或共生或寄生，甚至取而代之占地为王；千差万别的生态环境所培育出来的各类真菌，在地球的生命历程中作用重大。



△毒蝇鹅膏菌色彩鲜艳，有毒。最常见的有毒蘑菇应是伞形毒蕈。

有关真菌的研究被称为“真菌学”。不过，直到近代，蘑菇才被认为是植物的低等生命形式而纳入植物学研究。然而，由于并非所有的蘑菇都是在雨后才出现，人们对这种认定往往持怀疑态度。或许，正是这许多模棱两可的因素导致人们对许多真菌至今尚无认识；当然，真菌种群庞大也是原因之一。据估计，与只有25万多种的有花植物相比，真菌种类高达150多万种，数量之庞大令人惊叹。

不过，目前记录在册的真菌大约8万种，仅为估测总数的5%。真菌学家认为，除了在热带雨林中生长着很多迄今尚未确定的真菌种类外，其周边地区也生长着各种未知种类，数量巨大。以北欧为例，近期发现的多种真菌均是尚未记录在册的新种，其中不乏多种大型肉质蘑菇。

神秘的生命

一到秋天，许多人都知道可以在树林里采蘑菇，但却很少有人知道，这朵朵形似小伞的蘑菇不过是一个体积大许多的有机体的“子实体”部分；这种有机体的另一部分隐匿于土壤、林木等其他材料里，只有

◁真菌种类图表

全世界150万多种真菌中，有记录的大型真菌（形成子实体的真菌）为28700种；酵母、黑粉菌、霉菌约24000种；地衣13500种。全部相加，也不过是这张圆形图上的一个小部分。

图例

- 酵母
- 酵母、黑粉菌、霉菌
- 地衣
- 不明种类

地衣▷

地衣是菌、藻共生体；藻通过光合作用为共生体制造营养，对空气污染十分敏感，是天生的空气质量监视器。因为常见的石黄衣。



有用的真菌▷

真菌在人类生态系统中占有重要之地，在许多方面起着重大作用。真菌可用作制造食品、调味品、酒和抗生素，所含催化酶添加洗涤剂使去污效果大大增加。



洗衣粉

添加真菌提取酶的洗衣粉。



盘尼西林

由青霉提取的青霉素可杀死细菌，是行之有效的抗生素。

蓝纹奶酪

罗克福尔青霉菌 (*Penicillium roqueforti*) 可制成风格独特的蓝纹奶酪。



意大利腊肠

纳地青霉菌保护并增加了萨拉米腊肠的香味。



面包

酵母菌使紧密的生面团松软多孔。



啤酒

酿制啤酒离不开啤酒酵母。

子实体凸露其上，亭亭玉立。子实体长大，产生孢子，孢子扩散再发育长成新子实体。不过，有些种类的真菌孢子并不能长成新的子实体，比如霉菌。发霉面包上的绒霉就是霉菌菌丝体。

大型真菌

本书主要介绍的是那些能长成子实体的真菌。被真菌学者们称之为“大型真菌”的，其实通常被叫做蘑菇、伞菌。依据子实体的菌盖、菌柄及整体形状和生长环境，学者们把蘑菇划分出多种类型（见第12—13页）。许多真菌尽管种类不同，千差万

别，但看起来却总让人觉得大同小异。因此，只有仔细观察，才能辨别出其中差异。本书将提供详细指引，在帮助你识别各种蘑菇的同时，带你欣赏奇异的真菌王国。

食用真菌

尽管世界各地文化有别，采集真菌食用却都是自古有之。香菇作为中国人的美味佳肴已有数百年历史，而“蘑菇”的商业性栽培在欧洲同样历史悠久。今天，蚝菌和其他几种蘑菇的人工栽培更是处处可见，世界范

围内的羊肚菌、鸡油菌、牛肝菌的采集和贸易一直是经久不衰。

品尝任何野生菌之前都必须正确识别，以确定可供食用（见第23页）。如怀疑有毒，应携样品咨询专家。



香菇



蘑菇



蚝菌



△艾利雅思·弗里斯 (1794—1878)

早期杰出的真菌学家。他的著作《真菌分类学》为现代真菌分类学奠定基础。

食用野生真菌

为方便识别，本书详细描述了各种菌类的可食性。需要特别提醒的是，采集蘑菇如果是为了食用的话，初学者最好跟随有经验的采菇人前行，因为许多真菌可能有毒。另外，也有一些可食性真菌和有毒真菌外貌极其相似，可食性却是大相径庭。本书在介绍这类真菌时会列出特别警示。蘑菇中毒轻者出现胃肠不适，重者可致肝脏损害，甚至危及生命。因此，野生菌的食用需要慎之又慎，切不可盲目尝试。



◁ 夺命蘑菇

食用毒鹅膏菌 (左) 和毒纹毒鹅膏菌 (右) 将严重损害肝脏，并导致死亡。

真菌的分类

为了让人们更好认识、研究大自然，分类学家将种类万千的自然物种至少分为五大界，并依其进化程度加以细分至最小单位，真菌界为其中之一。

界以下的分类单位为门。本书涉及真菌界三大门 (见第11页)；门以下细分为纲、目。在目内，又根据形态等特点分成科、属，直至基本单位：种。每个分类单位都有学名 (拉丁文)，每个物种名由属名和种名构成。许多相似种类另有名称，即所谓通用名。下面以常见的鸡油菌 (*Cantharellus cibarius*，见第28页) 为例说明其在分类学所属的各级单位：

界 真菌界

(Fungi)

门 担子菌门

(Basidiomycota)

纲 层菌纲

(Hymenomycetes)

目 鸡油菌目

(Cantharellales)

科 鸡油菌科

(Cantharellaceae)

属 鸡油菌属

(*Cantharellus*)

种 鸡油菌

(*Cantharellus cibarius*)

鸡油菌




鸡油菌▷





子囊菌门

这类真菌的孢子产生于被称为“子囊”的结构，在子囊中，孢子母细胞经过减数分裂产生孢子。子囊菌门的成员包括羊肚菌类的可食用真菌，块菌类的珍贵食用菌，以及许多子囊菌往往不形成子实体，而是通过无性孢子（分生孢子）进行繁殖。

杯形菌子囊




瓶形菌子囊






羊肚菌

产生孢子的子囊生于蜂巢状菌盖可食用





菌柄表面





担子菌门

几乎所有的担子菌都有子实体。子实体由棒形细胞（担子）构成，担子顶端外伸（担子梗），在担子梗上形成孢子。一般每个担子产生4个担子梗，每个担子梗内生有一个孢子。许多担子菌都以担子体式的菌丝体组成而有别于其他真菌。

菌丝扣



网纹马勃




接合菌门

接合菌没有子实体。接合孢子（接合孢子）可长久生存，在适宜时才萌发长成菌体。接合孢子叫作“孢子囊”的结构产生孢子。孢子囊在接合菌中起着重要的作用，是接合菌繁殖的关键结构。

寄生性刺霉菌

这种真菌由大量的刺霉菌组成，它们寄生在其他真菌的菌丝体上，通过分泌酶类来分解宿主的细胞壁，从而获取营养。



形态各异的子实体

真

或消极被动
体形状与孢

排列于菌褶两边，或分布于
实体光滑的表面；有些真
还藏匿于


子散发方式关。切，例如，生长于地下
的块茎状的圆形的子实体（见第258—259




菌盖
齐全



菌柄偏生
或缺失



靴状



蜂窠状▷




地下块


皮层状，扁平，
或如硬壳▽
平空层增盖




棒形



鬼笔形▷






角状

珊瑚状



圆形



钟形 乳钵形



杯盘形



杯形，如放着“卵”的鸟巢




盘形

星形



簇状



耳状



同裂裂胶质子实体



菌盖特征

菌

菌盖的形状和表面特征

发生改变。识别时需选择多个样本参照考虑。通常，菌盖表面往往因天气干燥不再有原来黏糊糊的感觉。这种情况下可用湿

纸下轻压湿润。




球形

像面包



圆锥形


接近圆锥形




漏斗形



凸形



有松散鳞片



褶皱

或增皱




有瘤状物

不可擦去



有条纹




边缘有凹槽




向心式环带



表面粗糙如乱发



粘性



边缘内卷



折叠

而成



鞍形

形如马鞍




蜂窝状


形如蜂巢

菌褶乱面


菌柄的连结方式。可用一把锋利小刀把要




附生




离生




下延



直生



凹生



弯生


菌褶

鉴定蘑菇时仔细观察
十分有用的。例如：
菌褶的长度、数目、
颜色、形状、
排列方式




均等

的长度相等



不等


的长短不等




叉状




稠密



宽间隔



集成环




辐射

其他的生成孢子表层

并非所有蘑菇的子实层都
位于菌褶：一部分真菌的
子实层贴生于子实体表面，
随表面或平铺或陷入，
或呈齿状；有些子实层
孔就是菌管里的子实层。



菌褶形皱纹



有孔菌管



菌刺

孢子和孢子扩散

真

整个子实体可散发出数以万计的孢子。孢子可以主动扩散也可以被动扩散。被动扩散是指孢子依靠风、水等外界力量向外发散。主动扩散则是子实体利用自身的一种特殊机制把孢子推出体外。接长成菌体。有性孢子的菌体萌发后能产生新的子实体，无性孢子则不能。孢子与其他细胞不同，它不生长形成新的细胞，而是直接发育成新的细胞。

孢子扩散

孢子既可以主动扩散也可以被动扩散。被动扩散是指孢子依靠风、水等外界力量向外发散。主动扩散则是子实体利用自身的一种特殊机制把孢子推出体外。



喷射



借助动物



借助风、水力

菌和孢子从子实体

散。孢子成了空中飘浮的孢子，孢子成了空中飘浮的孢子。

孢子扩散的方式有多种，如风、水、动物等。

孢子印

从孢子印颜色确认某属蘑菇的所属种类是一种十分有用的方式。从有菌的蘑菇（伞菌）中取走孢子印不是太难。这个过程是：



1 罩住菌盖

如果是浅色孢子印，用黑纸面可清楚显示孢子印色彩；如是未知色彩，白




2 拿走菌盖

清晰

孢子印的颜色可以用来识别蘑菇的种类。

孢子颜色

同属蘑菇的孢子印颜色都很相似，因此，观察一个样品就可对该属蘑菇的孢子色彩有所认识。例如，所有的伞菌的孢子印；而某些类别的蘑菇，如红菇属蘑菇则完全不同，即使是相似种类，其孢子印颜色也各异。白色、奶油色，甚至还有红色、紫色或褐色。



孢子的形状和大小

了解孢子的形状和大小十分重要，这是正确识别蘑菇的重要依据。虽然有些种类的孢子直径可达2mm，但是绝大多数的孢子全长不过20μm，孢子形状也因扩散方式不同而多样。主动性扩散的孢子的体形极不对称，而被动性释放的孢子体形却往往均匀对称。第284—288页的孢子表列出本书所列平的各类孢子的形态、大小，以及其他细微特征。



显微镜



粉褶蕈



灵芝



墨汁鬼伞



粉孢革菌

这类蘑菇的孢子印颜色如星，黄，

蘑菇的生存方式

孢

菌，更同其他生物生成形成互惠关系。在自然界中，菌类与植物、动物、人类、其他微生物等，都存在着各种各样的互惠关系。例如，菌类与植物共生形成菌根，菌类与动物共生形成共生体，菌类与人类共生形成益生菌等。这些互惠关系对于维持生态平衡、促进生物生长、提高人类健康等方面都起着重要的作用。



寄主树

謝國興 啟

莖根

根，植物为真菌供给营养物质，真菌则为植物提供所需要的水和养分。当真菌菌丝侵入植物活体，在根部找到适宜的生长面，与根共生时即成菌根。某些伞菌和大多数的牛肝菌都可与树共存。

特殊关系▷

地下生长

腐生营养方式

多种生物的死亡机体，在真菌和动物都可通过腐生菌释放酶的作用得以分解。有些腐生菌只发生于某种特定的培养基上，右图所示的嗜球果伞菌就只能在云杉球果上才得以成活，但是腐生菌的营养基种类却十分广泛。一些真菌甚至可以被动静止的形式存在于植物活体，一旦植物死亡才开始进行主动积极的生命活动。



可食松果菌（见第133页）

这种特殊的腐生菌只分解球果，分解球果就得阿宾菌。

死体营养方式

这类真菌以最终致寄主植物死亡而获取营养，其中一些以菌丝繁殖或特别产生的酶母状细胞破坏寄主植物的水和养分运输系统杀死寄主。另一些真菌则分泌毒素摧毁寄主。寄主死亡后，这些真菌的营养方式如同上述腐生菌，把死亡植物体分解。



松根异担子菌（见第222页）

活体营养方式

和菌根真菌一样，包括锈菌、霉菌在内的活体营养真菌依靠生物活体为生。这类真菌产生特殊的菌丝体伸入植物体内，把植物所需的水分和养分送回真菌。但它们的菌丝体并不像菌根真菌那样广泛分布。



云杉散斑壳菌

蘑菇的生长环境

真菌 遍布世界各地，不过本书列出的绝大多数真菌都生长在北温带。很多种类可生长在北美、欧洲、亚洲，也有些只生长在单一地区或有限的局部。

域，因绝大多数真菌受限于特定生活环境，所以，认识真菌的主要生活环境，包括其赖以依附的植物十分重要。

林地

各类林地供养着各种不同的真菌。以岑树为优势树种的碱性土林地虽有蘑菇生长，但大多没形成菌根，比如环柄菇。涵养着山毛榉树、白桦的酸性土、泥炭土林地上生长有较高比例的菌根真菌，如牛肝菌、白色粘菌和青头菌。在矿质土的路旁、田野，我们经常可以看到环柄菇。这是因为这些真菌需要的有机质，



△松树林

多产于针叶林（见第200页）

（第120—129页）

粘菌牛肝菌



橡树林

牛肝菌

针叶树

大多数针叶树都可与真菌形成菌根。重要的菌根共生体只能在某种特定针叶树根上看到，因此，有了树种就几乎可以准确识别它的伙伴真菌了。图示的几种树对识别蘑菇尤其重要。



落叶松（落叶松属）



云杉（云杉属）



松（松属）

草地

从麦浪滚滚的平原到肥沃牧场，从未开垦的荒地到有迹人类痕迹的原野，草地类多种多样。在草地上生长真菌多为粪生型真菌，以分解草地动物的粪。

粪成分上

源，偏酸性土草地上的真菌种类与中性土或偏碱性土草地中类完全不同。



肥沃的牧场



箭毒

红蜡伞



牛肝

阔叶树

真菌和下面图例的阔叶树、落叶树都可形成菌根共生体。但也有好几种常见的阔叶树，比如桦树、榆树和小无花果树，它们与真菌没有多少直接



白桦（桦木属）



毛桦（桦木属）



榆树（榆科）

蘑菇的采集

采集 蘑菇时，要记住用手小刀切割，对那些幼嫩、脆弱的蘑菇，在观察完后，最好把这些蘑菇扔到堆肥中，或者还回林地。如采集蘑菇是为了用作美食的话，要看看菇体里有没有蛆状的蘑菇虫。

采菇器材

小刀、篮子或有格子的采集箱，都是采菇者必备的基本器材。镊子可提取小样本，手持透镜可观察细节。照相机、记事本则可用于资料记录。



篮子



有格子的采集箱



小刀

镊子



手持透镜



有微距镜的照相机



记事本，铅笔

怎样采菇

虽然用把小刀就可完成绝大多数蘑菇的采集，但在采集树枝或木桩上的蘑菇时，准备一把修枝叉或小修剪还是很有用的。为防止损坏蘑菇的重要特征，避免干燥，采到蘑菇后应把样品放在密封容器里。开启容器时应注意嗅闻，检查所采蘑菇有何种气味。



用刀切割

采集蘑菇时，要先用小刀从茎部切割。

非必须，不要用手过多地接触菌体，防止损伤或破坏有用的识别特征。

注意事项

- 观察颜色：用一个手指刮擦蘑菇，观察其色泽变化。并观察菌盖、菌柄、菌褶、菌环、菌托等特征。

菌盖

菌柄

菌褶、菌环、菌托

测量


同一类蘑菇，各个个体在形状、大小等方面各异，幼菇与成熟菇的大小也相差甚远，但测量蘑菇长宽大小仍是识别蘑菇的重要手段，本书所述的测量均以成熟菇体为准



蘑菇的毒性识别

在外形上，一些毒蘑菇与可食蘑菇十分相似，因此，采集者必须对毒蘑菇种类十分熟悉。不能准确识别的蘑菇决不可轻易进食。如果怀疑遇到有毒，应及时携带样品向专业人士咨询。

(*Amanita pantherina*) 白毒，黄斑豹菇 (*Agaricus xanthoderma*) 和玛丽红菇 (*Russula mairei*) 毒性如之。注意：毒鹅膏 (见第151页)，致命白毒伞



蘑菇的识别

本

是否有菌盖、菌柄蘑菇?



有

见明如

没有

参阅第26页▷▷

蘑菇的主要形态识别



菌柄偏扁正中，侧生
见第174页

有小孔
见第25页

菌盖钟形、脑形、鞍形
见第207页

有齿刺
见第234页

其他真菌的主要类型

此外，自然界中还存在着许多其他类型的真菌，它们有的对人类有益，有的则有害。在自然界中，真菌广泛分布，从土壤到空气，从植物到动物，无处不在。它们通过分解有机物，参与生态循环。有些真菌可以引起植物病害，有些则可以引起动物疾病。在工业上，真菌被用于生产抗生素、酶制剂等。在食品工业中，真菌也被用于发酵食品。在医学上，真菌的研究对于开发新的药物和治疗手段具有重要意义。因此，了解真菌的主要类型及其特性，对于认识自然界和人类生活具有重要意义。



另类特征

本目对各个属的特征进行了详细描述，包括：子实体形态、颜色、气味、味道、生长环境、分布地区等。这些特征对于识别和分类具有重要的参考价值。

覆瓦状或皮壳状



见第211页



下表面起皱光滑
见第224页



皮壳形，扁平柄陈如硬壳
见第232页


棒形



见第240页



体表面有疣如
麦生菌布
见第240页



见第240页

圆球形



地上部球形
253页



地下部球形
258页

杯、碟形



无“卵”型
264页



有“卵”杯型
274页


菌褶延生的伞菌

有菌盖、菌柄和菌褶的蘑菇称伞菌。

本章介绍菌褶“延生”的伞菌种类

即菌褶拉长直至菌柄的真菌。

各种有菌褶状延生脉纹的鸡油菌也包括在内。



纤维质菌肉、漏斗形

比较结实。其他
纤维质菌肉和漏斗形

和

鸡油菌 (COMMON CHANTERELLE)

微红，带有近似百合的香气，是可食的美味佳肴。菌盖向中间凹陷，边缘呈波状，延生菌褶厚实。浅色菌盖被剥后，

生长分布
柄形成菌根共生体，也可与橡树等阔叶树形成菌根。在北半球的寒、温带地区广泛分布。

·相似种：假鸡油菌，非菌根菌；发光



子实体生长于排水良好的草地。分叉、丛生



△白鸡油菌 (*Cantharellus cibarius*)

这种生长在北美树林里的蘑菇肉质鲜美，色泽淡雅，白

科

种

生长季节

发光脐菇 (JACK O' LANTERN)

菌盖光滑，凹陷成漏斗形；菌柄色泽较淡，菌肉结实，呈淡黄色。极毒，不可食。

• 生长分布：多长于材质不甚结实的死树或腐木上。

主要发现于北温带南部和热带地区。


• 相似种：可食性鸡油菌（见第28页、30页、275—276页）。这些种类的鸡油菌都与寄主形成有根关系，长有厚实的脉状



不发体
于树根上，丛生



菌盖子实，更



菌柄孢子

尺寸 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

尺寸 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

金葵拟蜡伞 (FALSE CHANTERELLE)

像是一顶橙黄或微红橙色的精致毡帽。

• 生长分布：广泛分布于北温带

也是其安身之地。广泛分布于北温带

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇


• 相似种：鸡油菌，发光脐菇

• 相似种：鸡油菌，发光脐菇


• 相似种：鸡油菌，发光脐菇



子实体长于林地，丛生



去根，更



孢子



剖面

尺寸 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

了假作

红喇叭菌 (CINNABAR CHANTERELLE)

随着子实体的成熟，色彩鲜艳、弯曲凸起的菌盖逐渐凹陷形成漏斗，菌盖周边向内弯曲呈波浪形。

变成淡粉红色，菌柄短，呈粉色或红色；菌褶延生、粉红、分叉、厚边。可食。菌盖里的纤维质菌肉细薄，呈红色、淡白色；菌柄菌肉厚实呈白色。

• 生长分布：菌根真菌，特别是和橡树形成菌根；往往生长在苔藓地上。广泛分布于北美东部。

• 相似种：绯红湿伞 (*Hygrocybe cantharellus*，也叫奶白蜡伞)，其菌柄洁白无分叉。



子实体生长于林地路边 群生

尺寸 菌盖 ++



++

菌柄

++

科 鸡油菌

种 *Cantharellus tubaeformis*

生长季节

喇叭鸡油菌 (TRUMPET CHANTERELLE)



以被发现，但一经发现，采集者往往收获颇丰。

• 生长分布：广泛分布于针叶林，广泛分布于北美地区。

• 相似种：淡黄鸡油菌 (*Cantharellus lutescens*，见第275页) 没有下行脉纹。



子实体生长于林地



菌盖



孢子

可食性 ++

灰假杯伞 (THE GOBLET)

这种与众不同的蘑菇有十分明显的漏斗形菌盖，颜色

从浅黄到深褐色，菌柄粗壮，基部有球状膨大。

孢子含淀粉，与碘反应呈蓝色。

生长分布：林地、公园、灌木树篱、草丛的橡

实林地或倒树的腐木上都可生长，广泛分布于北

半球，相当常见。
• 相似种：另的杯伞菌个体较小，颜色较

淡，在各种环境中均可发现。脐菇（见第

36页）子实体更小。



子实体群生或单生



剖面

• 菌柄基部有球状膨大，
• 孢子含淀粉，
• 与碘反应呈蓝色。

孢子含淀粉

尺寸 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

科 种 本类要类

大白桩菇 (GANT FUNNEL-CAP)

漏斗形菌盖，菌盖、菌柄、菌肉以及短

短的菌柄全是白色或奶白色。孢子含淀

粉，用碘测试变蓝——所有种类的粘伞

菇都有这特点。可食，但

可能会引起肠胃不适。
• 生长分布：多生于草

地、公园和开阔林地中

广泛分布于欧洲。
• 相似种：肉色杯伞

(*Clitocybe geotropa*)，

其菌柄较长。



子实体群生或单生

尺寸 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

科 种 本类要类

科 *Clitocybe geotropa* 生长季节

肉色杯伞 (RICKSTONE FUNNEL-CAP)

子实体高10-15cm，菌盖直径10-15cm，菌柄长10-15cm，菌盖肉色，菌柄白色，菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 生长分布 林下、草地、牧场、路旁、林缘、林间空地、林下腐殖质上。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。


• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。

• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。


• 相似种 与 *Clitocybe geotropa* 相似，但菌盖边缘有细齿，菌柄基部有白色粉状物。



菌柄基部有白色粉状物



侧面



子实体常在林地腐殖质上长成“蘑菇圈”

科

种

生长季节

变色杯伞 (GREY-BROWN FUNNEL-CAP)

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

菌盖边缘薄而有皱纹

剖面

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

白霜杯伞 (LAWN FUNNEL-CAP)

子实体可生长于腐土或肥土，群生

杯伞。白霜杯伞几乎通体纯白，菌盖凸起，表面有粉如霜，盖边缘有绿色斑点，破裂或干燥时色泽变淡，菌柄呈米色至浅褐色。菌肉白色至浅褐色，有淀粉气味。

• 生长分布：生长于草地环境，包括公园草坪和运动场的草地范围；常和可食的砂柄皮伞（见第117页）生长于同一环境，伴附生，或几乎离生。分布于北温带地区。

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

菌柄白色至浅褐色

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

子实体可生长于腐土或肥土，群生

可食性

卷缘枹菇 (BROWN ROLL-RIM)

别名

菌盖呈黄色、褐色，边缘光滑，向内卷曲明显；菌柄短，有木屑附着，色与菌盖一致。



松软、粉质的菌褶可因触碰或刀片切割变褐色。菌柄短，有木屑附着，色与菌盖一致。菌肉浅黄至浅褐色，切割后颜色变深。

• 生长分布：多和林地，公园里的针叶树、桦树形成菌根共生体。广泛分布于北美、欧洲、亚洲。

• 相似种：丝状枹菇 (*Paxillus filamentosus*) 边缘卷曲较小，黄色菌盖，长于阔叶树。



子实体较小，可为幼蘑菇也可只有几朵长于树下



尺寸 菌盖 6—15cm | 菌柄 4—8cm ↔ 1—2cm

孢子


可食性

虎纹菇 (TIGER SAW-GILL)

菌盖中心部位呈褐色，边缘白色，内卷为山；菌柄呈白色，有褐色条纹相间。白色菌褶质硬，向下延生。虎纹菇多有部分菌褶缺失，可能是因感染霉菌受损。

• 生长分布：生长于阔叶树林地，可导致树木得白腐病。广泛分布于欧洲、北美东部地区，也有分布。

• 相似种：豹皮香菇 (*Lentinus lepideus*)，单生或小丛生长于针叶树林地，可引起褐腐病。



子实体 + 于枯木老树上，特别多见于河边的垂柳杨树上

尺寸 菌盖 1—10cm | 菌柄 1.5—7.5cm ↔ 0.5—1cm

孢子 白色

可食性

科

种

生长季节

伞形亚脐菇 (TURF NAVEI-CAP)

子实体：菌盖、菌柄、菌褶、菌环、菌托

菌盖：与菌盖底面的菌褶一致

菌柄：细长，光滑，呈黄褐色，上端有少许紫灰色。菌肉薄，白色至淡黄色。

• 生长分布：伞形亚脐菇形同蘑菇，其营养方式却如地衣，和藻类合伙共生。藻通过光合作用制造营养，产生能量，菌吸收水分和无机盐，支持藻的生长。这种营养方式使伞形亚脐菇在酸性沼泽土地带，乃至酸性土壤地的恶劣环境下得以生存。常可在高海拔地区（也可在低地）的草皮、泥炭藓上看到这种小蘑菇。广泛分布于北温带寒冷地区。

相似种：(1) 红黄伞形亚脐菇 (*Clathrus ruber*), 生长于高山地区 and 北极地区，鲜黄色。

的起生菌丝

子实体单生或几朵聚集一起

科 伞菌

种 *Rickenella fibula*

生长季节 春 秋

瘦脐菇 (ORANGE NAVEI-CAP)

子实体：菌盖、菌柄、菌褶、菌环、菌托

菌盖：下凹，子实体细如发丝，又犹如一枚小金针。瘦脐菇和斯皮斯脐菇（右图）是该属最常见的两个种。

• 生长分布：瘦脐菇，广泛分布于北温带地区。



△斯皮斯脐菇 (*Rickenella renjishi*) 这种小蘑菇色泽浅灰至灰褐，菌盖中心（脐）几乎成黑色。菌柄上端略呈淡紫色。四川



子实体单生或小群生

[尺寸]

孢子

[可食性] 不可

菌盖球状，菌肉纤维质的蘑菇

木

长成中心凹陷形态。它们与下一节介绍的

科 铆钉菇 种 *Chroogomphus rutilus*

色钉菇 (PINE SPIKE-CAP)

菌盖锈褐色，表面弯曲如球或有顶红色。和近缘种铆钉菇（见第38

生长分布：林地或田野，分布于北温带地区，局部地区常见



子实体生长在沙质土上，群生，但不形成大簇群

子实体
数，呈小
菌盖如盖



色钉菇


青黄蜡伞 (HERALD OF WINTER)

初为卵形凸起，老熟后变成扁+形，褐色至黄

生长分布

根：生长季节较晚，初霜后才有所显现。分布于北温带地区，局部地区常见

相似种：鲜黄色的纹缘蜡伞 (*Hygrophorus lucorum*) 与落叶松关系较为密切，同样，与松树形成菌根的其他蜡伞蘑菇种类，与青黄蜡伞的



子实体中，小丛群生

孢子

可食性

科

种

生长季节

玫红铆钉菇 (ROSY SPIKE-CAP)


· 相似种：...
· 生长分布：一般生长于苔藓、地衣丛中，以及松...



玫红铆钉菇 (Rosy Spike-cap)



· 相似种：...
· 生长分布：...



子实体混生于枯盖牛肝菌 (见第211页) 丛中

尺寸

孢子

草地湿伞 (BUFF WAX-CAP)

· 一种肉质肥美的橙色蘑菇，菌盖表面干燥，光滑，弯曲的半球形菌盖老熟后变平坦，边缘呈波浪状，有时中心隆起。菌柄有不明显条纹，色比淡于菌盖，基部逐渐变细。浅黄色的菌肉质地软硬适中，可食，香气怡人，口感佳，是受人喜爱的美味佳肴。
· 生长分布：...
· 相似种：林地蜡伞 (*Hygrophorus nemorosus*)，菌盖干燥，多生长于阔叶林。



· 相似种：...
· 生长分布：...



子实体丛生，或在苔藓、草中形成蘑菇圈

尺寸

孢子

可食性

科

生长季节

生长季节


洁白蜡伞 (SNOWY WAX CAP)

这种蘑菇色泽易变，最明显的特点是干燥，没有菌类常有的粘滑感。干燥且如油脂般的象牙白菌盖，边缘或有半透明条纹。菌褶排列疏松，间隔大，白色菌柄多有粉色基部，可发出一种近似椰子的气味。有两个变种：浅褐蜡伞 (var. *fuscescens*) 和赭色蜡伞 (var. *ochraceopallida*)

黄至褐色，赭色蜡伞则是单质褐色菌盖

• 生长分布：少见于林地，多生长于草地！但这些区域的生态环境往往因现代农业生产遭致破坏。广泛分布于北温带，属常见品种

• 相似种



尺寸

科

种

生长季节

浅蓝绿杯伞 (BLUE-GREEN FUNNEL CAP)

斗形，成熟子实体菌盖色泽呈

白色，但比较少见，菌褶连生或轻微延生，在杯伞属里算例外，质地均匀的菌肉散发出的浓滑香气味，是该属多种蘑菇的共同特点。可食，但其他相似种却未必

• 生长分布：多生长于针叶林或疏叶林地的腐殖质土上 北温带广布

• 相似种：包括肉色杯伞 (C. *fragrans*) 在内，多种杯伞菌都有

较小，菌褶延生，白色或皮吊棕色。不可食



• 菌褶连生，多呈

子实体多见于肥沃土层，群生

尺寸

尺寸

可食性

合生离褶伞 (WHITE GREY GILL)

子实体白色。菌盖弯曲如球，多数有着波浪形边缘，菌盖边缘或成锥形。轻微延生菌丝。菌柄灰色，遇物体碰触或接触可溶性铁盐 (FeSO_4) 变为紫色。菌肉白色，接触 FeSO_4 也将变成紫色。

• 生长分布：主要生长在林地边缘地带，广泛分布于北温带地区，包括高山地区。

• 相似种：有些粉褶菌在外貌上与合生离褶伞十分相似，但与 FeSO_4 不发生变色反应，可以此为区别。



子实体



尺寸



孢子

可食性

科 锈菌

种 *Armillaria tabescens*

| 生长季节

假蜜环菌 (RINGLESS HONEY FUNGUS)

菌盖弯曲如球至扁平或凹陷，干爽，呈黄褐色，中心部位有褐色的直立鳞片。菌柄纤维质，白色，基部往往是多朵菌丝体束一起。地下部的黑色菌丝体束明显可见。仔细处理后的子实体可以食用。

• 生长分布：依附树根或树生长。广泛分布于北美东部地区。

• 相似种：蜜环菌 (*Armillaria mellea*)，菌盖有黑色鳞片，菌柄基部有黑色菌丝体束。



子实体从生于树根或其他树身，可致寄生树死。



尺寸



孢子

可食性

科

种

| 生长季节

红黄褶牛肝菌 (GILLED BOLETE)

有菌褶，但可以产生菌管层。菌褶容易从黄色至微红色的菌肉上分离开来。

• 生长分布：生长在阔叶林下也有。广泛分布于北温带地区。

• 相似种：(*Prunopus celinus*) 菌柄基部可见白色菌丝体。

菌盖
菌柄
菌褶



子实体单生或呈分散型小丛群生



尺寸



孢子

可食性

菌肉会泌“乳”的乳汁菌

分 子实体大，菌肉易碎，白色；菌褶稠密，菌盖光滑，中心凹陷。虽然渗出的液体色白如乳，干燥后却呈橄榄绿色。味道辛辣如胡椒。如食用，须用盐水浸泡，或充分油煎以除去辛辣味。

科 种 生长季节

白乳菇 (PEPPERY MILK-CAP)

子实体个大，菌肉易碎，白色；菌褶稠密，菌盖光滑，中心凹陷。虽然渗出的液体色白如乳，干燥后却呈橄榄绿色。味道辛辣如胡椒。如食用，须用盐水浸泡，或充分油煎以除去辛辣味。

- 生长分布：可生长于林地或排水良好的土层，与针叶树和阔叶树都可形成菌根。广泛分布于北温带地区。
- 相似种：苍白乳菇 (*Lactarius glaucescens*)

注：菌盖粘绒，菌褶疏，松茸微显绿色

剖面



△泌乳菇 (*Hypomyces lacufluorum*)

55页) 和红菇属 (见第120—122页) 均可食用。❶❶

「可食性」

尺寸


孢子

绒白乳菇 (FLEECY MILK-CAP)

一种别致的大蘑菇，菌盖白色至奶油色，中心凹陷。奶油色的菌褶排列相当紧密，菌柄较短，向下逐渐变细。菌肉破损后可渗出大量乳汁似的白色液体，致使局部菌褶呈褐色，但与氢氧化钾 (KOH) 反应却不变色。

• 生长分布：不仅可与山毛榉类的阔叶树形成菌根，也可与各种针叶树形成菌根。多分布于北美各地。

• 相似种：伯蒂尼乳菇 (*Lactarius berillonii*) 渗出液可使菌肉变黄，和氢氧化钾反应变橙色。入口有辛辣感。白乳菇的菌褶较紧密，菌柄较长，菌盖光滑。




• 在毛榉林中形成菌根



• 呈白色，
厚而光滑

• 在毛榉林中形成菌根



• 子实体多叶
蘑菇图，群生

生长季节 秋

粉褶乳菇 (WILLOW MILK-CAP)

来。菌盖半球形至凹陷，米白色，略带灰色或粉

干燥时不变色

· 生长分布：可与林地，沙丘上的柳树、杨树形成菌根，北温带有分布，但不常见。

粘滑的菌盖
菌褶很细
多由菌根生长

菌褶细
菌盖薄

· 相似种
· 与沙丘上的
· 出文菌根
· 或白色菌根

剖面

干燥体

毛头乳菇 (WOOLLY MILK-CAP)

紧密，米白色至浅粉色，轻度下行，

液体，滴在白手帕上呈淡黄色，干燥时不变色。经盐水或泡菜酸水浸泡腌制后可食用

· 生长分布：和桦树形成菌根，常生于空旷草地分布于北温带部分地区，较常见

· 相似种 *Lactarius stipitatus*

菌盖稍显平滑而没那么粗糙，环带模糊；

于实体群生，在潮湿地上长
成蘑菇圈

近无柄，
肉很厚的
像蘑菇王

菌盖菌柄，辛

剖面

尺寸

尺寸

尺寸

科

种 *Lactarius deliciosus*

生长季节 夏末 秋

松乳菇 (DELICIOUS MILK-CAP)

菌盖：半圆形至钟形，直径5-15cm，表面光滑，颜色从浅黄到深黄，有时带褐色斑点。菌柄：粗壮，高3-10cm，颜色与菌盖相似。乳汁：白色，浓稠，有粘性，受伤处会流出乳汁。味道：鲜美，略带苦味。生长环境：多生于松林下，与松树形成菌根。分布：广泛分布于中国、日本、欧洲、北美等地。

此菇不安。

• 生长分布：和松树形成菌根，多见于沙质碱性土 分布于北

• 相似种：松乳菇 (*Lactarius*

hemivaneus) 菌盖菌肉渗出液

呈蓝色，生长于枫树下。肉

色乳菇 (*L. salmonicolor*)

体较大。半红乳菇 (*L.*

semisanguifluus，见本



剖面



松乳菇



半红乳菇

呈绿色。多 受人喜爱的食 广泛分布于欧



不具柄，生长于松林下，可食。

橄榄褶乳菇 (UGLY MILK-CAP)

• 外观：菌盖直径 5-10cm，高 2-4cm，菌褶深褐色，菌柄粗壮，高 2-4cm，直径 1-2cm。

• 菌盖：中心凹陷，表面粘滑，边缘绒毛覆盖，未成熟时菌盖边缘有深褐色绒毛。

• 菌柄：粗壮，高 2-4cm，直径 1-2cm，表面光滑，基部有菌丝。

• 生长分布：林地、草地上都可生长，寄生于桦树、杉树，形成菌根，分布于欧洲、东亚。

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 生长分布：林地、草地上都可生长，寄生于桦树、杉树，形成菌根，分布于欧洲、东亚。

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时

• 相似种：粘绿乳菇 (*Lactarius blennius*) 和食时



子实体 5-10cm x 2-4cm

尺寸 5-10cm x 2-4cm

尺寸 5-10cm x 2-4cm

尺寸 5-10cm x 2-4cm

可食性 不可食

科

种

生长季节

粘绿乳菇 (SLIMY MILK-CAP)

• 外观：菌盖直径 5-10cm，高 2-4cm，菌褶深褐色，菌柄粗壮，高 2-4cm，直径 1-2cm。

• 菌盖：光滑，中心凹陷。色泽多变，通常为褐色、灰色、橄榄色相间，在菌盖边缘有浅色斑痕。菌肉硬质白色，白色渗出液可使白色菌褶变色为橄榄灰色。

• 生长分布：广泛分布于欧洲和临近亚洲地区，十分常见。

• 相似种：环纹乳菇 (*Lactarius circellatus*)，仅生长在角树下，菌褶呈深褐色。液汁乳菇 (*L. fluens*) 子实体较小，菌盖上有色环，边缘接近白色。

• 相似种：环纹乳菇 (*Lactarius circellatus*)，仅生长在角树下，菌褶呈深褐色。液汁乳菇 (*L. fluens*) 子实体较小，菌盖上有色环，边缘接近白色。

• 相似种：环纹乳菇 (*Lactarius circellatus*)，仅生长在角树下，菌褶呈深褐色。液汁乳菇 (*L. fluens*) 子实体较小，菌盖上有色环，边缘接近白色。

• 相似种：环纹乳菇 (*Lactarius circellatus*)，仅生长在角树下，菌褶呈深褐色。液汁乳菇 (*L. fluens*) 子实体较小，菌盖上有色环，边缘接近白色。

• 相似种：环纹乳菇 (*Lactarius circellatus*)，仅生长在角树下，菌褶呈深褐色。液汁乳菇 (*L. fluens*) 子实体较小，菌盖上有色环，边缘接近白色。

• 相似种：环纹乳菇 (*Lactarius circellatus*)，仅生长在角树下，菌褶呈深褐色。液汁乳菇 (*L. fluens*) 子实体较小，菌盖上有色环，边缘接近白色。

• 相似种：环纹乳菇 (*Lactarius circellatus*)，仅生长在角树下，菌褶呈深褐色。液汁乳菇 (*L. fluens*) 子实体较小，菌盖上有色环，边缘接近白色。


• 相似种：环纹乳菇 (*Lactarius circellatus*)，仅生长在角树下，菌褶呈深褐色。液汁乳菇 (*L. fluens*) 子实体较小，菌盖上有色环，边缘接近白色。

• 相似种：环纹乳菇 (*Lactarius circellatus*)，仅生长在角树下，菌褶呈深褐色。液汁乳菇 (*L. fluens*) 子实体较小，菌盖上有色环，边缘接近白色。

• 相似种：环纹乳菇 (*Lactarius circellatus*)，仅生长在角树下，菌褶呈深褐色。液汁乳菇 (*L. fluens*) 子实体较小，菌盖上有色环，边缘接近白色。

• 相似种：环纹乳菇 (*Lactarius circellatus*)，仅生长在角树下，菌褶呈深褐色。液汁乳菇 (*L. fluens*) 子实体较小，菌盖上有色环，边缘接近白色。

• 相似种：环纹乳菇 (*Lactarius circellatus*)，仅生长在角树下，菌褶呈深褐色。液汁乳菇 (*L. fluens*) 子实体较小，菌盖上有色环，边缘接近白色。



• 湿润处常出现



子实体 5-10cm x 2-4cm

6-1

尺寸 5-10cm x 2-4cm

尺寸 5-10cm x 2-4cm

可食性 不可食

环带乳菇 (PICKLE MILK-CAP)

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document. The title is "The first part of the document is a title page." The author's name is "The author's name is the name of the person who wrote the document." The date of the document is "The date of the document is the date when the document was written."

白色痕。盐渍或腌制后美味无比

生长分布

洲林地 分布于北温带地区，局部地区常见

• 相似轴 f , $f_1, f_2, f_3, \dots$

* 南極の肥後



100

飛速中

百學成書
先賢之書



1998



● 藥膳之選
宜肉應助



子雲懷群生疾几幾聚集

● 骨節、上肢、
軀幹、下肢、
足趾、肩、肘、

鹿茸成
 降香

苍白乳菇 (PALID MILK CAP)

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes that proper record-keeping is essential for determining the correct amount of tax liability.

2. The second part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes that proper record-keeping is essential for determining the correct amount of tax liability.

3. The third part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes that proper record-keeping is essential for determining the correct amount of tax liability.

4. The fourth part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes that proper record-keeping is essential for determining the correct amount of tax liability.

5. The fifth part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes that proper record-keeping is essential for determining the correct amount of tax liability.


· 生长分布

慢。分布于欧洲。

+ 相似種 $f_{11} = f_{12} = f_{21} = f_{22} = 0$

...

色泽稍暗，常见于针叶树下

子身体⁷

查全氏

九、新約

子子

1.4

科

种

生长季节



细质乳菇 (MILD MILK-CAP)

子实体一般呈几朵聚集出现

• 生长分布

• 相似种

(*Lactarius ichoratus*) 较大, 橙红色, 有一种令人作呕的气味; 红奶浆菌 (*L. volemus*, 见第54页) 个头较大



子实体一般呈几朵聚集出现

菌盖中等

菌肉浅褐色

菌柄

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

科 红菇

种 *Lactarius theiogalus*



生长季节 秋

锈黄乳菇 (YELLOW-STAINING MILK-CAP)

子实体群生或丛生

• 生长分布

• 相似种: 多孔乳菇 (*L. lacunarum*) 菌肉可染色变黄, 但菌盖不是很皱, 无皱纹, 色泽较暗,



子实体群生或丛生

菌盖中等

菌肉浅褐色

菌柄

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

科 红菇

种 *Lactarius theiogalus*

生长季节 秋

湿乳菇 (LIVER MILK-CAP)

菌盖暗褐色，光滑，中心凹陷或

菌肉易碎，奶油色至淡褐色；渗出的白色液体可变黄色。菌肉口味辛辣，不建议食用。

• 生长分布：生长于酸性沙质土壤林地、牧场，与松树形成菌根。常因酸雨增加

• 相似种

hadiasangumens) 是更为鲜亮的红褐色

渗出液变黄色。在同样生长环境中发现的红褐色乳菇 (*L.*

caesia) 的渗出液不变色。

caesia) 的渗出液不变色。

caesia) 的渗出液不变色。

黄色。



生长季节

菌肉细薄易碎，奶油色或浅褐色

剖面



子实体
群生或小丛生

尺寸

孢子

可食性

尖顶乳菇 (DULL MILK CAP)

因白色渗出液不变色，菌肉细白无辛辣味等特点而较易被识别。浅黄色至暗褐色的菌盖中心凸起或轻度凹陷。菌柄颜色同菌盖。稍微低生的菌褶未成熟时为米白色，老熟后变浅褐色。

• 生长分布：和阔叶树形成菌根。多见于山毛榉树。分布于欧洲，常见。



菌柄与菌盖色全有微黄，基部色更深

菌柄与菌盖色全有微黄，基部色更深

菌肉细而白


黄褐色至

白色渗出

有微细球状或有凸纹



子实体



孢子

可食性

尺寸

稀褶乳菇 (DISTANT-GILED MILK-CAP)

菌盖橙褐色，有凸起至坦平或凹陷，表面无任何环带，菌盖和菌柄表面都显得十分干燥。肉质易碎，白色，渗出的白色乳液量大，不变色，无味。

· 生长分布：菌根菌；多见于林地，橡树下尤其多见。分布于北美东部，常见。

· 相似种：皱褶乳菇 (*Lactarius corrugis*) 菌盖红褐色，边缘有皱，菌褶赭色，渗出液变褐色。直柄多汁菇 (*L. volenus*，见第54页)。这两种乳菇均必须经处理后方可食用。每年的生长季节里，可在同一环境里同时采摘这两种乳菇。

菌褶近正

菌柄子生
时直立

不实体能生，但常可见群生在开阔林地

尺寸

++

+

++

尺寸

可食性 | 1

油味乳菇 (OAK MILK-CAP)

这种嫩白乳菇菌盖表面有一层暗灰至褐色的多色环片，老熟时转复凹陷。肉质易碎，浅褐色；渗出液奶白色，渗出后不变色；有特殊的油气味。

· 生长分布：多生长在酸林地上，只和栎树形成菌根并伴生。欧洲和邻近亚洲地区十分常见。

· 相似种：松乳菇 (*Lactarius chrysorrheus*) 也和栎树形成菌根，但色泽较淡，较黄，白色渗出液不仅量大而且很快变硫黄色。奶浆菌 (*L. scutellatus*) 也有

1. 菌盖近正 2. 菌柄近正 3. 菌褶近正

较深



子实体群生



尺寸 菌盖 ⊕ 4—8cm | 菌柄 ⊕ 3—7cm ⊕ 0.5—1.5cm

孢子 奶白色至粉红色

可食性 限制

浓香乳菇 (CAMPHOR-SCENTED MILK-CAP)

子实体... 菌盖... 菌柄... 菌褶... 菌丝... 孢子...

的异味。渗出液呈清淡白色，无变色反应。

• 生长分布
喜生长在酸性、排水良好的土地。广泛分

相似种

55页)有相似气味

自少件解时野菌

• 这种蘑菇
的菌盖边缘有
一圈细孔

子实体在

红褐色乳菇 (RUFOUS MILK-CAP)

这类蘑菇的菌盖多为中心凹陷。子实体

碎，白色液体渗出后仍保持原色。菌
肉的辛辣味可保持30秒钟不散；经盐

• 生长分布

要生长于酸性土地区。在很多地区，它都是人

• 相似种

• 子实，红褐
色面好嚼质而

侧或略少于
菌柄长管

菌盖白点

菌柄

• 菌盖可
被嚼碎

子实体群生。成几朵聚集

科

种

生长季节

浅灰香乳菇 (COCONUT SCENTED MILK CAP)




大种 有相似种 有相似种 有相似种 有相似种 有相似种

色至赭色，却又似粉色或麦奶油色。整个菌盖中心凹陷，周边却向上，细白

的菌褶，菌柄粗壮，菌柄上部有细白粉霜。

味香，有椰子味，有杏仁味，有核桃味。

- 生长分布：常见于潮湿地带，与桦树形成菌根，广泛分布于北温带地区，十分常见。
- 相似种：大乳菇 (*Lactarius mammosus*) 也有类似的椰香气味，但色至赭色，菌柄较粗，长于针叶树下。



尺寸

..

..

..

尺寸

可食性 1

科

种

生长季节

多汁乳菇 (TAWNY MILK-CAP)

菌盖多肉，暗褐色，为指如球的表面有一层薄而有裂缝的皮层，菌柄厚实，淡褐色，表面粘滑。切开子实体，可见米白色菌肉渗出大量白色液体，并逐渐变为浅褐色。有类似贝类的气味，尤其是老熟子实体气味更浓。菌褶稠密，轻微延生，淡金黄色。口味青葱。

- 生长分布：多与阔叶树寄

生，有相似种 有相似种 有相似种 有相似种 有相似种

温带，但并不常见。

- 相似种：细质乳菇以及相似蘑菇的子实体都比较小，菌盖没有裂痕皮层，菌柄表

面有粉霜。



子实体大小 生长季节 可食性 1

尺寸

..

..

..

尺寸

可食性 1

科

种

生长季节

淡黄乳菇 (LQUORCE MLK-CAP)

子实体中等大小，菌盖黄褐色至灰褐色，成熟时

形如漏斗，中心有一凸起，菌肉易碎，色泽呈黄色，白色或浅粉红色；比起多数乳菇来，淡黄乳菇渗出液量少，色淡，且较为稀薄

· 生长分布：和桦、松、云杉都能形成菌根，泥炭藓中也多有发现 广泛分布于北温带地区。

· 相似种：分布于北美的水汁乳菇 (*L. aquifluus*) 形态色泽都和它格外相似

子实体中等大小

子角，菌柄较粗壮
● 菌盖的中心，菌柄

剖面

菌盖中等大小，
黄褐色，略呈粉
红色

子实体群生于树下，多生于
潮湿酸性土


尺寸

孢子

可食性

菌褶凹生至直生的伞菌

本章介绍的伞菌菌褶以两种方式与菌柄相连。一种是连接处十分狭窄形成凹口（凹生、附生），另一种是直接相连无连接面（直生）。菌褶在菌柄处形成明显凹痕，也称凹口。边缘拉直或成弯曲（波状）。



子实体无明显菌幕、多肉

本 体无明显菌幕，无论菌盖、菌盖边缘的褶皱或是菌柄都没有残留菌幕。这包括青紫色

红蜡伞 (CRIMSON WAX CAP)

子实体大，多肉；菌盖圆锥形至近平展，轻压粉扑，深红色；菌褶色泽较浅，初时全橙黄色，菌柄表面干爽，黄白，发红，覆盖绒可纤毛。气味，口味较普通，没有独特之处。多为不可食白菌。

• 生长分布：多见于田野草地，与蜡伞属、地钱菌属、松茸属的某些种类相伴而生，北温带分布广泛，但只在局部地区出现。

• 相似种：绯红蜡伞 (*H. coccinea*，见第105页)。华丽蜡伞 (*H. splendidissima*) 的朱红色更为鲜艳，菌盖干爽，有一股发淡的气味。

尺↑

可食性

肉色香蘑 (STRONG-SCENTED BLEWIT)

这种蘑菇的成熟菌褶是粉红色。其他部

子实体气味较香，可做成美味佳肴

生长分布：多长在落叶腐殖质丰富的碱性土上，

广泛，十分常见

相似种：紫丁香蘑和粉紫香菇 (*Lepista*

personata) 都有相似形态特征，不过色泽

早紫或淡紫，气味较淡

子实体多长成蘑菇型，常生

成簇或成团

可食性：可食

孢子：孢子

菌盖：菌盖

菌柄：菌柄

菌褶：菌褶

菌丝：菌丝

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体



尺寸 菌盖 5—15cm | 菌柄 5—10cm × 1—2cm

科 种 生长季节

紫丁香蘑 (WOOD BLEWIT)

这种紫褐色蘑菇较易识别：菌盖色泽较

暗，形如小圆面包，初起弯曲如球渐

变平展；菌盖中央时，边缘颜色变淡

有丝纹的菌柄基部呈棒形，色泽和菌

盖相似，同是紫褐色，而波形菌柄的紫色比

的硬可菌肉呈均匀的紫蓝色。

生长分布：多生在落叶腐殖质丰富的碱性土上，

广泛，十分常见

相似种：紫丁香蘑和粉紫香菇 (*Lepista*

personata) 都有相似形态特征，不过色泽

早紫或淡紫，气味较淡

子实体多长成蘑菇型，常生

成簇或成团

可食性：可食

孢子：孢子

菌盖：菌盖

菌柄：菌柄

菌褶：菌褶

菌丝：菌丝

菌丝体：菌丝体

菌丝体：菌丝体



尺寸 菌盖 5—15cm | 菌柄 5—10cm × 1—2cm

科 种 生长季节

可食性：可食



粉紫香菇 (BLUE LEGS)

小圆面包形，老熟后平坦展开，边缘光滑。鲜亮的淡紫色菌柄上布满纤毛，菌肉硬质、肥美，有香味，呈淡紫色。也是一种常

• 生长分布：多见于肥沃碱性土的开阔草地，路边和公园，也可见于空旷林地。广泛分布于欧

• 相似种

林地

• 硬质的菌肉

剖面

• 菌柄的纤维

子实体在草地上的生长

香杏鲍菇 (ST GEORGE'S MUSHROOM)

这种肥美的蘑菇虽然也有浅褐色至棕褐色类型，但由

硬质菌肉气味浓郁，富含淀粉，是

• 种营养价值很高的食用真菌。

• 生长分布：生于草地、树湾和林地中，公园和菜园中也相当常见。广泛分

布于

• 相似种

菇也多同时出现于春季，但可根据孢子印粉色和成熟菌褶

来区分。

• 菌盖

片状

子

子实体

科

种

生长要

棕灰铍蘑 (GREY KNIGHT-CAP)


以发现 菌盖菌隆凸起、
状纤毛、菌盖边缘光滑、菌柄灰白色
丝状纤维质 浅灰色的波形菌褶在
与菌柄连接处形成凹口。散发淡淡菌
香，口味柔和。可食，但需注意和相似
种区别

- 生长分布：生于肥沃碱性土，和针叶树形成
菌根。广泛分布于北温带地区，十分常见
- 相似种：锈色铍蘑 (*T. pardinum*，见第
60)

黄绿铍蘑 (见下)，斑黄色



子实体



菌盖菌褶



菌褶波
形、凹生

• 硬实的短菌柄

剖面



以暗黄色
菌盖菌褶

孢子

菌盖菌褶

科

种

生长要

雕纹铍蘑 (YELLOW-STAINING KNIGHT-CAP)


浅色，灰色鳞片紧排菌盖表面。菌柄米白色至
菌褶波形、凹

可食，但需注意与相似种
区别、

- 生长分布

树都可形成菌根，多见
于桦树下。广泛分布于欧
洲，十分常见

- 相似种：锈色铍蘑
有毒



厚如皮革色
菌盖菌褶

孢子

以暗黄色
菌盖菌褶

剖面



子实体

菌盖菌褶

尺寸

孢子

可食性 [O]

黑鳞菇 (DARK-SCALED KNIGHT-CAP)

菌盖表面有黑色线形的纤维质鳞片，菌


柄鳞片，菌肉色淡，纤维质。气味类似天竺葵的芳香。因与有毒菌形相似（见相似种），不易识别，所以不主张食用。

• 生长分布：与针叶树和阔叶树均可形成菌根。欧洲局部地区有分布。

• 相似种：粉褶菇 (*Tricholoma orirubens*) 可变为绿色和粉红色。豹斑菇 (右图) 有毒，多鳞菇更是通体布满鳞片。



子实体出现在碱性土上，单生或小丛生



豹斑菇鳞片



△豹斑菇 (*Tricholoma pantherinum*)

在阔叶树和针叶树下可发现。有毒。

斑褶菇 (FLECK-GILL KNIGHT CAP)

菌盖中心凸起，菌褶有明显黑斑，类似圆柱形的浅色菌柄。

口感辛辣，不可食用。

• 生长分布：广泛分布于欧洲，十分常见。

相似种：灰褶菇 (*T. virgatum*) 呈银灰色，子实体圆锥形。



子实体



有毒且辛辣，不可食用。

尺寸 菌盖 4—8cm | 菌柄 4—10cm → 1—2cm

孢子 白色

可食性

和

和

和

皂味铍蕈 (SOAP-SCENTED KNIGHT-CAP)

作为一种变种极多的蘑菇，皂味铍蕈常被分成许多亚种。其共同特点是肉质肥厚、散发强烈的肥皂味；其中一些菌柄有黑色鳞片。菌盖奶油色至灰绿色，随子实体老熟呈现红色色。为浅绿色。本例皂味铍蕈菌盖平展至凸形，色泽灰绿，可能变色，在潮湿时显得腻滑。

·生长分布：多与阔叶树形成菌根，和针叶树也能形成菌根；广泛分布于北温带。



子实体



剖面

尺寸

++

4-10cm ↔ 1-3cm

孢子

可食性

和

和

和

灰褐纹铍蕈 (GREY AND YELLOW KNIGHT CAP)


作为一种变种极多的蘑菇，灰褐纹铍蕈常被分成许多亚种。其共同特点是肉质肥厚、散发强烈的肥皂味；其中一些菌柄有黑色鳞片。菌盖奶油色至灰绿色，随子实体老熟呈现红色色。为浅绿色。本例灰褐纹铍蕈菌盖平展至凸形，色泽灰绿，可能变色，在潮湿时显得腻滑。

经泡处理后可食用，潮湿时有类似淀粉的气味。

·生长分布：和针叶树形成菌根，广泛分布于北温带，属常见品种。
·相似种：黄绿铍蕈外表呈绿色或褐色。



子实体单生或群生于沙地上



剖面

子实体可食用，
茎部半部也。老熟
后茎部成硬壳状。

可食性
黄色

尺寸

++

和

和

孢子


可食性

褐黑铎蕈 (BURNT KNIGHT-CAP)

菌盖老熟后从曲半球形变得半展，潮湿时粘腻；浅褐色菌柄带有红褐色痕纹。菌褶米白色，老熟后变红褐色。

• 生长分布：常生于中性或碱性土，与阔叶树形成菌根，在生长于肥沃土上的山毛榉树下尤为多见。广泛分布于欧洲温暖地区。

• 相似种：杨树铎蕈 (*T. populinum*) 形态相似，但多见于杨树。焦黑铎蕈 (*T. ustuloides*) 的菌柄顶端有明显浅色环带。



焦黑铎蕈

主要生长于针叶林，菌柄顶端带白，菌盖可粘滑也可多毛。主要根据气味的干湿度而定。

↑

•


•

孢子


可食性

• 边缘光滑

• 天气潮湿时，菌盖表面常粘滑



菌柄



• 菌柄顶端

子实体单生或丛生

草黄铎蕈 (OAK KNIGHT CAP)

识别这种小型至中型铎蕈，首先要观察其生长的特殊环境，其次在于是否散发出类似淀粉的甜香气。菌盖革浅褐色，初起为半球形，老熟后渐呈平展；米白色的菌柄质地紧密，圆柱形，渐变为淡褐色。可能有毒，不可食。


• 生长分布：和林地里的橡树、山毛榉、角树形成菌根，广泛分布于欧洲，属常见品种。

• 相似种

香杏丽蕈多生长于春季。

菌柄白色或带黄

菌柄



子实体生长于酸性至中性土，

尺寸

孢子

可食性

黄绿锈蘑 (DECEIVING KNIGHT-CAP)

子实体 10-15cm 高 1-2cm 宽 1-2cm 厚
展，表面有黑色纤毛，气候潮湿时变化
骨粘连，白色菌柄老熟后泛黄，菌肉白
色，菌盖皮层下菌肉微黄，可食，但可
能引起恶心，作呕

- 生长分布：和诸如山毛榉树的阔叶树和
针叶树形成菌根，林地、种植园都有发现，
常见于酸性土地，广泛分布于北温带
- 相似种：灰褐纹锈蘑 毒鹅膏 (*Amanita
phalloides*，见第151页) 的显著特征是：
有菌托，菌柄环带，菌褶
离生



尺寸 10-15cm 高 1-2cm 宽 1-2cm 厚
子实体 10-15cm 高 1-2cm 宽 1-2cm 厚
可食性 可食性

金黄褶锈蘑 (SANDY KNIGHT CAP)

“油锈蘑” (*T. equestre*) 的野生食用菌，所
有的金黄褶锈蘑都有着展开、有圆凸的黄色
菌褶，黄色菌柄；不过，子实体的大小不
同，取决于生长环境，菌肉白中带黄，
浓淡各异；
树下的锈蘑 (本例)。选择性可食，
但是由于深陷泥土，这类松树共生
体的蘑菇清理采摘相当麻烦

- 生长分布：菌根菌：粗壮肥实
型多见于松树林；纤细瘦长的多
见于云杉和白杨树下，广泛分布



尺寸 10-15cm 高 1-2cm 宽 1-2cm 厚
子实体 10-15cm 高 1-2cm 宽 1-2cm 厚
可食性 可食性

科

种

牛肝菌科

硫黄色钊蕈 (GASWORKS KNIGHT CAP)

只要把握这两项特征：硫黄色子实体和令人恶心的气味，即可很快识别这种毒菇。煤气似的气味由子实体内一种名为“粪臭素”的化合物产生。

菌盖光滑，半球形至圆形隆起，有纤毛，基部膨胀呈米白色。有些真菌学家把这种硫黄色钊蕈又另分出相似种：蛞蝓钊蕈 (*T. bufonium*)，除有相同的粪臭气外，其特征为菌盖中心、红色。

• 生长分布：和针叶树、阔叶树都能形成菌根，广泛分布。

菌盖皮

菌褶菌丝

菌柄菌丝

子实体

剖面

孢子

菌柄

黄褐钊蕈 (BROWN KNIGHT-CAP)

体暖橙褐色，菌肉鲜黄色，味苦，有淀粉气。菌盖有凸起的半球形，边缘起皱，淡黄色的波状，因生霉褶老熟后变得褐色斑斑。疑似有毒。

• 生长分布：和桦树形成菌根，可能也寄生于云杉。广泛分布于北温带地区。

• 相似种：白棕钊蕈 (*T. albobrunneum*)，多见于针叶树下，菌肉白色或浅褐色。

片黄，子实的菌盖

剖面

孢子

可食性

尺寸

科

属

主要特征

铍囊蕈 (COMMON CAVALIER)

为深褐色，气味、口味暗淡，不可食用

• 生长分布：多见于菜园、公园和林地 广泛分布于北温带地区，属常见品种

• 相似种

区，多种囊蕈属真菌同为相似种



• 菌盖：平，干，黄褐色，有时有裂纹
• 菌柄：粗壮，实心，黄褐色，有时有裂纹


尺寸：... 孢子：... 食用性：...

赫铍囊蕈 (OCHRE GILLED CAVALIER)

有赭粉红色、黄色至赭色，其独特色泽有助于识别 田野里的囊蕈属

褶间生，可食，有些无毒，但未必有食用价值

• 生长分布：可见于林地、公园、旷野、草地和落叶腐殖质地，广泛分布于北温带，相当常见



• 菌盖：平，黄褐色，有时有裂纹，有时有赭色
• 菌柄：粗壮，实心，黄褐色，有时有裂纹

剖面

菌柄中两朵红色



子实体

尺寸：... 孢子：... 食用性：...

科

目

牛肝菌目

宽褶铍囊蕈 (BROAD-GILLED AGARIC)

菌盖：半圆形至近圆形，菌褶间隔宽松，菌柄浅褐色，覆盖纵向纤维，菌柄基部有结实、粗厚的线状假根，

肠不适。

• 生长分布：子实体发生于林地阔叶树十或树桩上，也常见于落叶腐殖质十或腐朽阔叶树树桩，广泛分布于北温带地区

• 相似种：其他金钱菌（见第67、111~113页）子实体较小，无明显假根



子实体单生或由假根初生群生



菌柄基部有结实、粗厚的线状假根



菌褶中等间隔弯曲凹生

菌肉白色硬质

剖面

干燥菌盖表面有放射状纤维



菌柄基部

尺寸

↑

↓

菌子

科

目

牛肝菌目

赭红拟铍蕈 (PLUMS-AND-CUSTARD)

菌盖：半圆形至近圆形，菌褶间隔宽松，菌柄浅褐色，覆盖纵向纤维，菌柄基部有结实、粗厚的线状假根，

生长分布

赭红拟铍蕈可致寄主针叶树死亡。林地、种植园均可发现这种木腐菌，尤其是在松树下。广泛分布于北温带地区，十分常见

• 相似种：其他金钱菌（见第67、111~113页）

没有红色，黄色菌盖上有细微的黑色纤毛、或黄绿色



子实体小丛生于林地腐殖质地



剖面

可食性

尺寸

↑

↓

孢子

科 锈菌

种 *Collybia*

生长季节 秋

斑金钱菌 (SPOTTED TONGUE-SHANK)

子实体在林中地上，基部有锈色斑点。斑金钱菌的大小与多数金钱菌差异较大，反而与锈菌类相似（见第59—64页）更为接近。

• 生长分布：多见于多腐殖质的酸性土壤的针叶树或阔叶

林。子实体多鲜生。肉较软，气味浓郁。

• 相似种：歪头金钱菌 (*C. distorta*) 和有节金钱菌 (*C. proluxa*) 外形相似，肉较软，气味浓郁。

滑面

• 附生菌类

宽柄菌

子实体多鲜生

尺寸 毫米 厘米

孢子

可食性 不可

科 锈菌 种 金钱菌 生长季节 秋

大毒骨锈伞 (WEEPING FAIRY CAKE)

子实体在林中地上，基部有锈色斑点。大毒骨锈伞的气味极毒。

• 生长分布：多见于多腐殖质的酸性土壤的针叶树或阔叶林。子实体多鲜生。肉较软，气味浓郁。

• 相似种：歪头金钱菌 (*C. distorta*) 和有节金钱菌 (*C. proluxa*) 外形相似，肉较软，气味浓郁。

子实体多鲜生。肉较软，气味浓郁。

• 几乎全白

• 很快腐烂

学方面的精细差异进行识别

• 未成熟子实体非常小巧、柔软

• 灰色或黑色的锈色菌盖

• 菌柄入土变干后会呈黑色

子实体鲜生，在草丛中形成蘑菇圈

孢子

可食性 不可

尺寸 毫米 厘米

皮状粉褶菌 (LEAD POISONER)

■ 菌盖：小，浅灰褐色至赭奶油

■ 菌柄：短，老时短又已开裂初怕雨时短，色除这些典型特征外，铅色毒菇的白块奶油色菌柄，以及难闻的淀粉气都是识别标志。重要的是，多数蘑菇中毒事件都和这种貌似香菇的粉褶菌有关

• 生长分布：多见于粘性土质的成熟阔叶林地，广泛分布于欧洲，北美和东亚地区多见的伴生是近缘种毒粉

• 相似种：浓香伞蕈有强烈的芳



子实体多见于阔叶林地的橡树，山毛榉树下，小群生

粉盖粉褶菌 (WOODLAND PINK-GILL)

■ 菌盖：大，难以识别，菌盖半球形，中心轻度凹陷，灰色至赭奶油细长，菌肉浅灰至浅褐色，无香气但有股鼠气味，有这种气味的子实体更为纤细，曾被误为一变种，故名“鼠味粉褶菌”，无论何种开粉褶菌都有剧毒

• 生长分布：多生于肥沃的阔叶林地，尤其是山毛榉树下多见，广泛分布于温带地区，局部地区常见

• 相似种：多种相似种在色手和微特征上各有特征

△ 晶盖粉褶菌 (*E. chrysanthum*)

■ 生于春天，菌盖灰褐色，菌柄短，菌肉白色，浅灰色或灰色，然后变为粉色。101



菌柄

子实体群生，多见于落叶腐质层

和

神

今天我們

紫粉褶菌 (PORPHYRY PINK-GL)

几点主要特征，就能轻易地识别这种蘑菇了。凸形菌盖老熟后变圆锥形，菌柄白色，无特殊气味，也许有毒。

·生长分布：多生于荒野草地，
往往和蜡伞科、珊瑚菌科蘑菇
同生长。主要分布于欧洲，但不常见。




【字体表面有“中国铁路”

挑丝摸菌 (RED-DAPPLED WEB-CAP)

到南坡基部逐渐变成黄

• 生长分布：多生长于偏酸性



子 女 体 重

附件 1

鳞丝膜菌 (SCALY WEB-CAP)

鳞片，长菌柄有褐色菌幕环绕。未成熟子实体菌盖略呈半球形，成熟后逐渐变坦平，中心隆起。幼孢子实体的连生菌

褐色 气味清淡，从淡紫色、浅褐色果肉中散发出类似新鲜橘子的香味。

· 生长分枝

可与混合林的其他树种

广泛分布于北山地区



2013

154



红头红尾鸲 (RED-GILLED WEB CAP)

色彩均匀的红褐色和血红色菌褶是识别这种蘑菇的最好标记。半球形的嫩浅色至红褐色菌盖老熟后变得平展，但中心隆起。菌柄色还较淡，有蜘蛛般的残留菌幕。和保柄菌肉比较，菌盖菌肉呈浅红褐色。红褶丝膜菌是一种色泽很不错的染料。

• 生长分布：主要和针叶树形成菌根，常见于林场的杉木树下。广泛分布于北温带地区。

• 相似种：红铭丝膜菌 (*C. phoeniceus*) 的菌盖和环绕菌柄的菌幕色泽更是红得扎眼。

子实体群生于针叶树下。常
生于林下。



● 蘭明孝
平 理 生

子 孫 生

● 盧悅序
● 盧悅序

第 10 章 第 10 章



△黄棕丝膜菌 (*C. cinchonum*)

黃曆老黃曆黃曆老黃曆黃曆老黃曆

尺↑ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

恒子

可食性 

科 种 生长季节

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)


天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)

天竺葵丝膜菌 (PELARGONIUM WEB-CAP)



菌盖边缘有
蛛网状纤维

菌盖表面有
蛛网状纤维，
菌柄上部有
白色蛛网

侧面



子实体群生，但仅发生于苔
藓地上或松树林腐殖层上

尺寸 生长季节 可食性

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)

紫绒丝膜菌 (VIOLET WEB-CAP)



菌柄上部有
蛛网状纤维

侧面



子实体
系地带，群生

尺寸 生长季节 可食性

蜜环丝膜菌 (RED-BANDED WEB-CAP)

菌盖较大，半球形，菌肉厚实，呈橙褐色。菌盖表面覆盖细纤毛。菌柄长而结实，有非常显眼的肉桂红菌环围绕。菌盖边缘的残留菌幕显而易见。

· 生长分布：生长于潮湿林

地和沼泽地区，常与

桦树形成菌根，小部

分与其他树种形成菌

根。广泛分布于

北温带地区。

属于常见

种。

· 相似种：扭盖丝

膜菌 (*C. paragaudis*)

子实体略小，菌柄上的菌环色

泽与红，与针叶树形成共生



菌柄上的
菌环

子实体群生或单生

尺寸 菌盖直径 5—12cm | 菌柄 7—15cm × 1—3cm

可食性 有毒

带红色丝膜菌 (FOXY-ORANGE WEB-CAP)

是一种剧毒的可致命丝膜菌，散发中

似萝卜的气味。菌盖半球形，有尖角圆

凸，红橙色，覆盖纤毛。菌柄圆柱形至

棒形，橙褐色，环绕着淡黄至橘色的环带和残留菌

幕。菌柄中等粗细，浅橘褐色。凹生至连生，老熟

后颜色加深呈暗锈褐色。

· 生长分布：生长于酸性土，主要和

亚洲部分地区，局部地区常见。

· 相似种：同样是极毒的柠檬丝膜菌

(*C. limonius*) 的橙色更为鲜艳。山丝膜

菌 (*C. orellanus*，见第73页) 是较小的

圆锥形菌盖，和阔叶树相依而生。



子实体单生或群生于酸性土上

尺寸 菌盖直径 5—12cm

菌柄 7—15cm × 1—3cm

可食性 有毒

可食性 有毒

科 丝膜菌

种 *Cortinarius orellanus*

生 产 季 节

山丝膜菌 (COFFIN WEB-CAP)

这种致命毒蘑菇的红褐色菌盖为圆凸至平展形，表面纤毛密布。菌肉厚实、间隔疏松，凹生至连生，呈锈黄色。圆柱形菌柄呈浅黄褐色。菌柄上还有色泽较为深暗的线状残留菌幕，但跟带红色丝膜菌不同的是，这些残留物并不形成通常的环带。食用山丝膜菌将会严重损害肾脏，但中毒症状在食用后很长一段时间才显现出来。

- 生长分布：生长于酸性土壤，主要和广泛分布于欧洲的温带地区，北美地区亦见。



干实体主要是有小群生，多见于酸性土。

银紫丝膜菌 (SILVERY VIOLET WEB-CAP)

中等，中等间隔，淡蓝色至杜松色。

- 生长分布：通常和阔叶树形成菌根，也有些和针叶树形成菌根。多生长于酸性土壤。广泛分布于北温带地区。

- 相似种：皮尔松丝膜菌 (*C. mollis*) 的菌 (*C. camphoratus*) 和退紫丝膜菌 (*C. traganus*)


马铃薯，后者带有令人作呕的甜味。



子实体生长于落叶腐殖土，常生成部分群生。

挺括的菌柄呈黄褐色。

菌幕呈网状。



孢子

可溶性小

科	种	生长季节
牛肝菌科	野丝膜菌 (SHEATHED WEB-CAP)	夏季至秋季
子实体：菌盖半球形至钟形，表面有放射状纤维，颜色为淡紫色至米白色。菌柄粗壮，颜色与菌盖相似。菌肉厚实，颜色较淡。 • 生长分布：多生长于林地，主要和山毛榉树形成菌根。广泛分布于欧洲和北美东部。 • 相似种：斯伯托丝膜菌 (<i>C. subtorvus</i>) 色泽较暗，常和柳树或山毛榉树形成菌根。另外几个相似种的区别则以色泽或生长环境差异为标准。		
尺寸	菌盖直径 5-10cm，菌柄高 5-10cm	孢子
可食性：可食，但不可食。淡紫色至米白色的菌盖，菌柄粗壮，菌肉厚实。菌盖皮层味苦。		

科	种	生长季节
牛肝菌科	安塞尔丝膜菌 (PLUM-SCENTED WEB-CAP)	夏季至秋季
子实体：菌盖半球形至钟形，表面有放射状纤维，颜色为淡紫色至米白色。菌柄粗壮，颜色与菌盖相似。菌肉厚实，颜色较淡。 • 生长分布：多生长于林地，主要和山毛榉树形成菌根。广泛分布于欧洲和北美东部。 • 相似种：相似生长环境中还有加州金色丝膜菌 (<i>C. californicus</i>)。		
尺寸	菌盖直径 5-10cm，菌柄高 5-10cm	孢子
可食性：可食，但不可食。淡紫色至米白色的菌盖，菌柄粗壮，菌肉厚实。菌盖皮层味苦。		

科 担子菌纲 生长季节 夏 秋

黄环丝膜菌 (YELLOW-GRIDLED WEB-CAP)

光滑的半球形菌盖呈华丽的橙黄色；菌盖边缘常有残留菌幕，黄色菌环环绕粗壮的菌柄，十分抢眼。菌肉厚实，黄奶油

菌盖半球形，橙黄

• 生长分布：菜园、公园的树林、潮湿草坪均有生长，和桦树形成菌根，主要

• 相似种：克里切丝膜菌 (*C. chiduchus*) 菌盖颜色较深，生长在碱性土的阔叶树

下。臭丝膜菌 (*C. olidus*) 有深黄色菌盖，橄榄褐色菌幕，有浓郁的泥土味，但在桦树下少见。大丝膜菌 (*C. vaginus*) 菌盖色泽较红，可在松树林里找



子实体在



黄色菌柄，基

橙色粘质丝膜菌 (ORANGE SLIME WEB-CAP)


柄结实，白色，以上是这种蘑菇的典型标识。菌盖和白色菌柄都被黏糊糊的残留菌幕覆盖。菌肉白色，厚实，菌褶灰色至肉桂褐色

• 生长分布：菌根。分布在北温带地区、局部地区常见

• 相似种：粘柄丝膜菌 (*C. collinitus*) 常见于云杉树下，菌柄上有浅蓝色粘性物。其他的相似种生长在不同的寄主树下。



子实体在
树下



灰色、浅生

厚实的
白色菌肉

菌盖中心部位

剖面

尺寸 菌盖 8—10cm | 菌柄 7—12cm 1—2.5cm

孢子 丝状

可食性

苦味丝膜菌 (BITTER LAC WEB-CAP)

菌盖半球形、亮紫色。因其菌柄细长而使基部的球形膨起十分

显著。随着子实体的

老熟，菌盖从中心开

裂，为橘色至浅黄皮


单色。菌盖皮层味苦，菌肉

口味清淡；无食用价值，不相

荐食用

• 生长分布：主要和山毛榉树伴生，有根。分布于北温带地区，仅局部地区常见

• 相似种：紫绿丝膜菌 (*C. dibaphus*)，子实体稍大，色



子实体老熟

尺↑

↑

↑

可食性 不可

尺↑

↑

↑

紫红丝膜菌 (RED AND OLIVE WEB CAP)

大型蘑菇。属丝膜菌亚属，其主要识别特征是其子实体呈多种混合色泽，十分独特。菌盖半球形，红铜色，

边缘为微红粉色或橄榄绿色。菌柄较长，菌柄基部膨


起呈球形，同样是多种色彩混合。菌褶呈浅橄榄绿色或

淡紫色，菌肉白色。菌盖和菌柄上部的菌肉则呈淡紫色。

• 生长分布：多与山毛榉树和栎树形成菌根。广泛分布于欧洲。

• 相似种：包括紫绿丝膜菌 (*C. atrovirens*) 在内的几种其他丝膜菌亚属蘑菇都是橄榄色。紫绿丝膜菌暗橄榄色的菌盖

则是橄榄色至锈褐色。

△ 蓝丝膜菌 (*C. chrysocrenus*)

子实体多肉，菌盖有白色



剖面



子实体生长于碱性土的落叶层

尺↑

↑

↑

可食性 不可

科 种 生长季节 秋

华美丝膜菌 (SPLENDID WEB-CAP)


一种菌盖黄色、半球形、边缘波浪形的薄壳蘑菇。菌柄有纤维质的硫黄色残留菌幕，基部呈球形。氢氧化钾 (KOH) 可使黄色菌肉变色为粉红色。该种不大，仅是黏丝膜菌亚属的一个小成员。

• 生长分布：菌根菌，常见。

于欧洲，局部地区常见，世界分布区域不详。

• 相似种：()

菌 (*C. citrinus*)，子实体各



雅致丝膜菌 (ELEGANT WEB-CAP)

低半球形菌盖表面油滑。尽管有线头状的残留菌幕覆盖其上，菌柄仍显得色黄光滑。菌肉淡黄色。顶端略显蓝色，球形基部暗黄色。这种蘑菇

无味。

• 生长分布：()


分地区有分布。

• 相似种：金黄丝膜菌 (*C. aureofulvus*) 和香柄丝膜菌 (*C. osmophorus*) 也属于黏丝膜菌亚属。

余气味，口味有所不同。

同外，菌盖

非



尺寸 菌盖 6—10cm，菌柄 6—10cm → 2—3cm

孢子 银褐色

可食性 是

菌柄有菌环或环带

这

种蘑菇的菌盖呈半球形，菌柄粗壮，菌环明显。菌盖颜色为深褐色，菌柄颜色为浅褐色。菌褶呈凹生至直生。这种蘑菇通常生长在阔叶林下，喜欢潮湿的环境。它的味道鲜美，可以食用，但需要仔细辨别，以免误食有毒品种。

科

种

生长季节

金毛鳞伞 (GOLDEN SCALE-HEAD)

开覆盖。菌肉有一股好闻的气味，但不可食。

采

• 生长分布：属高柄蘑菇，寄生阔叶树，会令致枝干受腐破裂而危及阔叶林。山毛榉树下多见。酸橙、柳树下也有发现。广泛分布于北温带。

• 相似种：约翰尼球盖菇 (*P. johnii*)

菌盖上的黑色鳞片直立，向上。孢子较小。



菌面

• 菌盖的鳞片会

子实体

尺寸

孢子

可食性

系	科	种	P_{11}	m	生 活 季 节
---	---	---	----------	-----	---------

翹鱗環鰐傘 (SHAGGY SCALE HEAD)

另，菌盖边缘有清晰可见

无臭无味或略有萝卜味

·生长分布：城、林地的槲
树、欧洲花楸等阔叶树下均有
发现。广泛分布于北温带地区。

• 相似种：子实体较小，色泽较淡的拟皱褶环伞菌（*P. squarrosoides*）

葉面顯得特別粘滑。多生長于闊葉樹林地，但在歐洲極其少。

总 常见于北美。罗神蝶伞

(*Gymnopus junonius*, 见第 83 页) 的生长环境相同, 在

11

61

神 主 竹 子 子 子

黏土與菌落 (PORCELAIN FUNGUS)

[illegible]

• 生长分布：菌根菌，多寄生于山毛榉树，偶尔也见于栎树上，寄生蘑菇往往是高居于树根破损处，广泛分布于北温带。



子實體為生或單生于活樹或倒木上

Trifluoromethyl

蜜环菌 (HONEY FUNGUS)

大型伞菌。菌盖半球形、坦平，或呈波
良形；浅橄榄色或浅灰褐色，中心部位
色泽较暗。菌盖上有稀松分布的浅色鳞
片。淡橘黄色的菌柄细长，尖角形。
唯黄色壤土的白色菌环围绕其间。菌柄
基部呈丛状相连，宽间隔
的自生菌褶初起为白色，
随后变为粉褐色，老熟后
多出现暗色斑点。菌肉色
白厚实可食，但会引起胃
肠不适。

蜜环菌属
担子菌纲

蜜环菌属
担子菌纲

· 生长分布
多见于山毛榉树的倒木树
林上，分布于北温带。

蜜环菌属
担子菌纲



子实体几乎总是成丛生长，菌柄基部相连

科 担子菌纲 目 伞菌目 科 蜜环菌科 属 蜜环菌属


葱柄蜜环菌 (FINE SCALY HONEY FUNGUS)

菌柄粗壮，纤维质，菌环明显，白色至浅灰色。菌盖半
球形，中部隆起，茶色至赭色，上有分散的纤维质鳞片
间隔宽松的自生菌褶呈淡黄色至浅棕色。可食，但会引
起肠胃不适。

· 生长分布：林地、公园、菜园里均有生长。
主要生长于阔叶树的朽木上，针叶树木上也
可生长。分布广泛，北温带地区常见。

· 相似种：高卢蜜环菌 (*A. gallica*) 的
未成熟菌盖有浅色中心，菌环白色至黄
色。奥氏蜜环菌 (*A. ostroae*) 菌柄较厚实，

基部呈褐色，菌环大，
多为褐色，菌盖鳞片
较为粗糙。



子实体丛生或分散长于阔叶
树倒木上

蜜环菌属
担子菌纲



欧洲松菇 (BROWN MATSUTAKE)

• 球形至半展的菌盖表面干爽，布满褐色鳞片，菌环抢眼，上部菌柄白色纤维下部

似种蘑菇的笔统叫法。其类
有的能散发芬芳香
质肥美，但经特

• 生长分布：真正名
欧洲松菇原是指生长于
桦木和七叶树松树下的一种
蘑菇，后来也生长于北欧针
叶树下，形态相似的山菇也
归入。北美东部的阔叶
树下以及太平洋西北地区的
针叶树下也有分布

菌盖
20~30cm

初香紫时

菌柄

20~30cm



图 1 欧洲松菇 (Brown Matsutake)

科 红菇

松

子实体

美洲松菇 (WHITE MATSUTAKE)

后变得半展开，出现黄色至锈褐色的鳞片和斑点。菌环醒目，外张，保护着菌柄；其上方菌柄白色，下方菌柄老熟后呈浅褐色

• 生长分布：生长于针叶
树下，广泛分布于北美北
部和落基山脉南部，属常
见品种；在太平洋西北海
岸地区最为常见。

• 相似种：史密斯鹅膏 (*A. smithiana*，见第148页)，
没有辛辣气味，菌柄高
但菌盖下同样有松散的菌
幕碎片。

菌盖
20~30cm

菌柄
20~30cm



图 2 美洲松菇 (White Matsutake)

尺寸

孢子

可食性

科

目

生长季节 秋

长根滑锈伞 (ROOTING FAIRY CAKE)

学名: *Hypholoma fasciculatum* (Fr.) Berk.

别名: 长根滑锈伞、长根滑锈伞、长根滑锈伞

布的菌柄“根”深扎于地。在同属滑锈伞里,长根滑锈伞的菌环与众不同。菌肉白色,结实,有一股强烈的杏仁糖或苦杏仁的气味,口味微苦,这两项特征有助识别。

• 生长分布: 菌根菌。多见于排水良好的阔叶树林地,不仅与树形成菌根,生于树下,也可见于野鼠洞穴、粪坑茅棚边沿,广泛分布于北温带,但不常见。

• 相似种: 同属粘滑锈有些个头较小,无鳞,如:白粘滑锈(*H. pallidolucuosum*),有甜杏仁气,滑锈(见第78—79、91—92页)。

子实体: 菌盖: 1—2.5cm, 半球形至扁球形。

气味, 奇生于朽木之上。

● 菌盖表面

● 菌柄鳞片

● 菌柄鳞片

● 菌柄鳞片

● 菌柄鳞片

30-40

子实体多为单生, 常见于朽木附近排水良好地带。

[尺寸: 菌盖直径 1—2.5cm, 菌柄高 1—2.5cm]

孢子 颜色呈褐色

[可食性: 不可食]

金盖鳞伞 (GOLDEN CAP)

色，半球形。边缘多碎片，表面布满细粒小点。菌环外张显眼，菌环下部菌柄多有皱纹。菌褶稠密，米白色，间生，逐渐变黄褐色。由于孢子印呈赭褐色，这种蘑菇又被划分为丝膜菌科。可食，但会引发肠胃不适。

• 生长分布：生长于林地边缘或田野牧场，常与荨麻为邻，多见于肥沃土地，广泛分布于北温带地区，局部地区常见。

• 相似种：罗神裸伞 (*Gymnopilus perennis*，见下)，寄生于朽木上，菌盖菌柄有羊齿纹。



子实体



尺寸

++

+

++

孢子

可食性 可

材料

种

生长季节

橘黄裸伞 (GIANT FLAME-CAP)

起，边缘有线状残留菌丝——可借助这些特征识别这种形态多变的金黄色毒菇。菌盖平展，边缘有橙黄至灰色的

散落的菌环的孢子染色。菌环附近菌柄色泽较深，菌柄丰富，但味苦。因含有迷幻剂成分而不可食。

• 生长分布：生于阔叶树腐木，尤其是在倒木树干上或树桩附近。北温带分布。

• 相似种：金盖鳞伞有粉

牛乳伞

生于地

色

菌面



子实体多生于地面水平腐木

+ 1 +

尺寸

++

++

+

++

孢子

可食性 最

古巴裸盖菇 (SAN ISIDRO LIBERTY CAP)

属大型裸盖菇。菌盖钟形，中部隆起，黄褐色，表面有菌幕破裂的白色小鳞片覆盖。菌柄米白色，菌环甚重，因孢子散落而急速变黑。菌肉白色至奶油色，因破损而变蓝色。菌褶稠密，直生，成熟时呈紫褐色。有毒，含危险的迷幻剂成分。

• 生长分布：生长于亚热带、热带草地牧场。广泛分布并常见于北美的加勒比海海湾地区及热带地区。现有人工栽培。

• 相似种：半卵形斑褶菇

(*Panarolus semiovatus*，见第95页) 没有暗蓝色。



子实体单生或成群生于牧场草地的牛屎马粪堆上

鳞柄裸盖菇 (SCALY-STALKED PSILOCYBE)

这种较大型裸盖菇有两大特征：

一是菌盖初期时可出现同心圆鳞片，二是菌柄有独特菌环。

菌褶灰色或紫褐色至几乎全黑，边缘白色；菌柄有鳞片分布，米白色，老熟后渐变为褐色。不可食；浅褐色。

• 生长分布：多见于林地，生长于埋于土或半埋于土的阔叶树倒木或碎片锯屑。广泛分布于北温带，十分常见。

• 相似种：球盖菇类裸盖菇（见第88—90页）仅有微观差异。



子实体



剖面

茶树菇 (POPLAR FIELD-CAP)

菌盖半球形，浅赭白色，厚肉型。跟茶树菇属的多数真菌一样，气候干燥可使菌盖表面开裂。菌柄有发育良好的米白色菌环。老熟后变褐色。这是南欧广泛栽培的食用真菌，其浅色菌肉十分结实，闻和吃起来都有一股淀粉味道。

- 生长分布：生长于杨树、柳树倒木或修剪下的残枝上。广泛分布于北温带温暖地区和亚热带地区。
- 相似种：田头菇生长于碎木屑或草丛中，子实体一般较小。



● 菌盖宽
● 菌柄基部
● 菌环基部



● 菌柄基部
● 菌环基部



1-14

田头菇 (SPRINGFIELD CAP)

形态多变的田头菇通常长有菌环，但有时菌盖表面会开裂。菌肉白色，老熟后变褐色。可以食用，不过多数是味苦难吃。

- 生长分布：广泛分布于温带和亚热带地区。




子实体小型丛生或群生



● 菌盖宽
● 菌柄基部

● 菌柄基部
● 菌环基部

1-14



1-14

橙黄褐韧伞 (CONIFER TUFT)

褐色：浅色边缘上的残留菌幕明显可见。

• 生长分布：是为数不多的耐寒伞菌之一，除冬天特别寒冷的日子外，可经常见于


• 相似种：长根脆柄菇 (*H. radicosum*)，生长第

香浓郁

菌盖边缘有残菌幕

菌褶明密，直生

子实体为生成单生



簇状黄韧伞 (SULPHUR TUFT)

此外，菌肉口味十分辛辣，也

• 生长分布：多见于腐朽的阔叶树倒木、树桩、暴露树根等，广泛分布于北温带


• 生长分布：多见于腐朽的阔叶树倒木、树桩、暴露树根等，广泛分布于北温带



子实体

这些基部的更细幼果生长

菌柄表面有细



科

种

生长季节

栗蕈 (BRICK TUFT)

子实体以卵形出土，老熟时，这种大蘑菇。其特点还有：菌盖半球形，菌柄纤维质，上部浅黄色，基部浅红褐色。菌肉黄至红褐色，气味好闻，吃起来苦。

• 生长分布：林地、公园的阔叶树树桩或老根上可见。分布于北温带地区。

• 相似种：红柄丝盖伞 (*H. elongatum*)，

生于沼泽地带，有时混生于泥炭藓中。流苏丝盖伞 (*H. marginata*) 则群生于针叶林地或腐木残桩上。

色型菌时新事和子实为褐色



作绿褐色

剖面

子实体

尺寸

孢子

可食性

科

种

生长季节

皱盖罗鳞伞 (GYPSY)

子实体以卵形出土，老熟

菌盖表面黄褐色，有皱纹，中心部位有白色至淡紫罗兰色的

• 生长分布：菌根菌，多见于针叶林地，阔叶林地也有生长，常见于山毛榉树下。分布于北温带，但只在局部地区有见。

• 相似种：有些丝膜菌 (见第69—77页) 无真正菌环，孢子锈褐色



剖面

菌盖表面起皱

子实体群生或小群生于酸性土

尺寸

孢子

可食性

科

属

生长季节

蓝绿球盖菇 (BLUE-GREEN SLIME-HEAD)

的菌环不明显，菌柄蓝绿色，纤维质，有鳞片点斑

• 生长分布：生长于腐殖质上，也常见于碱性土的山毛榉树下。广泛分布于北温带地区。

• 相似种：铜绿球盖菇 (*S. aeruginosa*) 的孢子印和

pseudocyanea) 有一股



子实体


孢子印



孢子印



菌柄有鳞片



菌柄

橙黄球盖菇 (ORANGE SLIME-HEAD)

这是一种很有特色的食菌，子实体结实，有鲜艳橙黄色菌盖，常生长于林木的碎屑上。未成熟子实体菌盖

可食性未知

• 生长分布：喜生长于朽木碎屑或锯木的地区，欧洲分布广泛，属常见品种。

• 相似种：橙黄色变种鳞理盖菇 (*Polaxybe squamosa*)，外形更漂亮。

橙红色菌盖

橙黄色菌盖



子实体

菌柄

菌柄中等粗细

孢囊体



子实体群生，多出现在有遮荫的花圃里



菌盖较老

菌柄基部

子实体



子实体

大球盖菇 (BURGUNDY SLIME HEAD)

根据暴露阳光的程度，大球盖菇的菌盖光滑干燥，呈红色至棕褐色。随子实体老熟，钟形的菌盖渐变为半球形至扁平。菌柄米白色，有一道深色菌环围绕，菌环上端如束带紧裹菌柄，下端呈钩状形。菌柄基部膨大或呈球形，有显著

● 菌盖颜色

● 菌柄颜色

● 菌环颜色

● 菌柄基部颜色

· 生长分布：生长于腐木或草堆中。主要分布于欧洲、北美也有。

· 相似种：橙黄球盖菇子实体较小，为较鲜亮的橙红

色，则是离生菌褶。



一年可有两次明显盛产时期

花冠球盖菇 (GARLAND SLIME HEAD)

实，特别是在橘黄色的半球形菌盖部位，菌环狭窄几乎全贴附在白色菌柄上。菌柄由紫罗兰灰色变为深紫褐色。这种蘑菇还有十分浓郁的萝卜气

味、据报告，花冠球盖菇可能是一种毒蘑菇。

· 生长分布：常见于干燥环境下的草丛，包括菜园、公园、荒野和沙丘等地。广泛分布于北温带地区。

· 相似种：包括嗜盐球盖菇 (*S. halophila*) 和干燥球盖菇 (*S. melaspermia*) 在内的相似种，主要区别在于孢子的大小、色泽不同。

● 菌盖颜色

● 菌柄颜色

● 菌环颜色

● 菌柄基部颜色



子实体单生或几朵小群生长于砂质土壤丛中


● 菌盖颜色

● 菌柄颜色

尺寸 菌盖 5—6cm | 菌柄 2.5—4cm ± 0.4—1cm

孢子 浅紫褐色

可食性 不可食



半圈球盖菇 (DUNG SLIME-HEAD)

菌盖光滑，多是半球形，淡黄色；菌柄细长、粘滑、米白色。作许多相似种一样。半圈球盖菇的菌盖在气候潮湿时粘滑；菌柄有一道多不引人注意的小菌环，常常因孢子的散落而染成黑色。不可食，浅黄色肉细薄，有股淀粉气味。

·生长分布：多见于草地和牧场的牛、马、羊粪堆上，属于草食动物粪便的降解真菌之一。广泛分布于北温带及其他地区。

·相似种：球盖菇 (*Stropharia umbonatescens*) 的菌盖中间有隆起，孢托内只有2粒孢子，而半圈球盖菇有4粒。

夏秋季节
林间草地

子实体小群生，多见于粪堆

尺子 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm

科 担子菌门 担子菌纲 担子菌目 担子菌科 担子菌目 担子菌科

毛柄库恩菌 (TWO TONED WOOD TUFT)

·形态特征：菌盖半球形，直径2-4cm，表面光滑，浅棕色，边缘有细毛。菌柄细长，直径1-2cm，表面有细毛，基部有鳞片。菌肉浅棕色，质地柔软。孢子浅棕色，椭圆形，长2-3μm，宽1-2μm。子囊孢子浅棕色，椭圆形，长2-3μm，宽1-2μm。子囊孢子浅棕色，椭圆形，长2-3μm，宽1-2μm。

·生长分布：多见于林地、阔叶树。

·相似种：盘孢菌属的

此有毒种：单色盘孢伞 (*G. unicolor*) 和细条盖盘孢伞 (*G. marginata*) 与其相似，特点是菌环以下菌柄有纤毛，无鳞片。

·相似种：盘孢菌属的

此有毒种：单色盘孢伞 (*G. unicolor*) 和细条盖盘孢伞 (*G. marginata*) 与其相似，特点是菌环以下菌柄有纤毛，无鳞片。

·相似种：盘孢菌属的

此有毒种：单色盘孢伞 (*G. unicolor*) 和细条盖盘孢伞 (*G. marginata*) 与其相似，特点是菌环以下菌柄有纤毛，无鳞片。

·相似种：盘孢菌属的

此有毒种：单色盘孢伞 (*G. unicolor*) 和细条盖盘孢伞 (*G. marginata*) 与其相似，特点是菌环以下菌柄有纤毛，无鳞片。

·相似种：盘孢菌属的

此有毒种：单色盘孢伞 (*G. unicolor*) 和细条盖盘孢伞 (*G. marginata*) 与其相似，特点是菌环以下菌柄有纤毛，无鳞片。

·相似种：盘孢菌属的

此有毒种：单色盘孢伞 (*G. unicolor*) 和细条盖盘孢伞 (*G. marginata*) 与其相似，特点是菌环以下菌柄有纤毛，无鳞片。

·相似种：盘孢菌属的

此有毒种：单色盘孢伞 (*G. unicolor*) 和细条盖盘孢伞 (*G. marginata*) 与其相似，特点是菌环以下菌柄有纤毛，无鳞片。

·相似种：盘孢菌属的

此有毒种：单色盘孢伞 (*G. unicolor*) 和细条盖盘孢伞 (*G. marginata*) 与其相似，特点是菌环以下菌柄有纤毛，无鳞片。

·相似种：盘孢菌属的

此有毒种：单色盘孢伞 (*G. unicolor*) 和细条盖盘孢伞 (*G. marginata*) 与其相似，特点是菌环以下菌柄有纤毛，无鳞片。

尺子 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm

可食性：不可食

科 属 种 生长季节

单色盔孢伞 (WOOD-LOVING PIXIE-CAP)

菌盖半球形至大脐隆形，深褐色，干燥时变为浅黄褐色，边缘波浪形。菌环上部菌柄为米白色至纯褐色，菌环以下菌柄布满纤毛。菌柄狭窄，中等间隔，直立至轻微倾斜。盔孢伞类蘑菇需仔细识别，该属有7种蘑菇可引起严重中毒。

- 生长分布：常见于阔叶林的倒木上，也见于苔藓地、湿地的落叶腐殖质，多沼泽的阔叶林地。广泛分布于北温带地区。
- 相似种：可食的毛柄炸恩菌外形相似，但菌环以下无鳞片而布满纤毛。



尺寸 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

科 属 种 生长季节

桤生环锈伞 (ALDER SCALE-HEAD)

- 黄色或黄中带绿的菌盖，大密度群生，这是桤生环锈伞的两大特征。与属其他蘑菇的典型特点是有鳞片，但是桤生环锈伞和其他一些同属蘑菇的鳞片却不是很明显，通常只是未成熟子实体残留菌盖边缘的菌幕鳞片尚较清晰。菌柄粗曲，光滑，基部有较多纤毛，浅褐色。菌肉有一股好闻的气味，口味柔和。
- 生长分布：生长于桤木、桦树类的阔叶树倒木或腐木，针叶树少见；生长环境通常很潮湿，分布于北温带地区。
 - 相似种：桤生环锈伞又被分为三类：柳生环锈伞 (*P. salicicola*) 生长在柳树上，味苦；天麻环锈伞 (*P. flavida*) 和松生环锈伞 (*P. pinicola*) 生长于针叶树上。



尺寸 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

科 属 种 生长季节 可食性

科

目

至直性

赭绿鳞伞 (OCHRE GREEN SCALE-HEAD)

色泽加深 菌褶黄色至褐色。菌柄干燥，黄色至米白色，有鳞片覆盖 菌盖仅在潮湿状态下粘滑，并且快速干

· 生长分布 广泛分布于北温带
地路边

· 相似种：斯桑巴鳞伞 (*P. scumba*)，子实体较小，多生于针叶树林

生长于林中



剖面

子实体大群生或丛生于林边

粘牙鳞伞 (BEECH-LITTER SCALE-HEAD)

有盖半球形，米白色，淡黄色或浅灰色，表面一般都很圆滑。菌肉浅色，不可食，带稻草气味，口时有尖

· 生长分布：生于林地腐殖质堆，多见于山毛榉树林，但其他阔叶树林地也有生长，偶尔也见于针叶树林地。广泛分布于北温带

菌盖边缘上有时有
明显的辐射状裂

菌柄基部
往往呈球状



子实体较小，
上，单生或小群生



剖面

孢子

1. 爱性

地生鳞伞 (CHARCOAL SCALE-HEAD)

成略呈弯曲起伏、粘滑而闻名。菌柄

气味

· 生长分布

· 相似种

相似种

小菇 (*Mycena galopus*, 见

色泽较深

尺寸

中暗疣盖菇 (VEILED FARY CAKE)

菌盖灰褐色，半球形至中心突起，边缘色泽较浅，菌柄浅褐色。属有留存菌盖粘滑菇，其残留菌盖如精细米白色线条点缀于菌盖边缘。

萝卜气味

· 生长分布：菌根菌，生长于混杂林、公园、菜园，与诸多种类树木形成菌根，有时可发现于火烧地。广泛分布并常见于北温带地区。


· 相似种：近缘种缟白粘滑菇 (*H. cantalipes*) 用显微镜观察最好识别。

菌盖可生，
中至间弱




· 菌盖灰褐色，中
至间弱

· 菌盖生于
有子实体
的菌根



· 轻至中度



· 菌盖可生，
中至间弱

· 菌盖可生，
中至间弱

· 菌盖可生，
中至间弱



子实体生于阔叶树和针叶
树下

尺寸

尺寸

可食性


斑点红裸伞 (FRECKLED FLAME-CAP)

环不明显。菌柄上有锈色斑点

1. 但跟其他丝膜菌不同的是,裸伞属蘑菇不形成菌褶

• 生长分布: 长于朽木上, 常见于林地和种植园的针叶树, 广泛分布于北温带

• 相似种: (*G. picreus*) 具有黑色的菌柄和鲜黄色的菌褶



于实体多为小群生或散生

菌盖半球形至钟形, 干燥时呈浅黄褐色, 湿润时呈深红褐色



气 味
由 酸

山

孢子

可食性 可食

生长季节

树桩脆菇 (COMMON STUMP BRITTLE HEAD)

也就是那些种类较难区别的

(IBM), 至于树桩脆菇, 其典型特征是: 丛生、菌盖边缘

了散落染色为褐色。半球

形至钟形菌盖在潮湿时为


深红褐色, 干燥时呈浅黄褐色。还

可对孢子大小做精细检测, 以确保识别正确

• 生长分布: 生于林地腐朽的阔叶木上, 针叶

木少见; 多见于树桩周围 广泛分布并

常见于北温带地区



于实体生于阔叶树树桩周围, 大密度丛生



菌盖半球形至钟形, 干燥时呈浅黄褐色, 湿润时呈深红褐色

菌褶相当稀疏, 乳白色至红褐色

菌柄中空, 每柄当结实

气 味

尺寸 菌盖 1.5—6cm | 菌柄 3—10cm → 3—9mm

孢子 深紫褐色

可食性 可食


阿瑞尼锥盖伞 (RINGED CONE-CAP)

最常见的锥形盖伞种。

许多锥形菇的外形分外相似，最好是观察孢子以求准确识别。其菌盖边缘都有残留菌幕的鳞片或菌环。菌环一般松弛，容易脱落。菌褶排列相当稠密。丛生，多有白色边缘。所有的锥形菇种类都可能有毒。

• 生长分布：多生于养分丰富的肥沃土地。常和其他锥形盖伞、脆柄菇等同生长。广泛分布于亚洲、欧洲。

• 相似种：钵形锥盖伞 (*C. blattaria*) 和密生锥盖伞 (*C. pericincta*) 是2孢型担子，阿瑞尼锥盖伞则是4孢型担子。



子实体多是单生或几朵聚集生于沿路边旁

尺寸

++

+

++

尺寸

说明



科 担菌

| 种 *Cystoderma terreii*

| 生长季节 秋


砖红囊皮菌 (CINNABAR POWDER-CAP)

主要特征：菌盖砖红色，半球形至凹陷。表面似乎有粉粒状物密布；柄开菌柄的广地。菌盖白色鳞片。菌褶排列相当稠密。丛生，

有边缘绒毛。肉眼显微镜观察可见菌褶边缘的囊状体（一种特殊小孢子细胞）。

• 生长分布：生于各种类型林地和富含腐殖质的酸性土地。欧洲分布广泛。

• 相似种：有好几种囊皮菌生长在相似环境：疣盖囊皮菌的锈褐色较污暗。近缘的合生囊皮菌 (*C. adnansiforme*) 缺少囊状体，颜色更明亮。



子实体

尺寸 菌盖 2—8cm | 菌柄 3—7cm × 4—8mm

孢子 米白色

可食性 不可食

皱盖囊皮菌 (SAFFRON POWDER-CAP)

菌盖全平展，明亮赭黄色，表面粉状。菌柄短，有喙。菌环将很快脱落。短命菌环下的菌柄表面呈粉状。菌褶排列紧密，凹生，白色变奶油黄色，菌肉有毒气味，细黄。囊皮菌的识别最好是通过显微镜检查孢子大小以确认：皱盖囊皮菌孢子平均大小为 $6 \times 3 \mu\text{m}$ 。

• 生长分布：适应于各种环境：林地、鲜草堆、柳树上，也上均可生长。广泛分布并常见于北温带。

• 相似种：粉森斯囊皮菌 (*C. jaxomix*) 颜色较深，菌盖表面较粗糙；孢子较大 ($7 \times 4 \mu\text{m}$)。其他相似种的鉴别可根据其菌环：结实型，持久；粉森斯囊皮菌，粉紫色。



子实体单生或聚生，多出现在潮湿酸性土的青苔上。

尺寸 菌盖 1—4cm | 孢子

科 锈菌

种 *Cystoderma caryocarpae*

生长季节

粉灰色囊皮菌 (PINK-GREY POWDER-CAP)

除了菌盖，菌柄同为粉灰色外，还在于有明显的不规则状粉灰色菌环。和其他囊皮菌类似，菌盖和菌柄表面也呈粉状。菌褶白色，凹生，中等间隔。白色菌肉有难闻的腐臭味。

• 生长分布：生于阔叶林、针叶林地，荒野。分布于北温带部分地区。

• 相似种：臭囊皮菌 (*C. ambrosii*) 的子实体几乎纯白，老熟后略有褐色。金粉囊皮菌 (*C. fallax*) 的子实体则是黄褐色。

菌柄表面粉状，呈粉灰色，尤其是菌环以下部分。



子实体单生或聚生，多出现在酸性土和腐殖质上。

尺寸 菌盖 1—4cm | 孢子

孢子

可食性 不可食

菌蓋纖維質、孢子深色

木

本種菌類，其菌蓋和菌肉老熟後都變為紅色。綠灰色菌柄臨近基部纖維質頂端覆蓋色澤較淡的粉狀物。聞起來有一股似似于尿或馬廐的氣味。

• 生長分布：菌根菌。與生長于養分豐富土地上的闊葉樹形成菌根：公園、林地和路邊都見到。

• 相似種：角絲蓋傘（*L. corvulina*），有沙茶氣味。菌蓋呈綠色。

血紅絲蓋傘 (GREEN AND PINK FIBRE-CAP)

• 生長分布：菌根菌。與生長于養分豐富土地上的闊葉樹形成菌根：公園、林地和路邊都見到。

• 相似種：角絲蓋傘（*L. corvulina*），有沙茶氣味。菌蓋呈綠色。

• 生長分布：菌根菌。與生長于養分豐富土地上的闊葉樹形成菌根：公園、林地和路邊都見到。

• 相似種：角絲蓋傘（*L. corvulina*），有沙茶氣味。菌蓋呈綠色。

• 相似種：角絲蓋傘（*L. corvulina*），有沙茶氣味。菌蓋呈綠色。




• 凸圓平頂
特寬的菌蓋

• 幼嫩菌絲
上端呈粉狀

• 幼嫩，菌絲
細而柔軟，
幼嫩而平頂


• 菌絲口呈黑色



• 幼嫩菌絲
的菌柄上部



• 幼嫩菌絲
成網狀



• 幼嫩菌絲
成網狀

• 幼嫩菌絲
成網狀

剖面

• 幼嫩菌絲
成網狀



• 幼嫩菌絲
成網狀

尺寸： 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm

孢子： 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm

可食性： 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm

科 担子菌科 种 *Inocybe rubra* 生长季节 夏、秋

变红丝盖伞 (REDD SH FIBRE CAP)

担子菌纲，担子菌目，担子菌科，丝盖伞属。
菌盖直径 2-4 厘米，高 1-2 厘米，钟形至宽钟形或有不规则形。

红色。菌盖钟形至宽钟形或有不规则形。

菌柄高 1-2 厘米，直径 0.5-1 厘米，圆柱形。

菌柄基部有菌丝体，菌柄上部有菌丝体。

菌柄上部有菌丝体。

菌柄上部有菌丝体，表面有粉状物。

生长分布：生长于粘土或碱

性土，常与山毛榉、橡树、桦树等形成菌根。

根 分布于欧洲和亚洲部分地区，仅局部地区有见。

相似种：蔷薇色丝盖伞 (*Inocybe pudica*) 也可变成红色，但子实体更

小。



菌柄变红

侧面

菌盖顶部

子实体

中

尺寸 1-2 厘米 高度 1-2 厘米 孢子 深褐色 可食性 否

科 担子菌科 种 *Inocybe godeyi* 生长季节 秋

哥迪丝盖菌 (WHITE AND RED FIBRE-CAP)

担子菌纲，担子菌目，担子菌科，丝盖伞属。
菌盖直径 2-4 厘米，高 1-2 厘米，钟形至宽钟形或有不规则形。
菌柄高 1-2 厘米，直径 0.5-1 厘米，圆柱形。

生长分布：菌类菌：和阔叶树形成菌根，特别是生长在碱性土上的山毛榉树。分布于欧洲。

仅存局部地区有见。


相似种：蔷薇色丝盖伞

(*Inocybe pudica*) 也是白

色，老熟后变成浅

粉红色，但菌柄不

变红。



菌柄变红

白色菌肉变红色

侧面

中等菌根



子实体与菌根在路边


尺寸 1-2 厘米 高度 1-2 厘米 孢子 深褐色 可食性 否

科 丝盖伞	种 <i>Inocybe</i>	生长季节 秋
-------	------------------	--------

污白丝盖伞 (WHITE FIBRE-CAP)

菌盖薄，菌柄细长，菌丝纤细，菌盖边缘因老熟上翻而易被撕裂。子实体呈深灰色。菌柄上部覆盖细粉粒；基部扩大，但不是球状。菌褶黄中带红。

- 生长分布：菌根菌，多生于肥沃地上，与阔叶树形成菌根，往往在林地道路分布，广泛分布并常见于北温带。
- 相似种：油桐丝盖伞 (*I. undonata*) 呈白色，但较为粗壮结实，其他



尺寸	孢子	毒性
----	----	----

科 丝盖伞	种 <i>Inocybe rimosa</i>	生长季节 夏-秋
-------	-------------------------	----------

锈丝盖伞 (STRAW-COLOURED FIBRE-CAP)

的放射状纤毛；菌盖边缘因老熟上翻而易被撕裂。子实体呈深灰色。菌柄上部覆盖细粉粒；基部扩大，但不是球状。菌褶黄中带红。

- 生长分布：菌根菌，多生于肥沃地上，与阔叶树形成菌根，往往在林地道路分布，广泛分布并常见于北温带。
- 相似种：斑丝盖伞 (*I. maculata*) 相当常见，菌盖深红褐色，有米白色菌幕碎片；浅色菌柄基部可形成小球状。丝盖伞种类繁多，差异也非常细微。



尺寸	孢子	毒性
----	----	----

科	科	生长季节
---	---	------

浅灰紫丝盖伞 (GREY AND LAC FIBRE-CAP)

赭褐色、半球形有凸起的菌盖上覆盖细小褐色鳞片。多鳞的纤维质菌柄呈淡紫色，菌盖下的淡紫色菌肉明显可见。无球状菌柄基部

- 生长分布：生长于肥沃土地，和阔叶树形成菌根，和其他的近缘种一样，常可发现于小径路边
- 相似种：卷曲丝盖伞 (*I. cucinnata*) 菌盖颜色较深，菌柄淡紫色近顶端部色泽较淡



尺寸	孢子	可食性
----	----	-----

暗毛丝盖伞 (TORN FIBRE-CAP)

子实体暗褐色至深褐色，菌盖被粘糊纤维毛和鳞片覆盖，半球形。幼体子实体的菌盖边缘可见有纤维质的褐色菌柄基部不形成球状，有

- 加深，在基部呈深色。这是一类变种蘑菇。在显微镜中见到的光滑棒状体孢子和厚壁囊状体有助识别
- 生长分布：和包括橡树、针叶树在内的各种树木
- 相似种：暗毛丝盖伞 (1)
- 孢子上有结节。



尺寸	孢子	可食性
----	----	-----

星孢丝盖伞 (STAR-SPORED FIBRE-CAP)

菌柄基部纤细，粉状颗粒覆盖，膨胀成独特的扁球形。菌盖有轻度凸结，暗白色，被粗糙的放射状深红褐色纤毛遮蔽。这些就是星孢丝盖伞的独有特征。显微镜检查可看到星形孢子：丝盖伞属孢子通常光滑有结节，所谓星形不过是结节极端突起而已。



• 生长分布：常与榛树或山毛榉类的阔叶树形成菌根，多生长于空地。广泛分布于北温带，但较少见。

• 相似种：珍珠孢丝盖伞 (*L. margaritiformis*) 有星形孢子，菌盖颜色较暗，较黄、纳皮。可丝盖伞 (*L. napipes*) 菌柄基部无明显

扁球，子实体较小，孢子有普通结节。



子实体单生或几朵聚集



• 星孢丝盖伞
平球型，黄褐色



• 星孢丝盖伞
平球型，黄褐色

• 珍珠孢丝盖伞
的加大菌根

剖面

尺寸

孢子

可食性

科 担子菌

种 *Laccaria velutina*

生长季节 秋

绒毛鬼伞 (WEEPING WIDOW)

菌盖颜色由灰变黑，间隔疏松气生。未成熟子实体的菌盖边缘可看到白

滴滴的牛奶状渗出液——故又被

菌孢子。干燥时变成黑色斑点。

• 生长分布：腐生营养方式，生长于肥沃土地。北温带广布。

• 相似种：有包括闪光鬼伞 (*L. glareosa*) 和烟火色鬼伞 (*L. pyrotricha*) 在内的好几个相似种。

• 相似种：有包括闪光鬼伞 (*L. glareosa*) 和烟火色鬼伞 (*L. pyrotricha*) 在内的好几个相似种。

• 相似种：有包括闪光鬼伞 (*L. glareosa*) 和烟火色鬼伞 (*L. pyrotricha*) 在内的好几个相似种。

• 相似种：有包括闪光鬼伞 (*L. glareosa*) 和烟火色鬼伞 (*L. pyrotricha*) 在内的好几个相似种。



子实体 + 菌盖 + 菌柄 + 菌根

尺寸

孢子

可食性

菌盖光滑、子实体大小中等

木 1. 粉反紫蜡伞，子实体中等大小，菌盖光滑，幼体时呈圆锥形，成熟后呈放射状撕裂。菌柄脆弱易碎，难以支持菌体。暗粉色至白色的菌肉口味清淡，但不主张食用，一是为保护稀有物种，二则其菌肉易碎，难以烹饪。该菌在草地和苔藓中生长，有时也见于林下。分布广泛，包括欧洲、北美和亚洲。许多国家和地区将其列为稀有物种。

科 伞菌科 属 蜡伞属 生长季节 夏季至秋季

粉反紫蜡伞 (PINK WAX CAP)

属稀有蘑菇。子实体易碎，但外表优雅别致。粉红色彩朦胧暗淡。幼体子实体菌盖为圆锥形。成熟张开后逐渐呈放射状撕裂。菌柄脆弱易碎，难以支持菌体。暗粉色至白色的菌肉口味清淡，但不主张食用，一是为保护稀有物种，二则

粉红色的菌柄顶端

• 生长分布：常见于没有施用过商业肥料的草地牧场，通常是碱性土。分布于包括北大西洋岛屿在内的整个欧洲区域。

• 相似种：同属稀有真菌，形态相似的名橙蜡伞 (*H. curvirostris*) 呈黄绿褐色。尽管其他蜡伞属物种都有圆锥形菌盖，但只有粉反紫蜡伞 (*H. conocybe*) 在成熟后会变成黑色。变黑蜡伞 (见第104页) 则在老熟后色泽变黑。栗色蜡伞 (*H. spadicea*) 菌盖深色，菌肉黄色，不变黑。

粉反紫蜡伞的菌柄
幼体时呈圆锥形，老后

• 菌盖更薄于

菌柄菌肉白色

剖面

菌柄基部
• 无

子实体小群生于草地和苔藓中

尺寸 1-2 cm 高 1-2 cm 宽 1-2 cm

孢子

可食性 101

科 蜡伞

种 *Hygrocybe conica*

生长季节

变黑蜡伞 (BLACKENING WAX-CAP)




略呈圆锥形的菌盖干燥多毛；菌柄黄

白色，干燥时变黑；菌盖和菌柄干燥时变黑

多种环境的一个种类。子实体老熟后或接触而变黑，可能有微毒。

• 生长分布：除特别肥沃土地外，可发生在所有草地。广泛分布于北温带地区。

• 相似种：宿存蜡伞 (*H. persistens*) 菌盖色泽更为光亮，不发生变色。



尺寸 孢子 可食性

金黄蜡伞 (GOLDEN WAX-CAP)

大型蜡伞，色泽多变，囊括了从橙黄色至淡黄色的各种类型；菌盖粘滑，半球形至坦




柄粘滑，但顶端部分多呈粉状表面。可食，

• 生长分布：生长于旷野、草地，多与其他蜡伞混生。广泛分布于北温带

• 相似种：槲树蜡伞 (*H. ceraceae*)

生成延生滴蜡。粘蜡伞 (*H. glutinipes*) 甚至更小，菌盖

有褶。



尺寸 孢子 可食性

科

种

生长季节


绯红蜡伞 (SCARLET WAX-CAP)

钟形菌盖，表面轻度木纹状，平常干燥，天气湿润时变粘滑；直生菌褶，这些特征有助于区别其他红色蜡伞属真菌。可食，但需认真加工。



子实体群生或小群生，菌盖直径4—6cm，菌柄高4—8cm，菌盖和菌柄均为红色，菌柄基部有白色粉末状物质。需进行显微镜检测识别和用十分专业的特殊术语进行说明。

• 生长分布：发生于各种类型的荒野草地，广泛分布并相当常见于北温带地区。

• 相似种：红湿蜡伞和华丽蜡伞 (*H. splendidissima*) 菌肉较厚，菌柄丛生，华丽蜡伞的菌柄接近光滑，有似乎香甜的气味。



子实体群生或小群生



剖面

菌褶、直生

尺寸 菌盖 Φ 1.5—6cm | 菌柄 $\pm$ 4—8cm $\leftrightarrow$ 0.4—1cm

孢子

可食性

科

种

生长季节

青绿湿伞 (PARROT WAX-CAP)


要识别这种漂亮蘑菇并不容易，因为各个时期采摘的子实体颜色变化非常广泛。幼

老熟时先后呈紫色、橙色、黄色。菌柄则

有白色粉末状物质。生长于北温带地区，广泛分布并相当常见。

• 生长分布：发生于各种类型的荒野草地，广泛分布并相当常见于北温带地区。

• 相似种：与华丽蜡伞相似，只是子实体不呈绿色。而



菌盖菌柄

子实体小群生，多生于草地

可食

剖面

尺寸 菌盖 Φ 1.5—6cm | 菌柄 $\pm$ 4—8cm $\leftrightarrow$ 0.4—1cm

孢子

可食性

科

社

年长型前

白蜡伞 (SATIN WAX-CAP)

菌盖闪光发亮、半球形至坦平、白色。

在 40 岁 7 月 1 日 至 7 月 31 日 止

$$\left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \right]_{-1}^1 + \left[\frac{1}{\sqrt{\pi}} \right]_{-1}^1 = 0$$

1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{3}$ 3. $\frac{1}{4}$ 4. $\frac{1}{5}$ 5. $\frac{1}{6}$ 6. $\frac{1}{7}$ 7. $\frac{1}{8}$ 8. $\frac{1}{9}$ 9. $\frac{1}{10}$ 10. $\frac{1}{11}$ 11. $\frac{1}{12}$ 12. $\frac{1}{13}$ 13. $\frac{1}{14}$ 14. $\frac{1}{15}$ 15. $\frac{1}{16}$ 16. $\frac{1}{17}$ 17. $\frac{1}{18}$ 18. $\frac{1}{19}$ 19. $\frac{1}{20}$ 20. $\frac{1}{21}$ 21. $\frac{1}{22}$ 22. $\frac{1}{23}$ 23. $\frac{1}{24}$ 24. $\frac{1}{25}$ 25. $\frac{1}{26}$ 26. $\frac{1}{27}$ 27. $\frac{1}{28}$ 28. $\frac{1}{29}$ 29. $\frac{1}{30}$ 30. $\frac{1}{31}$ 31. $\frac{1}{32}$ 32. $\frac{1}{33}$ 33. $\frac{1}{34}$ 34. $\frac{1}{35}$ 35. $\frac{1}{36}$ 36. $\frac{1}{37}$ 37. $\frac{1}{38}$ 38. $\frac{1}{39}$ 39. $\frac{1}{40}$ 40. $\frac{1}{41}$ 41. $\frac{1}{42}$ 42. $\frac{1}{43}$ 43. $\frac{1}{44}$ 44. $\frac{1}{45}$ 45. $\frac{1}{46}$ 46. $\frac{1}{47}$ 47. $\frac{1}{48}$ 48. $\frac{1}{49}$ 49. $\frac{1}{50}$ 50. $\frac{1}{51}$ 51. $\frac{1}{52}$ 52. $\frac{1}{53}$ 53. $\frac{1}{54}$ 54. $\frac{1}{55}$ 55. $\frac{1}{56}$ 56. $\frac{1}{57}$ 57. $\frac{1}{58}$ 58. $\frac{1}{59}$ 59. $\frac{1}{60}$ 60. $\frac{1}{61}$ 61. $\frac{1}{62}$ 62. $\frac{1}{63}$ 63. $\frac{1}{64}$ 64. $\frac{1}{65}$ 65. $\frac{1}{66}$ 66. $\frac{1}{67}$ 67. $\frac{1}{68}$ 68. $\frac{1}{69}$ 69. $\frac{1}{70}$ 70. $\frac{1}{71}$ 71. $\frac{1}{72}$ 72. $\frac{1}{73}$ 73. $\frac{1}{74}$ 74. $\frac{1}{75}$ 75. $\frac{1}{76}$ 76. $\frac{1}{77}$ 77. $\frac{1}{78}$ 78. $\frac{1}{79}$ 79. $\frac{1}{80}$ 80. $\frac{1}{81}$ 81. $\frac{1}{82}$ 82. $\frac{1}{83}$ 83. $\frac{1}{84}$ 84. $\frac{1}{85}$ 85. $\frac{1}{86}$ 86. $\frac{1}{87}$ 87. $\frac{1}{88}$ 88. $\frac{1}{89}$ 89. $\frac{1}{90}$ 90. $\frac{1}{91}$ 91. $\frac{1}{92}$ 92. $\frac{1}{93}$ 93. $\frac{1}{94}$ 94. $\frac{1}{95}$ 95. $\frac{1}{96}$ 96. $\frac{1}{97}$ 97. $\frac{1}{98}$ 98. $\frac{1}{99}$ 99. $\frac{1}{100}$ 100. $\frac{1}{101}$ 101. $\frac{1}{102}$ 102. $\frac{1}{103}$ 103. $\frac{1}{104}$ 104. $\frac{1}{105}$ 105. $\frac{1}{106}$ 106. $\frac{1}{107}$ 107. $\frac{1}{108}$ 108. $\frac{1}{109}$ 109. $\frac{1}{110}$ 110. $\frac{1}{111}$ 111. $\frac{1}{112}$ 112. $\frac{1}{113}$ 113. $\frac{1}{114}$ 114. $\frac{1}{115}$ 115. $\frac{1}{116}$ 116. $\frac{1}{117}$ 117. $\frac{1}{118}$ 118. $\frac{1}{119}$ 119. $\frac{1}{120}$ 120. $\frac{1}{121}$ 121. $\frac{1}{122}$ 122. $\frac{1}{123}$ 123. $\frac{1}{124}$ 124. $\frac{1}{125}$ 125. $\frac{1}{126}$ 126. $\frac{1}{127}$ 127. $\frac{1}{128}$ 128. $\frac{1}{129}$ 129. $\frac{1}{130}$ 130. $\frac{1}{131}$ 131. $\frac{1}{132}$ 132. $\frac{1}{133}$ 133. $\frac{1}{134}$ 134. $\frac{1}{135}$ 135. $\frac{1}{136}$ 136. $\frac{1}{137}$ 137. $\frac{1}{138}$ 138. $\frac{1}{139}$ 139. $\frac{1}{140}$ 140. $\frac{1}{141}$ 141. $\frac{1}{142}$ 142. $\frac{1}{143}$ 143. $\frac{1}{144}$ 144. $\frac{1}{145}$ 145. $\frac{1}{146}$ 146. $\frac{1}{147}$ 147. $\frac{1}{148}$ 148. $\frac{1}{149}$ 149. $\frac{1}{150}$ 150. $\frac{1}{151}$ 151. $\frac{1}{152}$ 152. $\frac{1}{153}$ 153. $\frac{1}{154}$ 154. $\frac{1}{155}$ 155. $\frac{1}{156}$ 156. $\frac{1}{157}$ 157. $\frac{1}{158}$ 158. $\frac{1}{159}$ 159. $\frac{1}{160}$ 160. $\frac{1}{161}$ 161. $\frac{1}{162}$ 162. $\frac{1}{163}$ 163. $\frac{1}{164}$ 164. $\frac{1}{165}$ 165. $\frac{1}{166}$ 166. $\frac{1}{167}$ 167. $\frac{1}{168}$ 168. $\frac{1}{169}$ 169. $\frac{1}{170}$ 170. $\frac{1}{171}$ 171. $\frac{1}{172}$ 172. $\frac{1}{173}$ 173. $\frac{1}{174}$ 174. $\frac{1}{175}$ 175. $\frac{1}{176}$ 176. $\frac{1}{177}$ 177. $\frac{1}{178}$ 178. $\frac{1}{179}$ 179. $\frac{1}{180}$ 180. $\frac{1}{181}$ 181. $\frac{1}{182}$ 182. $\frac{1}{183}$ 183. $\frac{1}{184}$ 184. $\frac{1}{185}$ 185. $\frac{1}{186}$ 186. $\frac{1}{187}$ 187. $\frac{1}{188}$ 188. $\frac{1}{189}$ 189. $\frac{1}{190}$ 190. $\frac{1}{191}$ 191. $\frac{1}{192}$ 192. $\frac{1}{193}$ 193. $\frac{1}{194}$ 194. $\frac{1}{195}$ 195. $\frac{1}{196}$ 196. $\frac{1}{197}$ 197. $\frac{1}{198}$ 198. $\frac{1}{199}$ 199. $\frac{1}{200}$ 200. $\frac{1}{201}$ 201. $\frac{1}{202}$ 202. $\frac{1}{203}$ 203. $\frac{1}{204}$ 204. $\frac{1}{205}$ 205. $\frac{1}{206}$ 206. $\frac{1}{207}$ 207. $\frac{1}{208}$ 208. $\frac{1}{209}$ 209. $\frac{1}{210}$ 210. $\frac{1}{211}$ 211. $\frac{1}{212}$ 212. $\frac{1}{213}$ 213. $\frac{1}{214}$ 214. $\frac{1}{215}$ 215. $\frac{1}{216}$ 216. $\frac{1}{217}$ 217. $\frac{1}{218}$ 218. $\frac{1}{219}$ 219. $\frac{1}{220}$ 220. $\frac{1}{221}$ 221. $\frac{1}{222}$ 222. $\frac{1}{223}$ 223. $\frac{1}{224}$ 224. $\frac{1}{225}$ 225. $\frac{1}{226}$ 226. $\frac{1}{227}$ 227. $\frac{1}{228}$ 228. $\frac{1}{229}$ 229. $\frac{1}{230}$ 230. $\frac{1}{231}$ 231. $\frac{1}{232}$ 232. $\frac{1}{233}$ 233. $\frac{1}{234}$ 234. $\frac{1}{235}$ 235. $\frac{1}{236}$ 236. $\frac{1}{237}$ 237. $\frac{1}{238}$ 238. $\frac{1}{239}$ 239. $\frac{1}{240}$ 240.

4. 附註

·生长分布 和生长于肥沃土地的山毛榉树形

此、相

陈鹤琴

▲ 富貴亭台，
老與新通著
實事求是

蕭煒 著

2. 4. 11

白 色 廣 告 ●

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

卷一 中華通志

結 語

子实体生于落叶腐殖质堆，小型丛生。

此

五

] 1244 [1245]

科 藜科 *Chenopodiaceae* β_1

五世宗師

平田头菇 (COMMON FIELD-CAP)

通常，这种蘑菇的橘黄色菌盖是光滑而微有凸起的坦面形，没有菌褶，也没有任何独特之处。菌柄结实，圆柱形，直立；浅色

$$4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad 9 \quad 10 \quad 11 \quad 12 \quad 13 \quad 14 \quad 15 \quad 16 \quad 17 \quad 18 \quad 19 \quad 20 \quad 21 \quad 22 \quad 23 \quad 24 \quad 25 \quad 26 \quad 27 \quad 28 \quad 29 \quad 30 \quad 31 \quad 32 \quad 33 \quad 34 \quad 35 \quad 36 \quad 37 \quad 38 \quad 39 \quad 40 \quad 41 \quad 42 \quad 43 \quad 44 \quad 45 \quad 46 \quad 47 \quad 48 \quad 49 \quad 50 \quad 51 \quad 52 \quad 53 \quad 54 \quad 55 \quad 56 \quad 57 \quad 58 \quad 59 \quad 60 \quad 61 \quad 62 \quad 63 \quad 64 \quad 65 \quad 66 \quad 67 \quad 68 \quad 69 \quad 70 \quad 71 \quad 72 \quad 73 \quad 74 \quad 75 \quad 76 \quad 77 \quad 78 \quad 79 \quad 80 \quad 81 \quad 82 \quad 83 \quad 84 \quad 85 \quad 86 \quad 87 \quad 88 \quad 89 \quad 90 \quad 91 \quad 92 \quad 93 \quad 94 \quad 95 \quad 96 \quad 97 \quad 98 \quad 99 \quad 100$$

9.1 x 10⁻⁷ f F

几个科

· 生长分布	多	多	多	多	多
--------	---	---	---	---	---

(continued)

相似种

(*A. arvensis*) 菌柄多绒毛; 近缘种缺

[illegible]

1. 11. 5. 13. 4

[illegible]

唐初結實，養
面有少許紅暈

Time

可食性纖維

尺寸

卷二

科 伞菌目 种 巨囊菌 生长季节 夏、秋

巨囊菌 (CUCUMBER-SCENTED TOADSTOOL)

巨囊菌 (Cucurbitaria) 是一种大型、肉质、伞形的真菌，通常在潮湿、阴暗的环境中生长。它的菌盖呈半球形，颜色为深褐色或黑色，边缘有细密的褶皱。菌柄粗壮，呈圆柱形，颜色为浅褐色。菌肉厚实，质地柔软，有黄瓜的气味。巨囊菌的孢子印呈深褐色，形状为椭圆形。

· 生长分布

地上。广泛分布于北温带，但仅相当有限的局部地区有见。



子实体 大小 1-2cm

中等大小



菌盖边缘
暗褐色

菌盖半球形，
菌柄粗壮



剖面

尺寸 菌盖直径 8-14cm 菌柄高 2-4cm

孢子

可食性 不可食

科 伞菌目 种 多足小脆柄菇 子实体特征

多足小脆柄菇 (TUFTED BRITTLE-HEAD)

多足小脆柄菇 (Mycena) 是一种小型、肉质、伞形的真菌，通常在潮湿、阴暗的环境中生长。它的菌盖呈半球形，颜色为深褐色或黑色，边缘有细密的褶皱。菌柄粗壮，呈圆柱形，颜色为浅褐色。菌肉厚实，质地柔软，有黄瓜的气味。多足小脆柄菇的孢子印呈深褐色，形状为椭圆形。

· 生长分布

地上，常见于郊区、路边。广布于欧洲。


· 相似种：树根脆柄菇 (见第94页)。生长于荒野山地里的其他簇状伞菌还有荷叶

类，这些食菌的孢子印都是白色。



子实体 大小 1-2cm
丛生。根深扎于草地

类，这些食菌的孢子印都是白色。



中等大小



菌盖边缘
暗褐色
· 菌柄粗壮

剖面

菌盖边缘
暗褐色

尺寸 菌盖直径 0.8-4cm 菌柄高 8-14cm 2-4mm

孢子

可食性 不可食

科 粉褶菌科 种 *Entoloma nitidum* 生长季节 夏、秋

星孢粉褶菌 (STAR-SPORED PINK-GILL)

特征 是“星形孢子”。菌盖红褐色至灰褐色，近锥形。

口味 都有一股杏仁味。

生长分布 多见于公园、体育场草地、林地草丛中。

地上也有发现。广泛分布。

并常见于北温带。

相似种 有多种外形相似。

相似的粉褶菌，如

白色粉褶菌和丝光

粉褶菌，后者是色

泽略深的暖虫褐


色。区别在于孢子

是直立孢子，而非

星形。

△丝光粉褶菌 (*E. sericeum*)

中欧洲常见的普通蘑菇。



丝光粉褶 子实体单生或成小群

尺寸 4-6cm 孢子 可食性 可食

科 粉褶菌科 种 *Entoloma nitidum*

生长季节 夏、秋

暗蓝粉褶菌 (STEEL BLUE PINK GILL)

菌盖 扭曲，菌褶疏松，白色、直生，老熟后变淡粉色。

有盖肉白色，近皮层处显蓝色，有

一股淡淡的气味。应属不可食真菌。

生长分布 生长于湿地苔藓、酸性

针叶林地、种植园。主要分布于

北欧洲和邻近亚洲的部分地区。

相似种 鲍克斯姆粉褶菌 (*E.**bloxamu*) 色泽较深，多见于碱性草地；紫草粉褶伞 (*E. euchroum*) 子

实体较小，较深蓝色，生长于阔叶

树林地。




子实体单生或成小群生于潮湿林地

尺寸 3-5cm 孢子 可食性 不可食

科 担子菌门 主要季节

梭柄金钱菌 (SPINDLE-SHANK)

菌盖 菌柄 菌褶 菌丝 孢子
性菌柄 一要想从地下取出完
菌盖 准备适当的
菌盖 褐色的菌盖
外形多变：半球形
侧凸形或不规则形
下部色泽较浅；暗
白色的纤维质菌肉为淡
而无味，无特殊气味
• 生长分布：寄生兼腐生菌，多长
于老橡树根上；公园和老树林地有见
分布于欧洲多橡树地区，相当常见



菌盖呈深褐色，
菌柄较细。




子实体发生于橡树根上，山

尺寸 孢子 可食性

褐黄金钱菌 (RUSSET TROUGH-SHANK)

菌盖 菌柄 菌褶 菌丝 孢子
• 往往被一种似果冻的粘糊糊寄生
菌柄光滑，与菌柄
色泽相似，邻近顶部色泽变淡，可
食，但薄嫩的菌肉吃之无味
• 生长分布：多生长于林地草场，落叶堆
肥和富含腐殖质土地。常见于北温带地区
• 相似种：湿金钱菌 (*C. aquosa*) 有浅粉
色的假根，奥克金钱菌 (*C. oclor*) 是深色菌盖和浅黄
菌褶。这两种真菌子实体
主要出现于晚春至夏季。纯



菌盖呈深褐色，
菌柄较细。

子实体发生于落叶腐殖土堆
上，群生

尺寸 孢子 可食性

科

担子菌门

伞菌目



红柄小皮伞 (RED-STEMMED TOUGH-SHANK)

菌盖：半圆形至钟形，干燥时表面有细密的鳞片，湿润时则光滑。菌柄：粗壮，基部有根状菌索。菌肉：厚，质地坚韧。孢子：近球形，表面光滑。

狐红色。菌肉在菌盖为白色，在菌柄侧为红褐色。气味模糊，尝而无味，没有食用价值。

- 生长分布：生长于阔叶树林地，多见于长有苔藓的树干或倒木腐木上。世界各地均有分布。
- 相似种：堆金钱菌 (*C. acercola*)，子实体丛生，生长于针叶树林地。赭黄金钱菌 (*C. acercola*)，子实体丛生，生长于针叶树林地。赭黄金钱菌 (*C. acercola*)，子实体丛生，生长于针叶树林地。

尺寸：菌盖直径 5-10cm，菌柄高 10-20cm。孢子：近球形，直径 4-6μm。



菌盖

孢子

菌柄

子实体丛生或单生，但单生

科

担子菌门



伞菌目

乳酪金钱菌 (BUTTERY TOUGH-SHANK)

这种蘑菇最容易被识别的特征是：菌盖油腻光滑，菌柄基部呈棒形。菌肉结实，含纤维质，菌柄中空或有一道软髓；可食用，但不值一尝。

- 生长分布：生长于阔叶树林地，多见于腐殖质层和落叶土堆。广泛分布并盛产于北温带地区。
- 相似种：酸性林地上生长、色泽更深的相似真菌。有时被分成单独一种：丝膜金钱菌 (*Collybia filamentosa*)。

尺寸：菌盖直径 5-10cm，菌柄高 10-20cm。孢子：近球形，直径 4-6μm。



菌盖

孢子

菌柄

子实体群生于落叶土壤上

丛生金钱菌 (TUFTED TOUGH SHANK)

成簇聚集生长。菌柄细长，菌盖灰白色毛绒。

菌盖面，浅灰白色，看起来比

别的金钱菌要小。丛生金

钱菌还有一股淡淡的好闻香

气，口味不错；但因其子实体

太小，并没有多大的食用价值

• 生长分布：生长在阔叶林和针叶林的厚落叶腐殖地上。广泛分布于北温带地区

• 相似种：堆金钱菌也是成簇生长，但为深红色，菌柄仅在近基部有绒毛覆盖，常见于针叶林地

菌柄细密 丛生。
整个时灰白色绒
毛如蘑菇

白色至
浅褐色

• 多生于林

菌

子实体成密 丛生，常长成
蘑菇团

尺↑

孢子

可食性

科

种

生长季节

靴状金钱菌 (WOOD WOOLLY-FOOT)

有盖钟形至几乎平展，革褐色，表面可见辐射状

的不等长深褐色条纹。其主要特征在于菌柄和味

道：淡黄色的菌柄基部被绒毛状的黄色纤毛覆盖。

• 生长分布：阔叶林地和针叶林地，落叶土堆

上均可生长。广泛分布于北温带

• 相似种：绿金钱菌 (*C. alcalivirens*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金


钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金

钱菌 (*C. fasciculata*) 和褐紫金



• 菌柄基部 - 粉

• 菌柄基部 - 粉

• 菌柄基部 - 粉

• 菌柄基部 - 粉

子实体群生或小丛生

可食性

科 锈菌	种 <i>Marasmius alliaceus</i>	生长季节 6-9
------	------------------------------	----------

蒜叶小皮伞 (WOOD GARLIC MUMMY-CAP)

有强烈的刺激味，令人想起辛辣的大蒜；菌盖浅黄褐色，光滑的黑色菌柄，都是这种

特征。子实体在干燥的木材上生长，干燥后消失。尽管味道辛辣令人恶心，但有人把它当成大蒜的代用品用于烹调。


- 生长分布：生长在山毛榉林地的朽枝腐木上。分布于欧洲和临近亚洲地区的山毛榉区域。
- 相似种：蒜头状小皮伞 (*M. scorodanus*) 子实体较小，色泽较浅，有相似气味；常生长在草地上。



子实体单生或群生于山毛榉林地



矮小型



尺寸 1-2 cm 孢子 可食性 1-4

科 锈菌 生长季节 6-9



金针菇 (VELVET-SHANK)

菌盖橙褐色，菌柄多毛、深褐色，这些特征使得金针菇的识别比较容易。

之一。菌褶白色、稠密，白色至淡黄色。薄片的淡黄色菌肉味道柔和。亚洲已有人工栽培。

- 生长分布：广泛分布并十分常见于北温带地区。
- 相似种：狐红金针菇 (*F. fenae*) 和疏红金针菇 (*F. ononidis*) 较为罕见，生长环境不同。

菌盖光滑、橙



大头三叉毛菇

(*Hypholoma*)

在白色的真菌寄生菌



子实体

尺寸 1-2 cm 孢子 可食性 1-4

紫晶錯謬 (AMETHYST DECEIVER)

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

• 生长分布：和包括山毛榉及针叶树在内的多树种形成混林。广泛分布于北温带。

[illegible]

红蜡莲 (COMMON DECEYER)


这个特点，则和上述的紫晶蜡嘴十分相似。红蜡

- 生长分布

北温带。

• 相似三角形

菌柄稍大，纤维质较多



种子
可食性

金粉蘑 (PINK FAIR-HEAD)

子实体小，菌盖粉红色，菌柄白色，菌肉白色，孢子印粉红色。

实体太小，食用价值不大

· 生长分布：生于北温带，相当常见

· 相似种：红蘑 (*C. pernicolor*) 可能也是同


种类，色泽较暗，菌柄基部多毛。从暗红蘑 (*C. obscurissima*) 甚至色泽更阴暗，生于碱性土

林地 玫瑰粉蘑

白 (*Entoloma*

rosea) 色泽鲜亮。

孢子印粉红色。



肉质 粉白


◆ 菌盖边缘
至基部白色



紫皮丽蘑 (*Entoloma purpureum*)

子实体小，菌盖紫色，菌柄白色，菌肉白色，孢子印紫色。

菌盖



子实体单生或小群生

尺寸

孢子

可食性 不可

元

种

生长季节

栎树菌 (COMMON BONNET)

菌，但有两个特征可助识别：一是与其他小菇属蘑菇比较，菌柄格外坚硬；二是菌褶老

分结实，扭曲但不破裂。菌肉有粗谷粉的浓臭气

味和口味。

· 生长分布：生长于林地各种阔叶树倒木、树干、树桩。广泛分布于北温带以南地区



子实体 在土上



硬菌柄

多菌丝

菌盖
硬菌、凹
生。孢子
交粉

菌盖

尺寸

孢子

可食性 可

科

目

亚目


硬柄小皮伞 (FAIRY RING CHAMPIGNON)

学名: *Marasmius oreades* (Fr.) Berk.

菌盖渐变半展，中心有圆隆凸起；子实体初起棕褐色，干燥时从中心变浅黄褐色。菌柄米白色至淡黄色，坚硬结实。味道不错，有股苦杏仁味。不过，食用前得应先参阅“相似种”说明。


· 生长分布：发生于草地、草坪。广泛分布并常见于北温带。

· 相似种：有毒的白霜杯伞也发生于相同的草地生态环境；不过，白霜杯伞是延生菌褶，可以此识别。



菌肉奶白色

剖面



子实体 菌褶 菌柄

尺寸: 菌盖直径 2-5cm, 菌柄高 5-10cm

孢子

可食性: 可

科

目

亚目

长根菇 (ROOTING SHANK)

菌盖凸形至坦平，油腻粘滑，灰色至黄褐色；菌柄粗曲有沟纹，顶端上部白色，越近基部越呈褐色。大约5—15cm长的菌柄可深扎入土或是扎入土中倒木，仍有等长。

学名: *Xerula daedalea* (Fr.) Berk.

的蕈菌种类有时则划入绒孔菌属 (*Xerula*)

· 生长分布：公园、林地、树下、树桩上均可生长。


· 相似种: *Xerula daedalea* (Fr.) Berk. 与 *Xerula daedalea* (Fr.) Berk.

(1) *Xerula daedalea* (Fr.) Berk. 与 *Xerula daedalea* (Fr.) Berk.

菌褶中等细窄，黄褐色，多数细窄边缘



子实体单生或分散群生



剖面

尺寸: 菌盖直径 5-10cm, 菌柄高 5-15cm

孢子

可食性: 可

科

担子菌门

生长季节

黑蓝小菇 (SERRATED BONNET)

和小菇属的多种真菌相比,黑蓝小菇的半球形至坦平菌盖大了许多,色泽也更暗淡。湿润时的菌盖呈紫灰色,边缘条纹清晰;干燥

时小菇样似。大体来看很像是金钱菌属蘑菇,但是显微镜观

- 生长分布: 多见于肥沃碱性林地,山毛榉树的厚落叶腐殖堆上较为常见。广泛分布于欧洲和邻近亚洲的部分地区。



尺寸: 10-20 cm 担子 可食性: 有毒

洁小菇 (LAC BONNET)


菌色不较浅

- 生长分布: 见于肥沃碱性林地,山毛榉树的厚落叶腐殖堆上较为常见。

同南延伸地区有见

- 相似种: 迪奥马小菇 (*M. diosma*)

深色调菌盖,干时变色。雪松气味,发生于碱性土



尺寸: 10-20 cm 担子 可食性: 有毒

菌肉易碎型

本

是：菌褶凹生至直生，菌肉易碎

菌肉易碎是因为圆形的菌肉组织呈“蜂巢状”堆集所致。红菇属真菌在外形上与乳菇属真菌十分相似，同是菌肉易碎的蘑菇。不过，乳菇在破损时会渗出乳汁状液体，并

且多是延生菌褶。多数红菇属真菌子实体色泽比乳菇鲜亮。


所有的红菇属蘑菇都和乔木树形成菌根共生体，少数种类可以跟灌木树或草本植物形成菌根。一般来说，味道柔和的红菇可食用，味道辛辣的红菇则认为有毒不可尝。

美味红菇 (MILK WHITE RUSSULE)

属大型蘑菇：菌盖扁平形，菌柄粗矮，菌肉硬质、白色。这种乳白色蘑菇常因柄短被土、落叶残渣掩埋，而长得肥硕不堪。白色菌褶疏松宽展，多有青绿色光泽。

• 生长分布：生长于排水良好的干燥土地，和阔叶树或针叶树都能形成菌根。广泛分布并常见于北美温带部分地区。

• 相似种：短孢黄绿红菇 (*R. chloroides*) 菌褶较稠密，多有较深的青绿色带，菌柄上端常有青绿色带相绕。绒白乳菇通常较大，菌盖表面粘绒状，渗出白色液体。



● 幼菇常因见白虫

而排泻而多虫不堪

● 菌，菌生

● 菌，菌生



子实体 + 菌丝体 + 菌丝体 + 菌丝体

尺寸 菌盖 5—15cm | 菌柄 2—5cm × 1.5—3cm

孢子

可食性 可食

科

种

生长季节

臭红菇 (FOETID RUSSULE)

气味难闻；菌盖橙褐色，多肉、半球形、油腻黏滑，边缘有凹槽。白色菌柄不长，桶状，基部呈褐色。菌肉白色、易碎，味道辛辣，可变褐色。


• 生长分布：和林地上的阔叶树和针叶树都能形成菌根。广泛分布并常见于北温带的许多地区。

• 相似种：拟臭黄菇 (*R. laurocerasi*) 有苦杏仁味。斑红菇 (*R. illota*) 有苦

菇 (*R. subfoetens*) 菌肉可与氢氧化钾反应变成黄色 (臭红菇没有这种反应)。



菌盖顶部由软，
以含杏仁味苦杏仁



• 菌柄顶部是子实体。



• 变为褐色

侧面

• 折断的菌柄

最碎，四生的白色

变为褐色



子实体单生或群生于林地

尺寸

孢子

可食性



科 担子菌纲 生长季节 夏、秋、冬

黑红菇 (BLACKENING RUSSULE)

菌盖半球形至扁半球形，边缘有细沟纹；菌褶近等长，干后变黑。菌柄粗壮，基部轻度扩张，干后变黑。味微苦。和多数红菇不同的是，红菇菌褶不等长。干燥的黑色子实体可保存至下一年。

· 生长分布 生于阔叶林下，常与栎、槲寄生。分布于北温带许多地区。

· 相似种 与红菇 (R. deliozona) 相似，但红菇菌褶不等长，口味柔和。密褶红菇 (R. densifolia)





苦红菇 (BITTER RUSSULE)

菌盖半球形，基部轻度扩张；菌盖半球形，似可菊瓣，边缘有细沟纹；味微苦，菌褶和菌柄都是浅赭黄色。

· 生长分布 生于阔叶林下，常与栎、槲寄生。分布于北温带许多地区。

· 相似种 与红菇 (R. deliozona) 相似，但红菇菌褶不等长，口味柔和。密褶红菇 (R. densifolia)

· 鉴别特征 柄表面多粉。



子实体单生或群生

尺寸 1-2cm 孢子 可食性 否

科 红菇

种 *Russula clareflava*

生长季节 夏—秋

黄色湿地红菇 (YELLOW SWAMP RUSSULE)

子实体单生或群生，菌盖半球形至扁半球形，黄褐色，菌柄粗壮，白色，菌肉白色，幼嫩时脆，无味。

· 生长分布：和生长于十分潮湿或多沼泽林地的桦树形成菌根。广泛分布并常见于北温带。

· 相似种：黄白红菇 其他的黄色红菇包括：海洛德红菇 (*R. helodes*)、奥尔特红菇 (*R. raoultii*)、高柄红菇 (*R. risigallina*)、索罗斯红菇 (*R. solaris*)，大都有深色孢子，不变色；有的味道辛辣。

子实体单生或群生

尺寸 菌盖 $\varnothing$ 5—10cm，菌柄 $\varnothing$ 4—10cm $\times$ 1—2cm

孢子 棕色

可食性 可

科

红菇

生长季节

黄白红菇 (YELLOW-OGHRE RUSSULE)

最常见的林地伞菌之一。以暗黄赭色的半球形菌盖和白色菌肉为标志。菌盖有时可显绿色。白色的桶形菌柄基部却是浅黄色。菌肉白色，易碎，无味。

· 生长分布：可与生长在排水良好林地的阔叶树和针叶树形成菌根。广泛分布于北温带。

· 相似种：苦红菇和黄色湿地红菇

子实体单生或群生，多见于林地

尺寸 菌盖 $\varnothing$ 5—10cm

菌柄 $\varnothing$ 4—10cm $\times$ 1—2cm

孢子

可食性 可

蓝黄红菇 (CHARCOAL BURNER)

和 () 属 () 科 () 目 () 纲 () 门 () 界

子实体 () 颜色 () 形状 ()

菌盖, 绿色至深红色;

菌柄 () 颜色 () 形状 ()




胖胖, 米白色。菌肉
脆脆, 且结实; 和其他

() 属 () 科 () 目 () 纲 () 门 () 界

不易碎, 触感油滑 有很高的
可食性, 可做佳肴。

• 生长分布: 和阔叶树, 尤
其是山毛榉树形成菌根, 和
针叶树也能形成菌根; 森林
地上。广泛分布并常见于
北温带部分地区

• 相似种: 变色红菇和正
红菇



正红菇



变色红菇



子实体单生或群生于排水良好
土地

菱红菇 (BARE-TOOTHED RUSSULE)

一种因菌盖边缘有清晰可见的白色菌褶而得名的红菇。菌盖坦平球形全

角形的米白色菌柄上可见锈褐色

• 生长分布：生长于林地，和阔叶树、针叶树均可形成菌根。广泛分布于北温带



子实体单生或群生



可食

铜绿红菇 (VERD.GRS RUSSULE)

带有锈色或红褐色斑点缀其上，边缘多有沟纹。菌褶稠密，几乎离生白色；菌柄同色，圆柱形，底部变细。白色菌肉硬脆却易碎，略有辛辣味，加工后消除


• 生长分布：多和潮湿林地的山毛

丁北温带

• 相似种：叶绿红菇 (*R. heterophylla*) 菌肉较硬；

绿红菇 (见第131页) 菌盖有小鳞片 这两种红菇都是口味柔和，还有一

种




子实体群生或单生

美红菇 (YELLOW-STAINING RUSSULE)

陷，紫色至红褐色，中心部位甚至近黑色，边缘色泽较淡，但老熟后或破损变赭黄色。菌盖边缘皮层掀开可直达中心部位。虽可食，但是白色菌肉细薄、淡而无味，不大好吃。

• 生长分布：和阔叶树和针叶树都能形成菌根。广泛分布于北温带大部分地区。

• 相似种：香味红菇 (*R. odorata*) 有一股浓浓的水果气味，多和樟树形成菌根。杂色红菇 (*R. ...*) 只是轻度变色。




玫瑰红菇 (FIRM-FLESHED RUSSULE)

菌肉非常紧密，淡红色菌盖以及薄而不可剥离的皮层。凭借这些特征就可以从众多红菇中轻松识别这种红菇。玫瑰红菇有柄很短，圆柱形至棒形，白色，也可和菌盖至坦平的菌盖同色，味道和铅笔的木屑味差不多。

• 生长分布：多和生长于排水良好的阔叶林地的山毛榉树形成菌根。广泛分布并常见于欧洲山毛榉林地。

• 相似种：绒柄红菇 (*R. velutipes*) 菌盖皮层可剥离，菌肉易碎。




子实体单生或群生于林地中

玛丽红菇 (BEECHWOOD SICKENER)


平滑的暗深红色菌盖半球形至扁平，湿润时
粘滑。菌柄似棒、米白色、表面半滑。白色
菌肉质地易碎、有点儿椰子或蜂蜜的气味。

• 生长分布：和林地里的山毛榉树形成菌根。
广泛分布并常见于欧洲和邻近亚洲部分地区的
，毛榉分布区。

• 相似种：毒红菇。维莱恩斯基红菇 (*R.
velenovskii*) 可食，子实体较小，一般仅出
现于桦树林边。



子实体群生或单生于排水良好的林地



尺寸 菌盖 3-7cm | 菌柄 3-5cm × 0.7-2cm

科 红菇

种 *Russula fragilis*

小毒红菇 (FRAGILE RUSSULE)

用手持放大镜观察白色至奶油色的菌片
边缘是否有锯齿状即可确认这种小毒



。菌盖：初期为半球形，后期扁平，边缘有
锯齿状。菌柄：短，粗壮，白色，有
细纵纹。

注意：毒红菇和毒红菇的菌片边缘有
锯齿状，有毒。

• 生长分布：能和各种林木形成菌根。
广泛分布于北温带，但仅局
部地区可见。



子实体非



净白

的白色菌柄

尺寸 菌盖 3-7cm | 菌柄 3-5cm × 0.7-2cm

可食性 果

科 红菇

| 种 *Russula sanguinaria*

| 生长季节 夏—秋

血红菇 (BLOOD-RED RUSSULE)


种微毒红菇。血红色的菌盖半球形至中心凹陷，红色条纹的菌柄在老熟后变灰粉色。白色菌肉易碎，可根据其浅橘色的孢子印进行识别。

• 生长分布

• 相似种：海洛慈红菇

(*R. helodes*) 菌柄色泽稍为鲜亮，老熟后变色为明显灰色。多人

子实体单生或群生于酸性土



子实体单生或群生于酸性土



幼菇色泽鲜亮



剖面

菌褶

菌柄

尺寸

孢子

可食性

科 红菇

| 种 *Russula undulata*

| 生长季节 夏—秋

黑紫红菇 (BLACK SH-PURPLE RUSSULE)

菌盖部位几乎全黑；其余菌盖表面呈紫色或紫罗兰色，常有黄色斑痕。菌柄、菌褶都是白色至奶油色，与菌盖形成强烈对比。菌柄短，棒形；菌褶稠密，丛生。白色至灰色的菌肉稍有辛辣味，不可食。

• 生长分布：一般只与橡树形成菌根，广泛分布于北温带。

• 相似种：褐红菇 (*R. brunneolacca*) 孢子印颜色更深。诺姆尼里红菇 (*R. romella*) 孢子印也较深。



子实体多生于酸性土地林的橡树下

尺寸

孢子

可食性

辣红菇 (LEMON-GILLED RUSSULE)

子实体较大，显眼，菌盖弯曲半球形，紫色有光泽，菌柄柠檬黄，两者对比鲜明。菌褶紫色至深红色，棒形，有投轻微水果气味，口味辛辣。如接触氨气，菌褶和白色。

- 生长分布：和 分布和常见于北
- 相似种：红菇 (*R. queletii*) 小，菌褶和孢子印颜色较淡；有同样的辛辣味，但与氨气接触不会发生反应。



子实体群生

尺寸

孢子

可食性

绿红菇 (GREEN RUSSULE)

菌盖硬，片有褐色鳞片出现于基部表面。菌柄稍稠密，凹生。如遇硫酸铁，绿红菇可变橙粉色。

- 生长分布：和 分布和常见于北
- 相似种：花纹红菇 (*R. cutescens*) 绿色较深，菌盖从边缘开裂；和硫酸铁不起反应。



子实体

菌盖平滑、子实体小型



$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right) + \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \right)$

科

10

生 命 要 義

沼生离褶伞 (SPHAGNUM GREYLING)

，或有轻度凹陷，菌盖表面的条纹从边缘直达中心；菌肉细薄，有股麦的粗米粉气。白色至浅灰色的菌褶凹生，中等间隔。

·生长分布：只生长在长有泥炭藓的多沼泽地带。分布于整个北温带以北地区。

• 相似种：生长于苔鲜地的还有多种小蘑菇。

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{if } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$
$$t_{\text{L}} + f_{\text{L}}/c = f_{\text{L}}/c + t_{\text{L}} \quad \text{and} \quad (J\sigma_{\text{L}}/t_{\text{L}})_{\text{L}} = m_{\text{L}}$$

sphagnicola), 苔藓小伞 (*O. philonotis*): 这些

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$



干路總電阻 $R = R_1 + R_2 = 10\Omega + 10\Omega = 20\Omega$ 故 $I = \frac{U}{R} = \frac{20V}{20\Omega} = 1A$ 答：略

 $R^2 \uparrow$

卷二

Figure 1.4

年十

11

牛世要記

鼠尾，狗頭 (CONE-CAP)

流，有药味，而无特殊口味。菌褶几乎离生。

· 生长分布 在 19 年 7 月 21 日 19 年 7 月 21 日 19 年 7 月 21 日

(continued)

• 相 似 种

$$M_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2} \right) \quad \text{for } M_1 \neq M_2$$

樹的倒木上，稀少。其

他生长在松树球果上

的真菌还有：可食松果菌

斯瑞尼尼小菇 (*Mycena*

seyneu) —— 这种小蘑菇

炎淡的酒粉色蘭蕊

包人注目，蘭棚边

3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$



子孫傳 子孫傳 子孫傳 子孫傳 子孫傳

良子

毛子

可食性比例

可食松果菌 (SPRUCE-CONE TOADSTOOL)

子实体小，呈球形，颜色为黄色，靠近顶端部分显白色。破皮的白色菌肉气味好闻。可食，但因其太小而不值得吃。

• 生长分布：仅生长于云杉球果的地面部，但常因被埋而难以发现。广泛分布，常见于欧洲和邻近亚洲部分地区的云杉分布区。

• 相似种：大食松果菌 (*S. stephanocystis*) 和嗜球果伞 (*S. tenacellus*) 多见于松树球果。



子实体小，生长于云杉球果

有球果伞

嗜球果伞



剖面

尺寸：1-2cm

孢子

可食性：1/10

科

种

生长季节

丛生栎树伞 (CLUSTERED OAK-BONNET)

子实体丛生，呈伞状，颜色为棕色，靠近边缘部分显白色。破皮的白色菌肉气味好闻。可食，但因其太小而不值得吃。

臭气味可助识别

• 生长分布：仅生长于橡树的树桩上。广泛分布，常见于欧洲和北美。


• 相似种：斑点小菇 (*M. maculata*) 有“小菇”气味，菌盖边缘平滑，菌柄芽褐色，比较稀少，多被忽视。



子实体丛生于木桩上

有球果伞，色
黄至棕色

子实体的



有球果伞的
破皮菌肉

剖面

尺寸：1-2cm

孢子

可食性：1/1

→ 菌灰色至白色
色的菌盖上的
红色斑痕

晚季小菇 (LATE SEASON BONNET)

并的弯曲球形至钟形，色泽为各种暗淡灰色。在旷野里，这种蘑菇不太容易识别，可是如果

列的似乎懊恼的防癌泡气时。

· 生平年表

土堆上。广泛分布，常见于欧洲。



叶的体大随年龄上



● ● ●



剖面



白 色 麥 粉



✱

44

Figure 1

科 学 报

☛ *Myrica olivaceomarginata*

| 生长季节 | 秋 |

原野小菇 (FIELD BONNET)

可轻松识别**原野小菇**。这种小菇菌柄相当易碎，菌肉薄，

• 生长分药

广泛分布，常见于欧洲

鞋 1.4 双

1 的红小菇 (*M. rubromarginata*) 为红色; 生长在草地或林地残存上的柠檬小菇 (*M. citromarginata*) 和 变黄小菇 (*M. flavescens*) 为黄色。

变黄小菇 (*M. flavescens*) 为黄色

于其值

[illegible]

割布

董理中

254

□ 首性

丝柄小菇 (IODOFORM BONNET)

心的笋咬

• 生长分布


• 随处可见 广泛分布并常见于欧洲

• 相似种

显微镜下和丝柄小菇十分相似



子实体密集丛生



滑面

茎底部有纤维

几厘米

尺寸

可食性 100%

红汁小菇 (BLEEDING BONNET)

• 品种中型，红褐色，粉状表面，边缘有尖刺。白粉覆晶的胞面。褐色菌柄如发生假菌的水浸状松软角将流出深红色液体

• 生长分布

• 北美等

• 相似种





菌柄细

这种菌柄插在针垫上的大头针

• 菌柄细，菌褶边缘红褐色，红褐色液体渗出，一般生

堆



孢子



子实体密集丛生

尺寸

孢子

可食性 100%

乳足小菇 (MILK DROP BONNET)

察看菌柄（基部最为明显）是否渗出大量白色液体即可对这种多变小菇做

的鉴别。菌盖为宽粉，菌图中出小的灰色型外，还有全白和黑色型。有时

菇（*M. leuconata*）乳足小菇有股淡淡的萝卜气味。食用性未同，但可确定的是，其子实体

• 生长分布：生长于各类林地的针叶树倒木和阔叶树残渣上，分布并常见于欧洲。

• 相似种：乳足小菇的菌盖渗出液稀少，水白色，可缓慢变色并成红色，菌肉味为



乳足小菇

菌盖

白色液体
• 菌盖颜色

• 萝卜
• 萝卜

子实体单生或群生


橙盖小菇 (ORANGE-CAPPED BONNET)

根据这些特征，可比较轻松识别这种小菇。长而纤细的菌柄和球形至钟形菌盖的表面都被粉粒覆盖。菌褶间生、宽幅、淡黄色，间隔中等。

• 生长分布：树皮之类的小堆木渣，林地、灌木篱墙、荨麻丛下的潮湿地皮，都可见到这

北温带。

• 相似种：瘦脐菇菌褶为拱形，



橙盖小菇

菌盖表面
粉白色

+

子实体单生或小群生，十分
美观

黄白小菇 (YELLOW-WHITE BONNET)

菌盖。菌盖上有绿色“卵形斑”和浅黄色“点状斑”。菌柄纤弱，精致，透明黄白。有股淡淡的萝卜味。

生长分布

针叶林地的残木堆。分布并常见于欧洲。

• 相似种：很容易把 (*Hemimycena*) 属的也



阿多尼斯小菇

子实体群生。珊瑚灯身

菌柄白色，透明



子实体
同时出现

• 菌盖表面

安络小皮伞 (HORSEHAIR MUMMY-CAP)

菌盖。菌盖上有绿色“卵形斑”和浅黄色“点状斑”。菌柄纤弱，精致，透明黄白。有股淡淡的萝卜味。

用。气味青淡，口味柔和，无食用价值。

生长分布

生长：荒野和沙堆上也有发现。广泛分布并常见于北温带。

• 相似种：多孔小脐菇 (*Microphale perforans*) 有精细绒状菌柄和一股腐烂卷心菜气味。



• 菌盖表面



菌盖表面呈褐色，



子实体群生于多种生态环境

尺寸

孢子

可食性

$\frac{1}{2} +$

Id

王世昌

臭、腐菇 (FOETID MUMMY CAP)

这种毫不显眼的小蘑菇偶尔也会因近似于腐烂的土壤的恶臭气味而引人注意。其菌盖

平滑、橙褐色、中心色深、边缘细毛。向上翻卷。显现条根和沟纹。消纳多毛、中空，上部扩宽。

· 生长分布：仅生长于阔叶林地的倒木腐枝上，多生于碱性土环境。分布于北温带，但较少见。

• 相似种：芸苔小脉菇 (*M. brassicolens*) 生长于山毛榉树的枝梢叶片上，菌褶色淡。稠密多孔小脉菇 (*M. perforans*) 较小，发生于针叶树。两个相似种都有恶臭。



平其德思德所生



圖書中、
由、由、由、由



由阿曼西的
所屬子時生
產罐頭



枝生微皮傘 (TWIG MUMMY CAP)

老熟后变扁平，表面有细小起皱沟纹。菌柄短，浅褐色，扭曲，基部覆盖灰色鳞片。和菌柄色泽相似。子肉薄、硬、纤维质。宽柄菌褶疏松；孢子，表面平滑， $9 \times 3 \mu\text{m}$ ，纺锤形至椭圆形。

• 生长分布：生于潮湿林地的枯枝烂叶或腐草上，可忍耐非常干燥的环境。广泛分布并常见于欧洲。

相似种 *M. ...*

基部黑色。黑粉微皮伞 (*M. vaillantii*) 的识别最好是利用显微镜对囊状体和孢子进行观察。



子实体大群稠密出现

427

1941年



科 丝膜菌

种

生长季节

小盔孢菌 (TINY PIXIE CAP)

条纹，有时变较浅的奶油褐色。菌肉和菌褶细薄，浅褐色，有粗粉气味。菌柄长、细、光滑。需进行显微镜观察以区别于其他细小种类。孢子似疣，形如有松散外壳的卵圆。

· 生长分布：生长于草坪或潮湿林木，分布广泛。

· 相似种：苔藓盔孢伞 (*G. hypnorum*) 的孢子外壳不松散，还有许多其他种的盔孢伞主要生长于各种苔藓地或腐木。



子实体

菌盖多皱裂，
有时呈条状。



菌褶中密，
呈、浅褐色。



菌柄基部
也生于苔

尺↑

孢子

可食性

可食性

科 丝膜菌

种 *Conocybe lactea*

生长季节 夏—秋

乳白锥盖伞 (MILKY CONE-CAP)

和多数锥盖伞不同，不需显微镜的帮助，也可一眼认出乳白锥盖伞。它的象牙白菌盖一半盖有淡淡条纹，老熟后轻变起皱；菌褶稠密，浅

隐隐可见。菌肉薄而易碎。

· 生长分布：生长于草场中。广泛分布并常见于北美等及其他地区。

· 相似种：乳白粪伞 (*Bolbitus lacteus*) 的菌盖稍滑，孢子较小， $9.5 \times 5.5 \mu\text{m}$ ；而乳白锥盖伞孢子是 $12.5 \times 8 \mu\text{m}$ 。粪伞孢菌属担孢菌属一般菌柄较宽，常为白生。



子实体

● 菌盖平滑，表面无
纹，出现细皱时



尺↑

孢子

可食性

可食性

裸盖菇 (LIBERTY CAP)

这种伞菌的圆锥形菌

顶上还有明显的小

柄，有纹，嫩或灰色

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199.

菌盖粗糙 子实体小型

有鳞，被粉粒
平滑 这类小蘑菇可出现在许多不同的科

科 糙柄

种 *Cantharellus scabellus*

生长季节


糙质毛皮伞 (SHAGGY-FOOT MUMMY CAP)

种硬毛蘑菇。菌柄覆着稠密硬直的灰色至褐色红毛。菌盖半球形至脑凸；有时可见中心凹

菌盖，有环绕同心形色带和射线状条纹。深褐色至结头，米白色；无味

生长分布：生长于干旱的旷野草地，沙堆。分布并常见于北温带局部地区

相似种：温带地区和几种毛茛属蘑菇



糙柄毛皮伞
幼菇幼上

尺寸

+

+

+

可食性

科 糙柄

种 *Asterophora parasitica*

生长季节 秋

寄生星形菌 (PICK A BACK TOADSTOOL)

有毒，菌柄丝状纤维质，灰色，菌褶宽而疏，幼时，有延生钩刺。无食用价值

生长分布：生长于潮湿的林地，常与腐树金菇共生

相当常见

相似种：寄生于腐树金菇上的其他真菌包括：外形像小号的星形寄生菇 (*A. lycoperdoides*)，寄生于水粉杯伞上的寄生草菇 (*Volvariella surrecta*) 以及几种金钱菌属 (*Collybia*) 的小蘑菇

幼菇幼上



寄生星形菌
幼菇幼上

子实体小菇生

尺寸

+

+

+

+

可食性

科

种

生长季节

小假鬼伞 (FAIRIES' BONNETS)



幼体子实体如降落伞状，奶油白色，老熟变为灰色。但跟许多鬼伞属蘑菇不同的是，

看到菌盖表面的细纤毛和粉状颗粒，精致的菌柄和薄的菌肉均是白色。

• 生长分布：生长于树桩和阔叶树倒木上或周围邻近区域。广泛分布并常见于北温带。

• 相似种：小脆柄菇 (*Psathyrella pygmaea*)

有相似的外貌和生长环境，但菌盖表面既无纤毛也无粉状物，菌盖外形也不像降落伞。



子实体大群生

菌盖表面有
细纤毛和粉状物

菌柄细长

菌盖

菌肉薄
白色

朱红蜡伞 (VERMILION WAX-CAP)

不是借助显微镜观察孢子的话，有几种相似的小蜡伞难以分辨。子实体色泽鲜红，菌盖半球形、有峰，菌柄平滑、闪光。菌褶直生，橙红色的菌肉气味口味都很，

• 生长分布：往往生长于多山柳菊 (*H. pilosella*) 的旷野草地。分布于北温带，但确切的分布区域却知之甚少。

• 相似种：沼泽蜡伞 (*H. helobia*) 多见于弱酸或中性土，大蒜气味，孢子为比较规则的椭圆形。喜钙蜡伞 (*H. calophila*) 的孢子形态也比较规则，多生长于碱性土。



子实体

尺寸

孢子

可食性

细齿粉褶菇 (SAW-GILLED BLUE-CAP)

菌盖半球形，深蓝色，表面干爽，手感有微细直立鳞片，中心呈脐状凹陷。菌柄色泽和菌盖一致，浅蓝色菌褶有着锯齿状的蓝黑边缘。

· 生长分布：生长于草地、路边植被丛中或沙地上。广泛分布于欧洲、北美等地。

· 相似种

· 相似种：(1) *Entoloma curvicaetum* 菌盖色泽近褐色；蓝灰粉褶菌 (*E.*

querquedula) 菌盖则是橄榄色。



图 1 细齿粉褶菇在草地上的生长情况

图 2 细齿粉褶菇的菌盖



图 3 细齿粉褶菇的菌柄

图 4 细齿粉褶菇的菌褶




图 5 细齿粉褶菇的菌柄

绿色粉褶菇 (GREEN PINK-GILL)

这种真菌一般呈绿色或褐绿色，但有时也会呈现粉红色。菌盖半球形，中心轻度凹陷，菌柄纤细中空。尽管多数的小粉褶菇都与众不同，这种绿粉褶菇却因与草地环境相宜而从不抢眼。

· 生长分布：生长于草地。分布于欧洲、北美，但并不常见。



图 1 绿色粉褶菇在草地上的生长情况




图 2 绿色粉褶菇的菌盖




图 3 绿色粉褶菇的菌柄



图 4 绿色粉褶菇的菌柄



菌褶离生、有菌盖和菌柄的真菌

本章介绍了鹅膏菌科、伞菌科和光柄菇科的各种特征——这些要菇的菌褶都不依附在菌柄上。菌柄往往偏离菌盖，却不会损害到菌褶。



有菌托或菌幕的毒片

具有菌托或菌幕的毒片。这些真菌都较大，多肉：绕有柄，靠柄基部有明显囊状菌幕结构（菌托），或

科 鹅膏

种 *Amanita caesarea*

生长季节 秋

橙盖鹅膏菌 (CAESAR MUSHROOM)

这种鹅膏菌盖半球形至坦平、橙红色，橙色菌柄上松散的白色菌托十分突出。基部扩宽达5cm，菌褶松软稠密，奶油色至金黄色。选择性可食，但除非是经专家认真识别，否则切勿轻易入口。

- 生长分布：和沙土上的栗树、橡树等阔叶树形成菌根。分布于北温带温暖地区，但只局部地区有见；亚热带地区也有分布。
- 相似种：毒蝇鹅膏菌呈橙黄色。

橙盖菌柄上
有环状纹

• 菌盖边缘有
小坑，干后

紫盖菌肉
• 更鲜美



子实体生长于沙质土，常生
成群生



尺寸 菌盖 8—20cm | 菌柄

孢子

可食性 1

毒蝇鹅膏菌 (FLY AGARIC)

菌盖半球形至坦平，边缘平滑或有浅刻槽，表面有白色菌幕鳞片。子实体色样有包括

纳草部膨胀，但无菌托，如鳞柄白毒鹅膏 (*A. virosa*，见第150页)，但

· 生长分布

黄褐菌生

子实体
由菌幕菌环

菌幕白色
菌幕黄色

菌幕白色
菌幕黄色

红 橙或橙黄色
菌幕

的菌幕白色

· 菌幕鳞片
· 菌幕鳞片
· 菌幕鳞片

菌，菌幕
菌幕，菌
菌幕，菌

于其在树下或附近群生或
形成菌幕



△黄毒蝇鹅膏菌 (*A. muscaria*)
菌盖黄色至橙色，一种毒蝇
鹅膏菌变种，常见于北美东



科 鹅膏 | 种 *Amanita rubescens* | 生长季节 夏—秋

赭盖鹅膏菌 (THE BLUSHER)

菌盖半球形，粉褐色，上有色的疣状鳞片显得斑斑点点。光滑，灰、白、粉色，菌环飘逸，表面显沟纹；基部膨胀，有残留菌膜包绕。有小虫在子实体上产卵，受污染肉变为粉色——这往往也是识别的最好线索。因易于与其他有毒蘑菇混淆，识别困难，采摘食用应咨询有经验的有采菇人。

• 生长分布：和山毛榉类阔叶树、针叶树形成菌根。广泛分布并常见于七月份。



剖面



△透明寄生菌 (*Hypomyces fastidiosus*)

曾 鳞柄白毒鹅伞 (*A. rubescens*, 见第150页) 也有发生。☠

至嫩白伞

子实体单生或群生，多见于碱性土

尺寸 菌盖 ⊕ 6—18cm | 菌柄 ⚡ 6—15cm ↔ 1.5—4cm

图 2

图 4

块鳞灰鹅膏 (STOUT AGARIC)

深褐色的矮胖伞菌，菌盖半球形，滑，有灰色菌幕残片。棒形菌柄上部有凹槽。油菜籽气息，很浓。加工处理后的块鳞灰鹅膏可食，但决不主张食用。参阅“相似种”。一些真菌学家认为其变种青鹅膏（或菌柄，色淡，没有气味）。

• 生长分布：菌根。特别是和林地中的山毛榉树或云杉上成菌根。广泛分布于北温带。

相似种：帽盖鹅膏菌出现粉色。



子实体



菌盖

菌柄下部有褐色
或深褐色菌幕

史密斯鹅膏 (SMITH AGARIC)

菌盖半球形至坦平，白色，表面有细绒毛菌幕残片点缀。菌盖边缘平滑，破碎处菌幕清晰可见。白色有棱菌柄上菌环破碎，很大部分的菌柄如根下伸，球形基部可能扩宽达5cm。如误食，略有辛辣味的白色厚菌肉可导致肾衰竭和肝中毒。

• 生长分布：和针叶树形成菌根，分布并常见于北美西北部的太平洋地区。

• 相似种：白色松口茸有香料气味，菌柄上部有棱，容易识别。

菌盖上部
有细绒毛
菌幕残片菌柄上部
有棱状突起
菌幕残片

子实体发生于林地针叶树下，单生

尺寸 菌盖 5—12.5cm | 菌柄 10—20cm × 1—3cm

孢子 白色

可食性 最

科

种

生长季节


豹斑鹅膏菌 (THE PANTHER)

平，一般是浅褐色，表面有大量的菌幕小残片，边缘有精细线状凹槽。比较好认的识别特征是菌柄基部球形，边圈明显，菌环表面没有刻痕，菌肉白色。

• 生长分布：多和碱性土林地、公园的阔叶树形成菌根，分布于北美带，局部地区常见。



豹斑鹅膏菌
菌柄基部球形



黄盖鹅膏菌 (GEMMED AGARIC)

菌碎片，菌柄结实，米白色至浅黄色，菌柄有残留破碎菌幕，菌环、色带痕迹模糊；球形，基部有窄边粗机，基部扩宽约2cm。北美的黄盖鹅膏菌有多种变异，难以正确识别。


• 生长分布：和针叶树形成菌根；砂丘。

有见。


相似种

鹅膏菌盖！有吏

有马铃薯气味。



黄盖鹅膏菌



菌盖边缘

不可食

尺↑

孢子

毒性

鱗柄白毒鵝膏 (DESTROYING ANGEL)

这种蘑菇的菌状基托一般是埋于地下，为了正确识别，采集样品时应小心取出。

钟形或锥形，通常无菌落残片，和连

柄多有细纤维环 极脆，决不可食。

• 生长分布：阔叶林、和林地针叶树和

本報信報

●生长在温暖地区 卵盖椭圆形 (A. ovulea)



•• 1—2cm

假造訃聞 (FALSE DEATH CAP)

有两个明显的识别特征：一是果实柠檬黄色或白色。二是萼筒基部扩宽3cm，有明

半球形，边缘平滑，表面多有残留菌幕。菌柄顶部有大而悬空突出的菌环。白色菌肉有股非比而强烈的生马铃薯气味。

·生长分布：多和酸性土的针叶树和阔叶树形成菌根。广泛分布并常见于北温带。



毒鹅膏 (DEATH CAP)

菌盖半球形至坦平，绿至灰色，边缘平滑
幼是纤维质粗糙表面，菌柄色泽与菌盖类
似或米白色，有明显突出的白色菌托，宽
3—5cm 未成熟子实体因其绿色、离生菌褶、

可能缺失，老熟子实体也许是灰色菌盖 极毒

生长分布

土地阔叶树形成菌根 广泛分布于欧洲



相似种

从菌环来识别 白毒伞也是通体白色



子实体单生或群生

老熟子实体
是灰色菌盖



剖切

• 幼 菌 •
生长白毒伞根

老熟菌柄
的菌托

幼年的白
毒伞根中
• 埋于土

褐云斑鹅膏菌 (PORPHYRY FALSE DEATH CAP)


其名源自半球形至有圆凸形菌盖上的斑岩色
(灰紫色) 菌柄有灰色菌环环绕，在基部形
成球根，菌托米白色或浅灰色，宽2.5cm
气味与去皮马铃薯类似 无毒或微毒，但因与
有毒近缘种极易混淆，还是应避免食用。

生长分布

根 分布于北温带

相似种

马铃薯气味



子实体

菌柄中根

• 幼 菌 •

生长白毒伞根

老熟菌柄

的菌托

幼年的白

毒伞根中

• 埋于土

马铃薯气味

• 幼 菌 •

生长白毒伞根

老熟菌柄

的菌托

幼年的白

毒伞根中

• 埋于土

科 担子菌纲 伞菌目 蘑菇科 主要分布 中国、日本、欧洲、北美

茶褐鹅膏菌 (TAWNY GRSETTE)

菌盖锥形至有圆凸，平滑、茶褐色，与有皱褶盖而轻度纤维质的菌柄同色。菌盖边缘有刻痕，没有菌环或环带；这正是假鹅膏属伞菌特征。菌托色泽米白色。

米白色，和苯酚接触会变为巧克力褐色。
· 生长分布：杂林地桦树形成菌根。分布于北温带。

相似种 鹅膏菌 (*A. vaginata*) (见第153页)



子实，浅茶褐色

菌盖中心可隆起

菌盖中心可隆起

菌盖中心可隆起

菌盖中心可隆起

菌盖中心可隆起

菌盖中心可隆起

子实体单生或小群生

白色至奶油色

松 栎 牛 黄 蘑 子 实 体

褐黄鹅膏菌 (ORANGE GYSSIE)

这种蘑菇较引人注目，菌盖半球形至凸形。

幼菇菌柄无菌环，但有细弱的棕色环带和突出的白色厚菌托。它与茅菇鹅膏菌一样都属于假鹅膏属，均可生长于桦树附近，但褐黄鹅膏菌多见于肥沃土地。菌肉松软，米白色，可食，不过必须彻底煮透。另外，采菌后的熟菇如不能妥善保管，必须尽快处理。

• 生长分布：主要和桦树形成菌林，分布于欧洲和北美。

• 相似种：茅菇鹅膏菌米白色的菌肉和茎部接触后变为巧克力褐色，而褐黄鹅膏菌则变色为深红色，还有一样相似的是暗灰鹅膏菌。

菌盖半球形或凸形
● 平滑 鲜明菌托

● 菌盖直径

● 菌柄高



暗灰鹅膏菌

土地的阔叶树下。101

F 1

孢子

可食性

科

地

生长季节

银丝草菇 (SILKY VOLVAR)

学名: *Volvariella bombycinoides* (Fr.) Sacc.

别名: 银丝草菇、银丝菇、银丝蘑、银丝伞

形全具菌凸，白色至浅黄色。菌盖表面被丝样纤毛覆盖；白色至黄奶油色的菌柄基部菌托醒目。气味好闻，可食，但因其稀少，不推荐食用。

• 生长分布：生长于枯树（倒木上少见）。分布于北温带地区，但较少见。

• 相似种：青灰色草菇（*V. caesiotincta*）的生长环境相似，但无丝样菌盖表面，子实体较小，色泽较深。



子实体单生或丛生，常生长在榆树上



菌盖顶部
至半球状或
钟形，白色
至浅黄色

剖面

• 幼实却丝线
的米白色菌肉

白色至粉褐色
的松软菌褶

图1

++

++

++

4子

可食性(可)

粘盖草菇 (STUBBLE FIELD MOLLAR)

灰色之间。平滑、粘连、锥形或有圆凸，可凭菌盖的这些特征进行识别。菌柄米白色至暗黑灰黄色，基部的菌托白色至浅灰色。米白色的菌肉味同黄瓜、萝卜气味。一旦采摘，子实体将快速损坏，因此，如果是为饱口福采摘，应尽快处理食用。

· 生长分布 ·

下 广泛分布，尤其常见于北温带地区。

· 相似种：近缘种“草菇” (*V. voluacea*) 的

柄较短，菌托深灰色，未


成熟了头体的菌盖是

较深的灰褐色，身


菌盖部分地区

已进行商业

栽培。



子实体
菌柄基部



子实体
基中

尺寸

可食性

● 中国主要食用真菌 ●

10

科 伞菌科 种 野蘑菇 生长季节 夏、秋

野蘑菇 (HORSE MUSHROOM)

菌盖 菌柄 菌环 菌褶

色至米白色的表面将缓慢变为橙黄全橘色，特别在破损处，变色更为明显，菌柄色泽相似，向基部增厚，悬挂菌环；菌环底面如轮。厚而结实的菌肉也可缓慢变色，有杏的香气，可食，但是高含碱，少吃为宜。

生长分布 广泛分布并常见于北温带。广泛分布并常见于北温带。

• 相似种：有好几种：大紫菇（见第158页）；大抱囊菇（*A. macrosporus*）肉肥，菌柄有缢带相绕；白林蘑菇不过是野蘑菇的林地变型；黄斑蘑菇（见第159页）



菌至柄底

菌肉白嫩，
气味如杏

剖面

子实体多可长成蘑菇圈

尺寸 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

孢子 巧克力褐色

可食性 100%

大紫菇 (THE PRINCE)

可助识别的特征是：菌盖和菌柄表面都有橙褐色鳞片。菌肉黄色，气味如杏。鳞片向心式摆放在球形扩张的菌盖上。菌柄上有大菌环悬挂。肉质丰

含铜太多，切不可大量食用。

· 生长分布：生长于各类林地、公园和花园堆肥等肥沃土地。广泛分布于北温带。

菌盖表面
的鳞片环

菌柄表面
的鳞片环

● 菌盖表面
的鳞片环
● 菌柄表面
的鳞片环

● 菌盖表面
的鳞片环
● 菌柄表面
的鳞片环

子实体

黄斑蘑菇 (YELLOW-STAINING MUSHROOM)

$\frac{1}{x} = x^{-1}$

$\frac{d}{dx} x^{-1} = -1 x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$


$\frac{d}{dx} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$

部：从纵向切面可见，其底部为十分亮丽的鲜黄色，闻起来有墨水气味。

• 生长分布: 生长于公园、墓地和相似场地的空地草坪。分布于北温带及其他地区。

• 相似種

伊澤較深，有海



4219107

● 聖賢傳記 ●



颜色，中心部
 显成灰色中

黑虎经过这
“京华”。剧
中人物，除

五、
例題

● 鹿 田 基 部 伊
重 解 説 史

● 臺灣新書展
電力能源



△加州磨菇 (*A. californicus*)

在島加米等已獲。半旗元

et al. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1



毛环蘑菇

2000

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, for all rights reserved.

子或錄 卷之四 七 子或錄 卷之四 七

尺寸 蘭葉 ⊕ 5—13cm | 莖根 ⊕ 5—10cm ⊕ 1—2cm

 $\frac{2}{3}$

可信件

科 伞菌

种 *Agaricus bitorquis*

生长季节 夏、秋

大肥蘑菇 (PAVEMENT MUSHROOM)

这种蘑菇有几个突出特征：甚垂的双环，菌环有护膜，上翻，有发育幼嫩的菌肉，浅黄至粉色；菌盖近边缘内卷，可食用，但因生长在路边，最好不吃。

• 生长分布：多生长于城区空地或道路石旁，分布广，见于欧洲和北美。

• 相似种：白鳞蘑菇（见第162页），气味难闻，菌盖表面有鳞片，也生长于类似环境。



子实体几朵聚集生长

可食性 100

科 伞菌

种 *Agaricus bisporus*

生长季节 四季一秋

双孢蘑菇 (CULTIVATED MUSHROOM)

这种大规模栽培的食用真菌或许已经家喻户晓，其在商业上的重要性只有草菇（见第163页）、金针菇、香菇、香菇、香菇等。菌盖半球形，白色至浅棕色，菌柄上有上翻的环。菌肉可略微变红。

• 生长分布：生于路边、草地及其他栽培地，广泛分布于整个北温带。

菌盖半球形至平展，
菌肉白色至浅黄。



子实体



菌盖平展时

菌柄更有力

尺寸

孢子

可食性 100

科

种

生长季节

白鳞蘑菇 (SALT-LOVING MUSHROOM)

• 别名：白鳞菇，土名：盐蘑菇。生长于高盐土壤中，相当耐盐。菌盖坦平或半球形，白色至灰白色；菌柄短，基部有环，环有一道窄窄的上翻边轮。气味难闻；爱食盐，白色，可食。因气味难闻，较少人食用。

• 生长分布：生长于海岸地区高盐土地，或出现于冬季的盐土路边。分布于欧洲。

• 相似种：双孢蘑菇也可生长于相似环境。

• 菌盖半球形或坦平，表面干燥。

• 肉，白色至灰白色。

• 菌盖边缘，菌柄基部。

干菜腌制。

• 孢子。

• 良性，可食。




太阳菇 (RED-STAINING MUSHROOM)

菌盖半球形至凸形，表面菌盖褐色微带纤毛。菌环悬挂其上的菌柄或带有纤维质鳞片覆盖表面。选择性可食；有令人舒服的香气；尽管变色反应与近缘种相比不是那么明显，但米白色菌肉被挤压后仍呈现红色斑。

生长分布

公园的针叶树残查堆上。分布于北美洲。

• 相似种：侧柄伞菇 (*A. laniger*) 也是一道美味，菌肉肥美，变色的深红斑更浓；松茸伞菇 (*A. phaeolepidotus*) 为黄色斑，有毒。



子实体群生或形成蘑菇圈

尺寸

科 伞菌

1 种 *Agaricus porphyreus*

1 生长季节

紫萁菇 (PORPHYRY MUSHROOM)

这是小型伞菌“小蘑菇”中最为肉肥结实的一种；这些小蘑菇都有杏香气。黄色菌肉，菌盖多呈紫色。紫萁菇的菌盖半球形，灰色表面覆盖淡紫色的细纤毛；菌盖白色，基部球形，黄色至橙色，菌柄上还挂有一道狭窄的易碎菌环；菌褶从粉色至紫黑色。可食，白色菌肉可缓慢变为黄色。

• 生长分布：生长于阔叶树林的空地或落叶残查堆，针叶树地和公园的落叶残查堆也有生长。分布于欧洲，但不常见。



子实体
散生

尺寸

1 菌片

科

属

生长季节


白环蘑 (SMOOTH PARASOL)

菌盖白色、半球形、表面光滑干燥。菌柄有细薄疏松的可移动菌环，基部棒形。白色菌肉有股好闻的“蘑菇”香气，但有毒。白环蘑色泽敏感多变，所以，专家、从中划分出好几个种来，但都没有一个可食的。

• 生长分布：草丛、路边、公园、草地和沙堆上均可生长。分布于欧洲、北美。

• 相似种：有好几种相似伞菌，其孢子印和成熟菌褶呈巧克力褐色。

菌褶细薄



子实体小群生成形成蘑菇圈，多见于草地。



菌盖



尺 + + + +

： + +

子

食性

科

属

生长季节

斑粘伞 (WEEPING SLIME-VEIL)

菌盖半球形、轻度肉腻，奶油色至很浅的红褐色。菌柄基部球形、干燥，菌环突出。菌盖表面有褐色斑。白色菌褶稠密、离生。虽然有记录说这种白色多肉、有粗粉气味的蘑菇可吃，但不主张食用。

• 生长分布：生长于富肥林地。十分突出地，厚厚堆集的针叶林和阔叶林。见于潮湿、分布于欧洲、北美，但仅局部地区有见。

• 相似种：茶色粘伞 (*L. gloderma*) 十分粘糊。菌盖橙褐色。某些鹅膏菌外表相似，菌盖表面却十分干燥，有残留菌



子实体在潮湿处生长，菌盖表面有褐色斑。



尺 + + + +

： + +

子

食性

高环柄菇 (PARASOL MUSHROOM)

凭此识别、菌柄上也有一个可移动的大菌环

小阳伞似的菌盖坦平张扬, 中心深

灰褐色, 有向心形鳞片图

纹。浅色的菌肉受晒

不变色。有人认

为这是最好吃的

一种食用真菌

• 生长分布: 林

地和公园的沙

地、干旱草地或

小牧场都可生长

广泛分布于欧洲和北美

• 相似种: 大环柄菇和绿柄

菇 (见第166页)。珀克斯环柄菇

(*M. permixta*) 菌肉有红斑



平头体 + + + + + 正 + 假

科 担子菌纲 目 伞菌目 科 蘑菇科 属 环柄菇属 种 大环柄菇


大环柄菇 (SHAGGY PARASOL)

菌盖有环。破损时，白色菌肉变鲜胡萝卜红色。可食，但可能会引起肠胃不适，只能少量食用。

- 生长分布：多见于肥沃土地的灌木丛、公园或菜园。广泛分布并常见于欧洲、北美。
- 相似种：珀克斯环柄菇和赭环柄菇较大。菌柄表面鳞片如蛇皮脱落。赭柄菇有绿色孢子印，有毒。



这是一种菌盖覆盖鳞片，受损伤后变红褐色，双孢子散落在白色菌褶上。




科 种 生长季节

锐鳞环柄菇 (SHARP-SCALED PARASOL)

人型蘑菇。菌盖半球形、米白色。表面覆盖锥形或金字塔形的褐色鳞片老熟后而脱落。菌柄褐色。有大而甚重的菌环。边缘深色；菌柄基部膨大。菌环下菌柄表面有鳞或短盖纤毛。气味难闻，也许有毒。

- 生长分布：生长于富肥的碱性林地路边。广泛分布于北温带。
- 相似种：有刺环柄菇 (*L. hyvrix*) 的深色鳞片里可渗出褐色液体。灰粉环柄菇 (*L. perplexum*) 一般较小，菌褶不是很稠密。高环柄菇有可移动的菌环，有一股淡



◆ 菌环壳 ◆ 菌柄基部膨大
可伸展至 2cm

又奶也色
菌褶，菌
柄，柄壳

草地环柄菇 (GRASSLAND PARASOL)

白色。离生。不过，和多数环柄菇不同的是，草地环柄菇的菌环较少见。子实体通体米白色至奶白色，菌盖中心呈较浓的褐色。菌柄有残留菌幕形成的环带，菌盖边缘也有残留菌幕。有的真菌学家根据一些细微特征又把草地环柄菇分成三个或更多的种。

- 生长分布：生长于干燥开阔的草地和海岸地区的沙土地。广泛分布于欧洲。
- 相似种：硬柄小皮伞的外形十分相似，但它是凹生菌褶、硬而菌肉，子实体无任何残留菌幕。



子实体多生于开阔草地和海岸地区的地表苔草中。群生。

红黄环柄菇 (ORANGE GIRDLED PARASOL)

从这些特征, 这种相当多肉的环柄菇不难识别。球形菌盖有同心形的精细橙褐色鳞片, 中心稍高, 赭褐色。与冠状环柄菇相似, 切开这种环柄菇, 可闻到水白色菌肉上发出的难闻化学药品气味。


生长分布

树下。主要分布中欧至南欧一带。

• 相似种: 梭孢环柄菇 (*L. ventriosospora*) 的菌盖和菌柄基部缺少褐色。



子实体生长于落叶残落堆。
常生成群生。



菌盖边缘, 菌

• 菌柄有一小片

菌柄基部



细环柄菇 (SHAGGY STALKED PARASOL)

一种人们肉片不肥的真菌, 多为白色至奶白色, 菌盖钟形至坦平, 上有褐色鳞片。图例的样品属于褐色型。

菌盖边缘和菌柄有清晰可见的纯白色菌丝残留, 使未成熟子实体显得斑斑点点, 表面粗糙。菌肉白色至浅褐。

• 生长分布: 生长于肥沃土地的阔叶树和针

• 相似种: 白环柄菇 (*L. alba*) 的菌柄较光滑。梭孢环柄菇 (*L. ventriosospora*) 菌环

色, 孢子幼锥形。



菌盖边缘

菌柄上部

菌柄



子实体单生或小群生

科 伞菌

种 *Lepiota cristata*

生长季节 夏—秋

冠状环柄菇 (STINKING PARASOL)

柄菇。其最好的识别特征是：菌盖半球形，浅色。

成熟子实体上可见，如同上翻的衣袖

生长分布在林下、路边。广泛分布并常见于北温带

·相似种

1. 菌盖中心呈红褐色，边缘

菌盖中心呈红褐色，边缘
菌子周围有菌

菌盖边缘呈白色，菌柄

· 菌盖边缘所

· 菌柄下部

子实体生长于空旷地，小群
生或群生

栗色环柄菇 (CHESTNUT PARASOL)

深色小蘑菇。菌盖半球形至扁平，深褐色，菌柄上部被深褐色鳞片；发出很浓的难闻气味。短命伞环只存在相当短的时间。对这种小蘑菇进行显微观察十分重要。环柄菇属蘑菇孢子有一种形态：火箭形、卵形、纺锤形。栗色环柄菇孢子属火箭形。

· 生长分布

广泛分布并主要常见于北温带南

部地区

· 相似种：富拉维那环柄菇 (*L. fulvella*) 较大，浅橙褐色；假环柄菇 (*L. pseudohelvola*)

有环更明显，

气味更浓

菌盖表面有鳞片

· 菌柄上部



肉毒 假环柄菇

褐色鳞片 不明显的环带下
方有开伞柄呈粉白色



子实体多以几朵聚集的形式
出现

无菌幕

本属真菌的共同特征为菌褶离生、稠密，无菌幕；孢子球状，无芽管。该属真菌大多生长于腐木、倒木或木质残片上。无柄菇的属名为草菇属 (*Volvariella*)，但该属诸如银草菇类的蘑菇未成熟时具有菌幕，因此不属于本属。

科 光柄菇科

种 *Pluteus cervinus*

生长季节 夏季 秋季

反光柄菇 (FAWN-SHIELD-CAP)

种典型的大型光柄菇，菌盖深褐色，白色菌柄上有深色纤毛。菌柄的棒状基部纤毛特别明显。菌盖半球形至扁形，或扁平，表面中心部位粘连，湿润时能试吃，但无味。气味潮臭难闻。


• 生长分布：生长于林地、公园、菜地等各类场地的阔叶树腐殖质上。

• 相似种：生长于针叶树林的波瑟反光柄菇 (*P. pouzarianus*) 没有气味，可在显微镜下根据其在菌丝上的联结进行识别。



• 菌盖通常无鳞片

• 菌柄上部菌丝明显



剖面



子实体



• 菌柄基部

• 菌褶密生，

网顶光柄菇 (VELVETY SHIELD-CAP)

网顶光柄菇的识别特征：

柄表面呈深褐色绒状，菌褶边深
色。凸形菌盖表面有射线式
纹，苍白的菌柄上布满褐色
鳞片。菌肉白色至浅褐色，气味
发酸。可食性尚不清楚。

• 生长分布：常生长在大树

林内。

• 分布：广泛分布。

• 分布：广泛分布。


• 相似种：从光柄菇色泽较深，菌
盖上没有脉纹。普拉托斯光柄菇
(*P. plantus*) 则有白边菌环。



• 侧视图 1



• 侧视图 2 (幼菇)



子实体单生或群生

科

种

年代考

橘红光柄菇 (FLAME SHIELD-CAP)

可使人从近缘种蘑菇中识别变得十分轻松：菌盖丛纤毛覆盖表面粗糙的灰光柄菇截然不同是、橘红菇菌盖的表面显得精致好看。菌柄扭曲、浅黄色，使得子实体可从中空、破碎的腐木间隙中

· 生长分布

发现

• 相似种：绝妙光钠结 (*P. admirabilis*), 一种色泽更为金黄的北美孑结。



R ↑ 49

◆ ◆ ◆



附件 1

金黃光柄菇 (GOLDEN-GREEN SHIELD-CAP)



何物能刻无味。

· 生长分布

分布于欧洲, 世界分布区域尚不清楚

• 相似种：萨姆尼光钠菇 (*P. romellii*)

大多生长在埋于泥土的倒木上。



✱ ✱ ✱

45

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

菌盖变黑


小蘑菇 绝大多数鬼伞蘑菇菌褶可山 得多

毛头鬼伞 (LAWYER'S WIG)

20cm。菌盖表面多皱、粗糙。米白色至粉色。边缘由迅速变黑。菌柄上菌环明

未成熟子实体是受人青睐的
一道美食。用来食用的毛头鬼伞

• 生长分布：生长于草地、林地路边



子实体大群生

科 *Agaricaceae* 属 *Agaricus* 生长季节 夏

墨汁鬼伞 (COMMON INK-CAP)

一种不会让人认错的伞菌：菌盖圆朴形或钟形，有盖扩张导致菌盖破裂，残留鳞片形成了表面的“墨汁”状物质。菌柄高而白，在酒精中可出现不适症状，故又被称为“酒精墨汁鬼伞”。

·生长分布：生长于林地、公园埋土的阔叶树树桩或刮木上。广泛分布并常见于北温带地区。

·相似种：尖角鬼伞 (*A. acuminatus*) 菌盖有角状凸结；酒后吃这种蘑菇可产生相似症状。秃头鬼伞 (*A. cepes*) 的孢子则是光滑型孢子。在墨汁鬼伞的孢子则是光滑型孢子。



子实体稠密丛生



尺寸 1-2cm 重量 1-2g 毒性 无毒

科 *Agaricaceae* 属 *Agaricus* 生长季节 夏

黑白鬼伞 (MAGPIE INK CAP)

一种绝不会让人认错的伞菌：菌盖圆朴形或钟形，有盖扩张导致菌盖破裂，残留鳞片形成了表面的“墨汁”状物质。菌柄高而白，在酒精中可出现不适症状，故又被称为“酒精墨汁鬼伞”。

·生长分布：生长于阔叶林地的碎屑残渣中；偶尔也大量生于有丰富堆肥的花圃菌床。主要分布在欧洲的山毛榉生长区。



子实体广生

尺寸 1-2cm 重量 1-2g 毒性 无毒

晶粒鬼伞 (G. STENNING, NK-CAP)

菌盖细长, 轻度扩张, 起皱, 茶褐色
的表面上有粒状的残留菌幕闪闪发

苍白。一进入生长季节,
有丝体就会萌发出无数子
实体

• 生长分布: 城市里及森
林腹心地带的老树桩附
近都可生长。广泛分
布并常见于北温带

• 相似种: 有的近缘
种菌柄基部产生厚厚的
橙黄色菌丝束。家园鬼伞 (*C. domesticus*) 常生长在潮湿地下室
里。截叶鬼伞 (*C. truncorum*) 的柄
比较光滑, 孢子椭圆形, 外表凹凸,
每个孢子都有一小孔; 晶粒鬼伞的孢
子则是平整, 椭圆形, 每个孢子上都
有微小孔



+ 子体

白鬼伞 (SNOW WHITE NK-CAP)

因其色泽雪白, 菌盖上面覆盖松散的粉状残留
菌幕而较易识别。这种真菌虽不是最小的鬼
伞属蘑菇, 但也算极小的了。排成个钟形的
菌盖边缘上翻, 未成熟子实体茶褐色, 粉
面, 成熟色黑, 菌柄基部轻度膨胀。菌肉色
黄、薄

• 生长分布: 几乎总是生长在潮湿草地上的
新鲜马粪堆上, 常见于欧洲

• 相似种

• 一般环境。悲哀鬼伞 (*C. coturnarius*) 菌盖
中心常有褐色鳞片。小费赖斯鬼伞 (*C. micaceus*) 有股淡淡的恶臭气

最上部的如地膜菌状



+ 子体

13



构或带状斑点的“柳圈”），就（*Marasmus*）

轮枝「皮伞」(COMMON WHEEL MUSHY CAP)

色澤較深，表面有深深的射線狀肌
理，低倍顯微鏡下結實，米白色。這
種真菊精莖，仍可製成

·生长分布：生长在混合林地的阔叶树分
层树冠上。广泛分布并常见于北

·相似种：少数小叶皮虫种类生长于温带地区；绿色的刺蛾皮虫（*M. curvata*）生长在草地上；浅褐色的球果皮虫（*M. bulbicarpa*）生长于潮湿林地沼泽的落叶腐枝里；苍白的西尼皮虫（*M. lunosus*）则生长在芦苇上。生长在相似环境下的枝干微皮虫则没有轮状木屑。盖有凹地



褶纹电伞 (LITTLE JAPANESE UMBRELLA)

瘦的日本小伞 菌盖光滑，没有纤毛和线菌菌丝
有褶附着在轮状硬菌圈上，
数鬼伞属菌丝不一样的是，
不是那么明显

·生长分布：雨后草坪上多见。分布自常见于北温带。

• 相似种：耳状鬼伞 (*C. auricomus*)

般较大，菌盖较深褐色。显微镜观察可见厚壁褐色绒毛。其他的相似种包括：克恩尔鬼伞（*C. Kuehneri*）¹、小旱伞鬼伞（*C. leucocephalus*）



能通, 其细胞则是孢子确定。

有菌盖但菌柄侧生或缺失的真菌

有菌褶的真菌中，某些种类的菌柄并不正中生长支持菌盖。其菌柄或许生长在菌盖一侧，而有些蘑菇的菌柄可能就很小乃至没有菌柄。绝大多数这类真菌属于人们所称的**蚝菌**，但也并非完全如此。



科 多孔菌

| 种 *Pleurotus ostreatus*

生长季节

平菇 (COMMON OYSTER MUSHROOM)

和形状多少类似牡蛎的普通蚝菌，其未成熟子实体呈蓝灰色，后变为深灰蓝色至褐色。白色菌柄着生于菌盖一侧或没有菌柄。菌肉白色，口味不错；不过使平菇成为美食的主要因素在于有良好的菌体质地。这种蘑菇喜低温环境，生长季节往往迟于一些相似种。

· 生长分布：各种类型的阔叶树枯

· 广泛分布于北温带

· 相似种：栎生侧耳 (*P. dryinus*) 未成熟了

色，生长季节较早。



子实体层层叠叠地生长于阔叶树上



北方小香菇 *Pleurotus dryinus*

可食，却有股苦味。菌盖有绒毛，浅褐色，菌褶



尺寸 菌盖 6—20cm | 菌柄 0—5cm × 1—2cm

孢子

可食性 100%

白黄侧耳 (TRUMPET OYSTER MUSHROOM)

喇叭形、浅革褐色的菌盖引人注目；菌柄中
常延伸下行如网。白色菌肉味道很好、有胶面
粉气味。


• 生长分布：木腐菌；生长于阔
叶树下。形成白色腐木。

喜生于榆树。主要分布于南欧。


• 相似种：金顶侧耳 (*P. aurinopileatus*) 黄色，分布于
东亚；凤尾菇 (*P. pulmonarius*)
菌柄拉直，无网。



侧耳菇



侧耳侧生或无。101



科

种

生长要

贝壳状小香菇 (COCKLESHELL FUNGUS)

顾名思义，这是一种形似贝壳的蘑菇；菌盖光滑，
红褐色，边缘向内卷曲。菌柄侧生。菌柄浅灰褐
色，延生；和所有香菇种类一样，菌

柄，有的有气，有的却无气味，菌肉味苦。

• 生长分布：腐烂的阔叶树桩，广泛

分布于北温带，局部常见。

• 相似种：卡斯托里香菇 (*L. castoreus*)
和多鳞香菇 (*L. vulpinus*) 有肉质的绒
状菌盖。密恩香菇 (*L. micheneri*) 是子
实体单生。



子实体。

尺寸 菌盖 $\oplus$ 2—6cm | 菌柄 $\downarrow$ 2—5cm $\leftrightarrow$ 0.8—1.5cm

孢子 白色

可食性 ☒

科

种

生长季节

贝形圆孢侧耳 (ANGEL'S WINGS)

子实体呈扇形，在很远的地方注目。这种呈漂亮扇形的子实体，常向内弯曲，菌褶稠密，白色，后变黄。细长的白色菌丝散发出令人心悦的气味。

· 生长分布：生长于腐朽的云杉、枞树等针叶树树干、树枝。分布于北温带，常见于局部。

· 相似种：小扇菇 (*Panellus mitis*) 形状相似，却小得多；生长于针叶树树杈杈上。



子实体生长于林地腐朽针叶树残桩上，大丛生

尺寸

孢子

科

种

生长季节

亚侧耳 (OLIVE OYSTER)

种橄榄色蚝菌：形状与蚝菌相似（见第178—179页），但颜色较暗，没有食用价值。

· 生长分布：广泛分布于北温带。

· 相似种：与亚侧耳相似的还有另一种，但孢子印是赭粉色的。



◆ 未成熟子实体菌褶



◆ 未成熟子实体菌褶



子实体通常浓密丛生

尺寸

孢子

可食性

科

目

生长季节

鳞皮扇菇 (FALSE OYSTER)

鳞皮扇菇 (False Oyster) 是一种有毒的蘑菇，其子实体呈扇形，表面覆盖着鳞片状的结构。它通常生长在针叶树的地上，尤其是在冷杉和云杉的枯木上。这种蘑菇的菌盖颜色通常为深棕色或黑色，边缘可能带有白色或浅色的环状结构。它的菌褶呈辐射状排列，颜色为深棕色或黑色。鳞皮扇菇的菌柄较短，基部略膨大。这种蘑菇的毒性较强，误食后可能导致严重的中毒反应，甚至危及生命。


不可食。美洲的鳞皮扇菇菌褶可在黑暗发光，而欧洲扇菇没有这种性质

• 生长分布：生长于林地的山毛榉、橡树等阔叶树树桩上。广泛分布于北温带

• 相似种：小扇菇 (*Panellus mitis*) 色泽较白，子实体较小，口味青淡；生长季节较晚，多生于针叶树上



小扇菇



尺寸 生长季节 可食性

裂褶菌 (SPLIT-GILL FUNGUS)

裂褶菌 (Split-gill Fungus) 是一种有毒的蘑菇，其子实体呈扇形，表面覆盖着鳞片状的结构。它通常生长在针叶树的地上，尤其是在冷杉和云杉的枯木上。这种蘑菇的菌盖颜色通常为深棕色或黑色，边缘可能带有白色或浅色的环状结构。它的菌褶呈辐射状排列，颜色为深棕色或黑色。裂褶菌的菌柄较短，基部略膨大。这种蘑菇的毒性较强，误食后可能导致严重的中毒反应，甚至危及生命。

• 进行遗传学研究

生长分布

于稻草堆上，尤其是在露天条件下。广泛分布并常见于北温带



菌盖上的菌褶
子实体呈绿色



菌盖边缘破裂
成裂片形



子实体往往是层叠拥挤

尺寸 生长季节 可食性


黑毛桩菇 (VELVET ROLL-RIM)

种肉肥多绒覆盖的蘑菇。菌盖深褐色。中心凹陷，边缘内卷厚实。菌柄通常侧生于菌盖基部稠密、松软、奶油色至褐色。浅色菌肉味苦、无明显气味。菌体常被用作染料，可将羊毛染成灰色或灰绿色。


· 生长分布：生长于林地、田野的

见于北温带地区。

· 相似种：耳状网褶菌 (*P. pinnuoides*) 菌盖较薄、色淡、没有良正的菌柄，生长于针叶林木，室内户外均可生长；与黑毛桩菇同属于小塔氏菌 (*Tapinella*) 属。



子实体生长于树桩周围，常生成几朵丛生



科 网褶菌科

种 *Tapinella corrugata*

主+要

波纹桩菇 (CORRUGATED ROLL-RIM)

长得层层叠叠，黄褐色至橄榄褐色，这些特征使波纹桩菇的识别轻松容易。这种蘑菇有着牡蛎形的扩张菌盖，黄色至橙色的菌褶。结实的黄色菌肉味苦、气味难闻，是否可吃尚不可知。

· 生长分布：枯死的阔叶树和针叶树上都有发现。分布并常见于北美东部。

· 相似种

· 绝大多数特征都很相似，甚至菌褶也有相似之处。



子实体生长于枯木上，常生成几朵丛生

科 网褶菌科

主+要

可食性

科

种

生长季节

粘锈耳 (SOFT SLIPPER)

菌盖大，扁圆形，干燥时，平滑的针形菌盖色泽可从灰褐色变至米白色；潮湿时，菌盖边缘的射线状条纹清晰可见。菌柄尚未发育时，菌盖肉上粘落，菌肉有微弱气味。

· 生长分布：阔叶林、山毛榉等阔叶树死枝上。广泛分布于北温带。

· 相似种：卡斯提锈耳 (*C. cerasi*) 的孢子形状较圆，变色锈耳 (*C. inhomestus*) 菌盖黄中透红。能适应各种生长环境，菌柄常是草本植物茎秆。

子实体：菌盖直径 2—7cm，菌柄中等，肉质，柔软。

孢子：椭圆形，无色，光滑。

子实体：菌盖直径 2—7cm，菌柄中等，肉质，柔软。

尺寸 菌盖 2—7cm

孢子 椭圆形

可食性 中性

多形靴耳 (VARIED SLIPPER)

菌盖大，扁圆形，干燥时，平滑的针形菌盖色泽可从灰褐色变至米白色；潮湿时，菌盖边缘的射线状条纹清晰可见。菌柄尚未发育时，菌盖肉上粘落，菌肉有微弱气味。

· 生长分布：阔叶林、山毛榉等阔叶树死枝上。广泛分布于北温带。

· 相似种：卡斯提锈耳 (*C. cerasi*) 的孢子形状较圆，变色锈耳 (*C. inhomestus*) 菌盖黄中透红。能适应各种生长环境，菌柄常是草本植物茎秆。

子实体：菌盖直径 2—7cm，菌柄中等，肉质，柔软。

孢子：椭圆形，无色，光滑。

子实体：菌盖直径 2—7cm，菌柄中等，肉质，柔软。

科

目

子囊菌纲

松塔牛肝菌

(OLD-MAN-OF-THE-WOODS)

菌盖半球形，表面有鳞，灰棕色

菌柄粗壮，近基部有网纹，灰棕色

生于阔叶林下，秋季至初冬

分布于欧洲、北美、日本、朝鲜、蒙古

管口圆形至角形，松塔

牛肝菌或有毒，最好不吃

· 生长分布

针叶树下 分布于北温带的阔叶地

· 相似种：生长在北美和日本的角

嘴松塔牛肝菌 (*S. conus*) 鳞片较薄，但色

泽同样可变粉

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体


子实体

子实体

子实体

子实体

子实体



科 牛肝菌

种 *Chalciporus piperatus*

生长季节 夏 秋

辛辣牛肝菌 (PEPPERY BOLETE)

小牛肝菌，除了菌柄和肉是诸黄色外，通体红褐色：菌柄

长0.3-1cm，菌肉有强烈辛辣味如胡椒香味，有人把它当

成调味品，但它却是一种不可食牛肝菌

· 生长分布：林间阔叶树和针叶树形成菌根 广泛分布

于整个北温带

· 相似种：苦杏牛肝菌 (*C. amarellus*) 色泽显得较

为粉红，味道较为柔和，不那么辛辣 红牛肝菌 (*C.*

rubinus) 菌管接近红色，生长于阔叶树下

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体


子实体

子实体

子实体

子实体

子实体



子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

科

2

牛放李均

美味牛肝菌 (PENNY BUN)

角柄上部的白色网纹和淡黄
全微粗糙的胞管层、菌盖

长或棒形。菌盖、菌柄部呈深、浅褐色并因这种深受自爱化影响有似令人愉悦的淡淡气昧。

白色而味美柔和。用煎后不变色。


· 生长分布：在多种林地和针叶林。阔叶树形成菌根。分布非常广泛。

• 相似种：栗生肝 4₁ (*B. aeruus*)、网
内生肝 4₁ (*B. reticulatus*) (图见 189
页)



◀ 隨意隨心

1994年12月 第47卷 第4期



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1



五十年來



物 物 物

于实体上
舒的土地上

小如冲。往往有四五条线

由于牙性胎子般发渐变为物

$$\overline{F + t}$$

子

科

种

生长季节

绿盖牛肝菌 (SPINDLE STEMMED BOLETE)

菌管为鲜柠檬黄色，老熟后变褐黄色或蓝色；菌柄呈黄网纹色。菌柄临近地面部分变细成锥形。选择性可食，菌肉结实、淡黄至锈色，可轻变蓝，有胶、淡淡的好闻气味。

· 生长分布：和林地中的橡树等阔叶树形成菌根、分布广泛，但多见于南欧。

· 相似种：拟根牛肝菌 (*B. radicans*) 菌盖颜色较浅，菌柄更为粗壮。



侧面



子实体

↑

++

+

++

↑

↑

41

种

生长季节

褐盖牛肝菌 (BAY BOLETE)

菌盖小圆至包形，表面平滑，相当油腻，深栗褐色。

菌管小，深褐色，老熟后变蓝黑色；菌柄粗壮，深褐色，老熟后变蓝黑色。

菌肉浅褐色，老熟后变蓝黑色；有胶、淡淡的好闻气味。

· 生长分布：和松树形成菌根；分布广泛，但多见于南欧。

· 相似种：美味牛肝菌是桶形菌柄，菌盖颜色较浅，菌柄更为粗壮。


· 相似种：美味牛肝菌是桶形菌柄，菌盖颜色较浅，菌柄更为粗壮。

· 生长分布：和松树形成菌根；

· 相似种：美味牛肝菌是桶形菌柄，


· 相似种：美味牛肝菌是桶形菌柄，

· 相似种：美味牛肝菌是桶形菌柄，



老熟后变蓝黑色

面有星点状斑



侧面



林地上单生或散生的子实体

尺↑

++

+

++

↑

↑

科 牛肝菌

| 种 *Boletus calopus*

主 要 分 布

丽柄牛肝菌 (SCARLET STEMMED BOLETE)

有盖小圆面包形、菌盖皮层悬垂边缘，呈
绒状，有少许脉纹，烟灰色或灰褐色

菌柄圆柱形似桶形或锥状

柄上有淡黄色网

色，越靠近基部色越深，越红

变色呈浅蓝色。

• 生长分布：和生长在酸性沙质土上的针叶树和

相似种

因菌肉蓝黑色和味道柔和而著名。



丽柄牛肝菌
● 菌柄基部



丽柄牛肝菌

显眼的橙红色菌柄底纹和幼嫩



△双色牛肝菌 (*B. bicolor*)

北美东部夏季常见的一种牛肝



双色牛肝菌

代 101

有可区别按所美黄黄茎 101

科 牛肝菌科 种 牛肝菌属 生长季节 夏、秋

细网牛肝菌 (SATAN S BOLETE)

小菌面包形菌盖平滑，表面近乎苍白，管口橙色至黄白色，菌管细密，菌柄有细密的网纹，凭借这几项特征，要识别这种被称为“撒旦的牛肝菌”并不难。黄白色的菌肉可变成浅蓝色，管口也一样。菌管凹生，长1—3cm，黄绿色，味道柔和，有微毒；偶尔可引起严重肠胃反应。成熟子实体气味难闻。

· 生长分布：和混合林、林地的桦皮桦、花旗松、白杉形成菌根，分布于北美和新墨西哥西海岸。



尺寸 菌盖直径 5-15cm | 菌柄高 8-16cm | 菌管长 2.5-5cm

美丽牛肝菌 (PRETTY POISON BOLETE)

识别：菌管受损变蓝黑色，菌盖小面包形，被绒毛覆盖，红色至嫩褐色；菌肉质地结实，黄色，刮伤变蓝色；菌柄膨胀、红褐色，上部被深红色的网纹覆盖。凹生菌管长0.5—1.5cm，黄绿色。

· 生长分布：和混合林、林地的桦皮桦、花旗松、白杉形成菌根，分布于北美和新墨西哥西海岸。



子实体生长于混合树林，单生或群生。

尺寸 菌盖直径 5-15cm | 菌柄高 8-16cm | 菌管长 2.5-5cm

科 牛肝菌科 种 *Boletus legaliae* 生长季节 夏、秋

利格牛肝菌 (LEGAL S BOLETE)

和菌柄有网纹，但较难描述具体识别特征的红色牛肝菌。菌盖平滑、粉橙色，菌柄也是相似颜色，菌柄上端布满网状花纹，管口红色，菌管凹生，长1—2cm。米白色至淡黄色菌肉有淡淡的好闻气味，破损后轻度变蓝；菌柄基部变色为浅粉色。口味柔和，但有毒。

· 生长分布：多和碱性土生长的阔叶树形成菌根，多分布于南美，仅局部有见。

· 相似种：红黄褶孔牛肝菌 (*B. rhodanthus*) 菌盖紫橙色。



子实体单生或几朵聚集出现，极少群生。

尺寸 菌盖直径 5-15cm | 菌柄高 8-16cm | 菌管长 2.5-5cm

孢子 暗褐色 可食性 否

粉被牛肝菌 (BLACKENING BOLETE)

这种牛肝菌的特点是出现受损即很快通体变黑。菌盖半球形、褐色至红褐色；菌盖下的管口角形、暗黄色。带红点的黄色肉柄比较细。菌管轻度凹生至轻度凹陷，长0.5—1.5cm，浅黄色至橄榄黄色；菌肉粉质、黄色。口味柔和，但不可食用。

• 生长分布：常和生长于肥沃土地的橡树等阔叶树形成菌根。广泛分布于北温带，但只是局部地区有产。

• 相似种：红点牛肝菌有柄比较厚。

红色；切片时菌肉变黑。



子实体生长于橡树根部，菌盖裂开，菌柄较细。

尺寸 菌盖 4—10cm 菌柄 4—10cm 0.5—3cm

孢子 卵圆形至椭圆形

可食性 不可食用

裂盖红牛肝菌 (RED-CRACKING BOLETE)

与前者较少，子实体较小的一种牛肝菌。菌盖半球形，红褐色，皮层易开裂露出下面的红褐色。菌柄有黄红色的圆柱状菌柄条纹，但不清晰。角形管口的黄褐色可因受损变为淡蓝色。白色或淡黄色的菌肉几乎全无毒。


• 生长分布：和阔叶树形成菌根，尤其是多和生长于通透性良好的红腐殖质（酸性环境下形成的高腐殖土）上的山毛榉树形成菌根。分布并常见于北温带部分地区。

• 相似种：辣味牛肝菌（*B. prunatus*）菌盖表面一般不破裂。


• 相似种：辣味牛肝菌（*B. prunatus*）菌盖表面一般不破裂。

• 生长分布：和阔叶树形成菌根，尤其是多和生长于通透性良好的红腐殖质（酸性环境下形成的高腐殖土）上的山毛榉树形成菌根。分布并常见于北温带部分地区。

• 相似种：辣味牛肝菌（*B. prunatus*）菌盖表面一般不破裂。




子实体生长于橡树根部。



子实体生长于橡树根部。



剖面



尺寸 菌盖 3—10cm 菌柄 3—10cm 0.5—2cm

孢子 卵圆形至椭圆形

可食性 不可食用

血红牛肝菌 (RED CAPPED BOLETE)

的管口破裂可变蓝。黄色菌管长0.5—1cm

属。比如红盖开裂牛肝菌

• 生长分布：和阔叶树形
成菌根，常生长于草地，


但仅在局部地区有见

• 相似种：双色牛肝菌（见第
190页） 嫩感牛肝菌（B



• 管口黄至
蓝绿色

• 菌柄黄至
淡棕色



• 菌柄

• 子实体

科 牛肝菌


种 *Boletus subtomentosus*

绒盖牛肝菌 (YELLOW-CRACKING BOLETE)

虽然其名有“开裂”两字，但这种菌盖金褐色，
小圆而包形的整菇表面其实极少开裂。菌柄也
是金褐色，角形管口，菌管长0.5—1.5cm，
黄色。管口受损会稍变为蓝色。可食，松
软、淡黄色的菌肉却没有一丝香气。

• 生长分布：和阔叶树和针叶树都能形成
菌根，广泛分布并相当常见于北温带，亚
北极区和高山地区也有分布。

• 相似种：辣味牛肝菌较小 锈红粉孢牛



• 菌柄黄至
淡棕色



• 子实体



子实体单生或几朵聚集

科

属

生长季节

寄生牛肝菌 (PARASITIC BOLETE)

菌盖：半球形至扁半球形，直径5-10cm，表面光滑，颜色由浅黄至深褐色。

菌柄：粗壮，圆柱形，高5-10cm，表面光滑，颜色与菌盖一致。

菌肉：厚，淡黄色，质地柔软，有弹性。

孢子：椭圆形，大小4-6μm × 2-3μm，无色，光滑。

子实体：生于黄硬皮马勃 (Scleroderma curinum) 上。

生境：林下，腐生，菌肉淡黄色，口味极

差，不主张食用。

• 生长分布：跟黄硬皮马勃

(*Scleroderma curinum*，见第

286页) 同生，生于林下。

成菌根。分布于欧洲，至

少扩展至北美东部地区。



黄硬皮马勃上



子实体生于黄硬皮马勃

科

属

生长季节

栗色圆孔牛肝菌 (CHESTNUT BOLETE)

菌盖：半球形至扁半球形，直径5-10cm，表面光滑，颜色由浅黄至深褐色。

菌柄：粗壮，圆柱形，高5-10cm，表面光滑，颜色与菌盖一致。

菌肉：厚，淡黄色，质地柔软，有弹性。

孢子：椭圆形，大小4-6μm × 2-3μm，无色，光滑。

后不变色，其坚果较味讨人喜欢。

• 生长分布：生于林下，腐生，菌肉淡黄色，口味极

差，不主张食用。

北温带，局部相当常见。



不变色的皮白
色菌柄菌肉



子实体生于森林中木桩上；
阔叶树下



剖面

在琥珀的

金褐色菌盖

科

属

生长季节

可食用

蓝空柄牛肝菌 (CORNFLOWER BOLETE)

图 4

选择性可食。有令人心悦的苹果香气

· 生长分布：和林地里的阔叶树和针叶树都能形成菌根。广泛分布于北温带地区，但仅是局部地区有见。



子实体
沙质土上



侧·横切面·



剖面

尺寸 菌盖宽 5—8cm，菌柄高 6—10cm，菌盖厚 2—3cm

科 牛肝菌科

种 *Leccinum tessellatum*

黄孔疣柄牛肝菌 (YELLOW PORED SCABER-STALK)

图 12

很特别。管口赭黄色可变紫褐色，白柄黄色，有赭黄色斑痕。临近基部处褐色并出现网状花纹；菌盖小圆面包形，表面黄褐色略呈

紫黑色，可食，但没有吸引人的口味

· 生长分布

欧洲温暖地区，



子实体



侧·横切面·

硬质的浅黄色
管口可变为紫
色至紫黑色

剖面



尺寸 菌盖宽 5—8cm，菌柄高 6—10cm，菌盖厚 2—3cm

科 牛肝菌科

种 *Leccinum tessellatum*

选择性可食

和

轴

生长季节 夏—秋

褐斑柄牛肝菌 (BROWN BRCH SCABER STALK)

要识别这种多孔菌，需认准两项标记：褐色菌盖下的灰白色管口，灰色菌柄上的灰黑色鳞片；但与近缘种的区分，仍有一定困难。褐疣柄牛肝菌常常是所有褐色菌盖的疣柄牛肝菌（见下插图：变色疣柄牛肝菌）的统称。菌盖小圆扁盘形，菌盖菌肉松软，棒形菌柄的菌肉则是纤维质。跟某些近缘种不同的是，褐疣柄牛肝菌几乎不变色。可食，但因采摘后很快变质。一般不主张食用。

• 生长分布 产

乳根 广泛分布于北温带

送各站小票

● 葡萄乾果醬



平实体上



△变色疣柄牛肝菌 (*L. variegator*)

与色菌柄菌肉可变为粉红或青绿。菌
萼菌肉粉色，菌管灰白色。⑩

【材】 西洋菜 6—15cm | 菜叶 1

$$\frac{F}{A} = \frac{7}{1}$$

「丁巳年」

科 牛肝菌

种 *Leccinum versipelle*

生长季节 夏—秋

橙色疣柄牛肝菌 (ORANGE BIRCH BOLETE)

这种真菌非常漂亮：小菌面包形的橙色菌盖与

由浅灰至赭灰，菌管同生，长1—3cm，污白色

但是缺少牛肝菌的某些特殊风味。

• 生长分布 广泛分布并常见于北温带

根 广泛分布并常见于北温带

印形菌盖

剖面

子实体成堆

• 菌口色淡灰
至灰至赭灰色

• 菌管白色至淡灰
至灰至赭灰色

子实体单生或几朵聚生

尺寸

尺寸

可食性

科 牛肝菌

| 种 *Leccinum quercinum*

生长季节

朽柄牛肝菌 (RED OAK BOLETE)


属于有红色菌盖的朽柄牛肝菌，可
根据菌根寄主（见“生长分布”）

或有红褐色鳞片的菌柄进行
识别。小菌盖面包形的菌盖
橙褐色，管口米白色至
灰色或橄榄黄色，梗部
与几乎全黑。

• 生长分布：和林地
中的橡树形成菌根。
广泛分布并常见于北
温带的某些区域。

• 相似种：橙柄朽柄牛肝
菌 (*L. aurantiacum*) 菌盖紫

色 (*L. vulpinum*) 则分别和云
杉、松树形成菌根。



科 牛肝菌

| 种 *Suillus luteus*

| 生长季节 夏季 秋季


褐环乳牛肝菌 (SLIPPERY JACK)

菌盖半球形，紫褐色；短菌柄，通体黏糊；菌盖皮
容易剥落。菌管直生或轻微延生，管口柠檬黄色。
菌环底面色多深紫。菌环下的菌柄白色，老熟后变
紫。菌环上部有柄地足深紫色斑点的
浅黄色。食用这种蘑菇要小心，谨
慎；有人对这种真菌过敏，引发
严重症状。

• 生长分布：和松树形成菌根。
广泛分布并常见于北温带。



子实体群生，一般生长于针
松树下。



孢子 柠檬色

可食性 100

科 担子菌纲 生长季节

厚环粘盖牛肝菌 (LARCH BOLETE)

种色泽鲜艳的牛肝菌，菌盖半球形，亮黄色至橙黄色，十分粘滑；柠檬黄的管口触碰受抑呈桔褐色。黄褐色菌柄顶端的黄白色菌环也是粘糊糊的。可食，但没有特色口味，未成熟子实体的黄色菌肉结实，没有污痕。采摘时，粘滑的菌表皮层极易脱落。

• 生长分布：和林地、种植园、花西甲的落叶松树形成伴根。广泛分布并常见于北温带。

• 菌盖宽展，
• 菌柄至多增粗

• 菌盖宽展，
• 菌柄至多增粗
• 菌肉黄，菌环黄

剖面



和绿柏盖牛肝菌



白环牛肝菌



子实体生长于草地和腐殖地

尺寸 菌盖 5-10cm | 菌柄 4-10cm

可食性 (O)

科

担

三 牛 肝 菌

粘盖牛肝菌 (JERSEY CON BOLETE)

菌肉松软，粉红色至褐奶油色，可食用，但缺少香味

• 生长分布：和双针松树形成菌根；通常是与
粉盖牛肝菌、玫红铆钉菇生长于同一
环境 分布并常见于欧洲和东亚





图1-2-11



图1-2-12



• 0.1—1cm, 菌肉
呈块状



子实体群生，常生于苔藓地
或沙壤地

科 毛茛科

担

三 牛 肝 菌

点柄粘盖牛肝菌 (DOTTED STALK BOLETE)

基部 菌盖锈褐色至橙黄色 未成熟子实体的小细
菌管1 可流出乳汁似的水滴，菌柄分泌腺也同样
白色至淡黄色菌肉结实，有柔和的苹果香味

生长分布

• 相似种：褐环孔牛肝菌 褐粘盖牛
肝菌 (*S. collinus*) 菌盖色较




图1-2-13



子实体




图1-2-14




图1-2-15

尺寸

++

+

++

尺寸

++

+

斑粘盖牛肝菌 (VARIEGATED BOLETE)

柄长、多肉的斑粘盖牛肝菌

菌盖半球形，棕褐色，表面粗糙。

1 柄色至橄榄褐色，与淡黄色菌肉一样，它在破损挤压后将变蓝色。褐色菌柄显橄榄绿色或淡红色。可食，但有一股金属气味，口感也不太好。

• 生长分布：和双针松形成菌根，多与石南属植物或其他喜酸性植物相伴而生。

分布非常见于欧洲和邻近

非洲的部分地区。

• 相似种：硬皮马勃类（见第256、263页）真菌气

但外形不同



子实体几朵聚集或群生



菌盖

子实体大时能



虎皮乳牛肝菌 (PAINTED BOLETE)

根据其菌盖干燥、有鳞、红色，有白色菌丝残片和黄色大管口这几项特征，这种牛肝菌的识别应十分容易。半球形菌盖，菌柄略呈棒形，红斑黄色。残留菌丝最初附着未成熟管口，在菌柄上端留下蛛网状网环。菌管直生至轻度下行。黄

色肉质质地坚硬，口味柔和，暴露后变粉色。

• 生长分布：和生长于林地，公园的东部白松形成菌根。广泛分布非常见于北美东部，以及东部白松生长区。



子实体独生或成群出现于东部白松下

菌肉坚硬

本

（见第211—233页）相比，这类多孔菌有明显的

211—233页）相比，这类多孔菌有明显的

科

属

牛肝菌科

绵毛盖多孔菌 (SHEEP POLYPORE)

色，可变色呈粉橙色或绿黄色，特别是在管口位置，半球形菌盖的皮层往往在老熟后龟裂。菌柄粗壮坚硬，白色菌肉，味清淡带苦。

• 生长分布：多与苔藓地上的云杉形成菌根。广泛分布于整个北温带地区，局部常见。

• 相似种：地花菌 (*A. confluens*) 呈粉橙色，不变黄色；味苦，亚变红白孔在 (*A. subrubescens*) 可变橙色。



子实体生长于云杉树下，新生菌盖

尺↑

++

◇

..

↑↑

↑

科

属

牛肝菌科


猪苓 (UMBRELLA POLYPORE)

大型肉质多孔菌，由主+菌柄分枝生出许多中生菌柄，每枝小菌柄顶着顶端或灰至灰色的小圆菌盖，菌盖下是角形管口，1—3个mm，管口色，呈白色至淡黄色，选择性可食，菌肉硬质，味爽，白色至奶油色。和其他多孔菌不同的是，这种多孔菌有一个人的黑色假菌核，早太理

和泥土混合体。

• 生长分布：生长于阔叶林中空地，散布于北温带地区。

• 相似种：无中生菌柄的灰树花（见第216页）无中生菌柄



子实体

尺↑

++

◇

..

↑↑

↑食性↑

宽鳞多孔菌 (DRYAD'S SADDLE)

早地出现在朽树或树桩上；子实体
中昆虫的美餐，被嚼吃一空，仅剩下

• 生长分生
广泛分布并常见于北温带




图 1



0.5 1 mm



图 2



子实体

科 多孔菌 | 种 *Polyporus tuberaster* | 生长季节 春夏 秋

块茎多孔菌 (TUBEROUS POLYPORE)

这种多孔菌有明显中心凹陷的坦平菌盖，菌盖上突起的褐色鳞片下衬托着浅色表面，褐色菌柄中生，可深植于地下形成膨大的贮藏组织。这种结构即使不是太大，但也不小。菌肉可吃，但相当坚硬。白色菌管长5mm

- 生长分布：多生于碱性土的阔叶树林地，危害树木。分布于北温带，但仅局部有见
- 相似种：宽畴多孔菌有侧生菌柄，菌盖鳞片坦平



子实体中生，常在地下形成贮藏结构

尺寸 菌盖 4-20cm | 菌柄 高可达 8cm 宽 1-5cm

科 多孔菌 | 种 *Polyporus badius* | 生长季节 春夏 秋



栗褐多孔菌 (LIVER-BROWN POLYPORE)

菌盖表面有鳞片，初生时呈浅褐色，随生长变浓色的深栗色，菌盖边缘新鲜时褐色；人气菌管口初生时呈白色，后变黄褐色

边缘，4-8个管口/mm，延生菌管层厚0.5-2mm 白色 菌肉过于坚硬难以食用

- 生长分布：生于潮湿林地的阔叶树上。分布于北温带，局部常见
- 相似种：黑柄多孔菌 (*P. meliantherus*) 菌柄黑色，菌盖初生时呈白色，后变黄褐色

生长在碱性土林木上。



管口表面

尺寸 菌盖 4-20cm | 菌柄 高可达 8cm 宽 1-5cm

科 多孔菌

种 *Polyporus varius*

生长季节

杂色多孔菌 (VARIED POLYPORE)

菌盖边缘波浪形，菌盖呈金黄色至桔褐色，色泽均匀，平滑。偏离中心的菌柄老熟。

子实体大小不一，菌盖直径可达10cm，菌柄高约10cm。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

有的子实体较小，菌盖直径约5cm，菌柄高约5cm。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

生长分布：可见于林地和公园的枯木上。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

菌盖呈金黄色

科 多孔菌

种 *Polyporus brunnatus*

生长季节 秋季—冬

冬生多孔菌 (WINTER POLYPORE)

子实体硬而脆，深灰褐色的圆形菌盖中心凹陷，边缘有流苏。

气候干燥时向内卷曲。中生菌柄深灰褐色，菌肉白色。

白色至奶油色的菌管壁厚2mm，管口大而圆，随成熟拉长。

这种蘑菇进入秋天才得以发生，生长高峰期为初冬。

可越冬生长，直到初春才进入休止期。

生长分布：成群生长于矮灌木丛和阔叶树倒木枯枝，形成白色腐木。广泛分布并

常见于北温带。

相似种：绿毛多孔菌 (*P. ciliatus*)

生于春季，管口小，5—6个/mm。其他

的相似多孔菌主要生长在温暖地区。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。

子实体在枯木上生长，菌盖与菌柄分离，菌柄基部腐朽。



子实体

菌柄老而变
成，蛋圆形

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

子实体

菌盖蜂巢状、脑状或鞍状

本章所介绍的大部分蘑菇种类被认为是从杯状真菌（见第264页）进化而来。这些“杯子”交叠环绕地在菌柄上隆起。交叠部分上有平滑的孢子形成层——即子实层。这里精选部分有蜂巢状结构的羊肚菌予以介绍。



科 马勃菌

种 *Helvella crista*

生长季节 夏 秋

皱马鞍菌 (COMMON WHITE SADDLE)

菌柄外形起皱凹陷成腔，菌盖马鞍状，色泽淡奶油白，根据这些特征，皱马鞍菌不难识别。这种真菌大小变化很大，但是典型菌体都很小，可食，菌肉相当细薄，但不主张食用；仅日晒直至碎裂或在水中彻底煮沸后才可考虑食用。

• 生长分布：生于碱性土的阔叶树

和其他几种马勃菌一样，皱马鞍菌常和松茸、丝盖伞混生一起，广泛分布并常见于北温带的大部分地区。



△斑点马鞍菌 (*Stropharia aeruginosa*)

原产北美。菌盖鞍状，暗白色，菌柄白色。

珊瑚菌（见第264页）是近缘种；大群生，可食。



菌肉或可食

菌入土中

子实体群生或单生

多主马勃菌 (COMMON GREY SADDLE)

最常见的马勃菌，但其大小、形状、色泽变化却较大。从色泽来看，可能是浓淡相间的任何灰色，菌盖既可以呈鞍形，也可以是正旋盘绕或呈浅裂状。菌柄上外有显著凹槽，内有串孔。菌肉为黄，灰色至脏白色。和皱马勃菌一样。经晒干、煮沸处理后可食用，但不宜生食用。

· 生长分布：生于林地，碱性

有七牛球的山第和山区地区



子实体生长于田野上，野生大草生

鹿花菌 (FALSE MOREL)

有盖帽形、棕褐色、内有串孔，据此特征即可轻松识别。白色的短柄几乎中空，在肉白色。有毒，但在欧洲部分地区、经晒干或用水中反复煮沸后，仍有人把这种蘑菇当美味食用。

· 生长分布：生于沙质地的针叶树附近或木屑堆上，分布于北温带。

· 相似种：1. 大鹿花菌

(*G. gigas*)，2. 褐鹿花

菌 (*G. brunnea*)，

3. 暗铜色鹿花菌

(*G. caroliniana*)。


通常个头更大，

有较为鲜艳的橙红色

色；在北美部分地区常见。



猪胆花菌



剖面



十厘米

尺寸 菌盖 5—15cm 菌柄 5cm × 2—4cm

孢子

有毒性

科 羊肚菌

种 *Verpa conica*

| 生长季节 春

圆锥钟菌 (THIMBLE CAP)


形，深褐色，内体色泽较浅，菌柄圆柱形，米白色，表面呈粉状。菌肉很薄，但可吃。

· 生长分布：生长于普通林地的白垩土或沙堆上。分布于北温带。

· 相似种：皱盖钟菌 (*V. bohemica*)，可吃，菌盖有皱，子囊2孢型，而圆锥钟菌是4孢型；两种类型的子



子实体常生于树蔭下的落叶腐殖中，群生。



科 羊肚菌

种 *Morchella esculenta*

| 生长季节 春

羊肚菌 (COMMON MOREL)

菌盖呈蜂窝蜂巢状，外形多变，卵形、圆形、锥形均可出现，

显得十分特殊；随着表面

子实层孢子成熟而膨出，

色泽从多褐灰色变为

至浅褐色，白色至奶

白色的菌柄在基部也

表面粉状。菌肉

米白色至浅褐色，口

味、气味都很不错。羊

肚菌因在大小、形状上变

化极大而被呈此真菌学家划分

成好几个独立种。

· 生长分布：多生于阔叶林地和针叶林地的草本植物丛中，世界各地均有，

较热地区少见。



· 相似种

菌盖呈脑形，有毒。

子实体 + 可食性

子实体 + 可食性

子实体 + 可食性



子实体 + 可食性

尺寸

孢子

可食性

科 羊肚菌 | 种 *Morchella elata* | 生长季节 春

高羊肚菌 (BLACK MOREL)

和褐色至烟灰色凹陷。菌柄白色
质地易碎和有好闻坚果气味的高羊
肚菌常可作为一道美味，但对某些
体质过敏的人而言，这直美味可能
会引起肠胃不适
• 生长分布：生于公园、开阔林
地；另有一类高羊肚菌则在夏季出
现于山区，分布于北温带
• 相似种：羊肚菌菌盖黄色有浅色
脉纹。各种鹿花菌有毒，菌盖缺少
凹痕，有脐眼，菌柄亦中空

菌盖棱形，尖



子实体生于阔叶树和针叶树下，特别是在火
烧地，成群生

尺↑ | 孢子 | 可食性↑

科 羊肚菌 | 种 *Morchella semilibera* | 生长季节 春

半开羊肚菌 (HALF FREE MOREL)

较小羊肚菌，菌盖锥形，深灰褐色，有蜂
巢状皱纹凹陷，边缘与菌柄脱离。菌柄纤细，
中空、白色至奶油色，表面粉状。可食，但
奶油色的菌肉太薄，难以清理
• 生长分布：生于公园、开阔林
地，湿地路边可见。广泛分
布于北温带
• 相似种：钟菌属（见第209
页）成熟的小小尖顶兜帽形羊
肚菌只与菌柄顶部相连

菌盖表面呈
蜂窝状凹痕

菌柄阔柱形

肉质不多

剖面

黄色至褐色



子实体
群生

尺↑ | 孢子 | 可食性↑

子实体覆瓦形或皮壳状

本章所述真菌的特征是子实体形如盖瓦
就像支架似的从基质处向上长出或平伸而出
或平伏生长（翻转倒生）形如皮壳。
产生孢子的子实层可由菌管组成（管口露表面，
子实层有的平滑，有的起皱。



多孔

这

1. x 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2

桦剥管菌 (RAZOR-STROP FUNGUS)

半圆形、一年生、覆瓦形真菌表面如壳。

褐色、九、十、十一、白、

菌肉松软但结实、白色，气味好闻，

却不可吃。曾被用来磨刀，故又

被称为“磨刀皮磨菇”；钟表

匠则把这种磨菇用来擦亮

钟表。这种真菌多受寄生

真菌紫肉座菌 (*Hypocrea*

pulvinata) 的干扰；橙

色肉座菌 (*Hypomyces*

aurantius) 一旦在树上生

长，多孔菌就只能脱逃

。生长分布：生于潮湿林

地，常与木蹄层孔菌 (*Fomes*

fomentarius，见第219

页) 混合生长。多寄

生在老桦树上，引起

褐腐病，危害树木。广

泛分布并常见于北部

● 产 量 ●
● 电 话 号 码 ●
● 白 雪 号 ●



剖面

子实体数朵聚生于

管 3/mm

紫色多孔菌 (PURPLE-DYE POLYPORE)

扇形覆瓦状真菌的所有部分都呈桔红色。表面、菌肉以及厚1cm的菌管层均为桔红色，遇碱液变鲜紫色，可用来染羊毛。菌肉质地比较松软，不可食。


- 生长分布：生于林地的阔叶树死木上，产生白色腐斑。分布于北温带，多见于局部地区。
- 相似种：朱红密孔菌 (*Pycnoporus cinnabarinus*，见第225页) 质地较硬，朱红色的子实体很是鲜艳。



子实体单生或群生，在叠排出现在死树上



管口2—4个/mm



管口表面

肝色牛排菌 (BEEFSTEAK FUNGUS)

1.5cm，浅红色表面管口2—3个/mm，作为多孔菌，它的菌管非常容易分离。子实体呈粉红至橙红色，很快变紫褐色，或许有不显眼的短柄。厚实有脉纹的菌肉看起来像牛肉或肝脏。可参看一种血红色的液体，气味相当好闻，但口味却很酸。

- 生长分布：寄生于活栎树和甜栗树上。分布于北温带，局部有见。



子实体多生于大树的低部树干上

巨多孔菌 (BLACK STAINING POLYPORE)

全可宽达一米，每个扇形托架的


味愉悦，白色、松软。未成熟子实体可食，成熟时由灰色变为黑色；但是，这时发出的气味就不是那么好闻了。来自

- 生长分布：林地、公园的阔叶树死树或腐木上都可发现，很少生于针叶树。广泛分布并多见于

幼嫩木材
腐朽木材

• 子实体
菌褶白色
颜色深紫
• 子实体
幼嫩木材
腐朽木材

管口表面



子实体

3—5 μm ，可

硫黄菌 (CHICKEN-OF-THE-WOODS)

子实体闪闪发光，呈覆瓦状排列。

生长迅速，厚厚的肉质菌盖呈

肉浅黄色，易碎，老

后来可变成老鼠

气味，选择性可

食，需彻底煮透；

但仍有人对这种真

菌过敏。

• 生长分布：在早

此地区可生于阔叶

树上，而在另一些地

区则生于针叶树上；多见于心材部位

分布并常见于北温带

● 菌管明环带

剖面

● 菌管厚约5mm，
在黄斑处子实体上



子实体层层叠叠，多高悬于
树上

灰树花 (HEN-OF-THE-WOODS)

1 年生。每支辐射形分枝托架由一中心菌柄分生而出。革质。波浪形边缘，上表面灰色，老熟后变褐色。

菌盖，厚5mm，米白。

食。但作为一种稀有菌类，最好别吃。

• 生长分布：生于桦树、甜栗树，形成白色腐块。分布于北温带，但只有少数地区有见。

• 相似种：口多孔菌

子实体呈辐射状，生于树干基部，直径50cm。

无刺人害菌。

长而老熟，后有孢子。



子实体呈辐射状，生于树干基部，每个分枝菌盖由一个厚实的中心菌柄分生。

茈氏灵芝 (COPPERY JACQUER BRACKET)

菌盖呈蜡质起保护作用。菌肉褐色、木质，有树脂气味。

• 生长分布

包点树木生长，分布广泛，但只是欧洲中部、南部有见。



子实体生在树干附近，层叠状。

平盖灵芝 (ARTIST'S FUNGUS)

该种半圆形多年生真菌的菌盖上表面有同心状

“艺术品”，所以又被称为“艺术家的真菌”。菌盖云褐色，深0.5—4cm。菌肉薄、深褐色，常有白色菌丝填充，味苦，有磨菇味。

· 生长环境

广泛分布并常见于北温带。

· 相似种：南方灵芝 (*G. australe*)，分布区域偏南，菌盖颜色浓艳，上表层较厚，菌肉灰色。





平盖灵芝 *G. applanatum*



火木层孔菌 (GREY FIRE BRACKET)

灰黑色的多年生层叠状真菌，菌盖蹄形。

+ 厚边。子实体以  为主。

 菌管锈褐色； 在老菌管上堆积而发

生，称“刚毛”，是本

科真菌的特征，多

隐藏于子实层中。

因存在多种类型，

专家们对这种真

菌的分类尚有不

同意见。


• 生长分布：寄生于

多种阔叶树，常见的


有桦树、榆树、苹果树；

可引起树木白腐病，广泛

分布于北温带，相当常见。



● 类似如牛增
少而，并环增



菌口表面



子实体中
子香树

木蹄层孔菌 (TINDER FUNGUS)

多年生多孔菌。子实体马蹄形，木质，表面有环带，多层色带，老熟区域深褐色，边缘浅褐色，多绒毛或呈状。新菌管层年年生长。一年生新生菌管层厚达5mm。管口面灰色至灰褐色。根据寄主树的不同，木蹄层孔菌有好几种类型。


• 生长分布：寄生于阔叶树上，尤其是由毛桦树和桦树，危害树木。广泛分布并常见于北温带。

• 科：孔菌科



木蹄层孔菌

木蹄层孔菌



木蹄层孔菌

栗褐暗孔菌 (PINE DYE POLYPORE)

年生层叠状真菌；生于很短的褐色菌柄，生长迅速。未成熟子实体有鲜艳硫黄色，绕向心形锈褐色环带。老熟后，子实

1可深达1cm，管口直径1—4mm，未成熟时呈绿黄色，触碰刮擦可变深褐色。不可食，菌肉纤维质，黄色至褐色，含色素，可当染料。

·生长分布：生于松树周围，可引发松树根腐病。除广泛分布并常见于北温带外，世界各地均有生长。

老熟时



管口表面



子实体生于地下树根，多单生

科 目

种

生长季节

粗毛针孔菌 (SHAGGY POLYPORE)


粗毛针孔菌菌肉厚、扇形，一年生，因其表面毛发蓬松粗糙而得名。未成熟子实体火红色，成熟后色变深，有闪光。管口 2—3 个/mm。浅褐色的菌管层深 1—3cm。子实层内有散乱、短、厚的毛发（刚毛）。

• 生长分布：寄生于桦树、桃、苹果、胡桃等阔叶树上，引发白腐病。分布广见于北温带。

• 相似种：稀针孔菌 (*I. cunicularis*)

子实体较小

栎树。杨纤孔菌 (*I. rhodes*) 子实体也较小，生于白杨树上。



子实体，生长于阔叶树上。



科 目

种

生长季节

辐射状纤孔菌 (ALDER BRACKET)

辐射状纤孔菌菌肉厚、扇形，一年生，因其表面有辐射状沟纹而得名。未成熟子实体火红色，成熟后色变深，有闪光。管口 2—3 个/mm。浅褐色的菌管层深 1—3cm。子实层内有散乱、短、厚的毛发（刚毛）。

• 生长分布：寄生于桦树、桃、苹果、胡桃等阔叶树上，引发白腐病。分布广见于北温带。

• 相似种：稀针孔菌 (*I. cunicularis*)

不太明显，生于



幼体



未成熟子实体菌盖表面有黄色

菌管口，管口



子实体，寄生于阔叶树上，覆瓦状

尺寸

名字


图例

松根异担子 (CONFER BASE POLYPORE)

平、质地如软木塞，、
 缘白色，多有橙色壤边。菌管层白色至奶油色。
 条可达1cm以上，不可食，菌肉变黄色。

• 生长分布：生于针叶树桩，少见干阔叶树；多在松树林大量生，造成根腐。

• 树生长。广泛分布并常见于北温带。



+ 2 8 1



剖面


+ 2 8 1

香粘褶菌 (SCENTED BRACKET)

多年生树桩型真菌。轻度粘绒状。边缘金黄色至棕色；老熟部位几乎黑色。金黄色管口1—2个/mm，菌管层厚达1cm。菌肉质似软木塞，锈褐色。有尚香橙子香。

• 生长分布：生于针叶树上，通常为引起树木褐腐病。分布于北温带。

• 相似种：分布广泛并常见的有：针叶褐褶菌 (*G. abietinum*)，阔边粘褶菌 (*G. sepiarium*) 有粘绒状管口，一般生在向阳的针叶树上。



子实体多是单生或群生出现于树桩上



管口表面



偏肿栓菌 (BEECH BRACKET)

子实体呈壳状，半圆形，厚1-2mm，边缘略隆起，中央略凹，表面光滑，浅灰色至灰褐色，有细密的同心环纹，有时有放射状细纹。管口近圆形，排列紧密，深灰色。木材腐朽，呈海绵状。生于阔叶树桩上。

管口表面

• 生长分布：生于林地，以在山毛榉树上形成白色腐斑为特征。广泛分布并相当常见于北温带地区。

• 相似种：毛栓菌 (*T. hirsuta*, 见第224页) 子实

体较厚，多呈

管口不拉

长，深

灰色

剖面

管口1-2^个/mm

子实体单生或层叠发生于阔叶树桩上

科 担子菌

种 *Trametes hirsuta*

子实体

毛栓菌 (Hairy Bracket)

白色管口层厚1—4mm，白色菌肉硬而粗糙

• 生长分布

林的开阔处；会引发阔叶树白腐病区域性发生

• 相似种：绒毛栓菌 (*T. pubescens*) 管口黄色 单色下
反黑菌 (*Cerrena unicolor*) 管口形状更不规则，菌管厚
薄不一，有黑斑



子实体生长于阔叶树侧木上
层叠排列



子实体表面

白腐笔 (MANY ZONED BRACKET)

形，菌管层厚3mm，白色，干燥后变浅黄色，管口3—4个/mm

菌肉硬而，白色 子实体细小，其环带的灰色和深
蓝灰色特征越明显


• 生长分布：生于林地、公园和花园的阔叶树上；造
成林木白腐病。广泛分布并十分常见于整个北温带地区

• 相似种：浅黄褐栓菌 (*T. ochracea*) 生于远北地区，
子实体较厚，较深褐色，管口较大

管口表面

• 幼菌
孔状孔

• 老菌
子实体边缘



子实体



子实体层叠排列
• 幼生、厚皮状

烟色管孔菌 (SMOKY POLYPORE)

年生真菌，生长环境适宜时可大，
 1—4cm，表面有向心形灰褐色
 皮痕形，髓部
 厚达2mm，管口突出
 从侧面看，米白色菌肉和菌管
 间有一灰色薄层，烟色管孔菌气味
 强烈，散发“菌香”



• 生长分布：奇生或潮生

毛桦树：造成白腐病
 广泛分布并常见于北方

• 相似种：亚甲管孔菌
 (*B. fumosa*)

木屑上，较少见
 较大，管口色较深

尺寸 子实体 3—7cm × 1—5cm 厚 0.5—8mm



管口表面




子实体

朱红宝孔菌 (CINNABAR BRACKET)

年生真菌，子实体肉质均匀的
 艳朱红色使得识别较为容易，子实
 体半圆形至扇形，上表面有如丝绒
 平滑，细薄，菌管壁厚4—6mm
 肉上榨后变成软木

• 生长分布：生于温暖向阳地势中
 的阔叶树死木上；引发树木白腐病
 分布于北方等，局部地区有

• 相似种：血，*P. sanguineus*
 子实体较薄，生于相似生长环境，但多
 出现于温暖气候



管口表面

血或



子实体



尺寸

子

子实体

裂拟述孔菌 (THIN MAZEGILL)

一年生覆瓦式多孔菌。子实体宽扇形，薄，仅附着面附近稍厚，表面光滑至有疣突起，浅灰色至黄色，老熟后通体变青红褐色，或仅是同心环带区变色。有肉如软木，不可食，浅木褐色；未成熟管口浅灰色，发生触碰或刮擦变红。有管壁厚0.5—1cm，红褐色。

• 生长分布：在部分地区可生于多种阔叶树，但在另一些地区仅多见于柳树；引发白腐病。广泛分布，常见于北温带。

• 幼时
• 幼时
• 幼时

• 幼时
• 幼时

• 幼时
• 幼时

桦褶孔菌 (GILL POLYPORE)

所独有的特征。菌肉硬质犹如软木，白色，不可食。

• 生长分布：主要生长于阔叶树上，有时也可见于针叶树；引发树木白腐病。分布于北温带，局部地区常见。

• 相似种：偏肿栓菌管口圆形并稍显拉伸。

• 幼时
• 幼时
• 幼时

• 幼时

• 幼时

子实体单生或簇生

陳子修

或平滑的子实体表面。本节将介绍这一类

和 神 / P. 13. 第 1 卷

胶质脉射菌 (JELLY BRACKET)

好，尽管部分产孢层下行至树皮，但通常都

• 生长分布：生于桦树、山毛榉树类的阔叶
栎树桩上；针叶树上少见。广泛分布并常见
于北温带。

·相似种 十 假 菌 类 担 子 菌 亚 门 担 子 菌 纲 担 子 菌 目 担 子 菌 科 担 子 菌 属 (*P. radiata*)。亮橙色。子实体较薄，完全倒伏。底部也有射线式脉纹和皱折。



平车体 3 吨以上, 5 吨以下

疣革菌 (COMMON EARTH-FAN)

外形上——类似——生长在——
完全被泥土色伪装隐蔽而难以被发现——
上表面多纤维、凹凸不平；下层的产孢
——状突起，色泽较淡。菌肉薄，褐色，
不可食。

• 生长分布：和酸性土的林地、荒地的
树木形成菌根，或生于腐木树桩；
常发现于路旁中间或针叶树植物
下面。广泛分布并常见于北
半球。

• 相似种：有竹革菌
(*T. caryophylllea*) 子
实体深漏斗形，表面
丝绒状不是很明显。



■ 上表面凹凸不平，纤维

• 颜色，黄褐色

子实体是多层叠发生

干朽菌 (DRY-ROT FUNGUS)

• 特征——
质结构。子实体半圆形，有脉纹，倒伏式，褐色，
有弹性，质地如胶。还可产生大量白色菌丝体。
• 生长分布：在通风不畅的房屋
的墙面灰浆等碱性基质可中和真
菌酸液，有利生长。分布并常见
于房屋建筑。

子实体多
是倒伏生长



子实体——
是半圆

科 牛 舌 菌 科


| 种 *Auricularia merenterica*

生长季节 全年

毡盖木耳 (TRIPE FUNGUS)

这种形如内脏的一年生真菌，易被误认为
栓菌属 (*Trametes*, 见第224页) 或团扇菌属
(*Stereum*, 见第225页)。但是这种真菌除有
链胶状菌肉外，其顶面表面环带有精细或毛糙品
纹。上层的产孢层起皱，有脉纹。虽可食，但无
任何食用价值。

• 生长分布：仅生于林地、公园或牧场等
阔叶树的朽木上；在榆树死
木上可大量发生，也
和其他朽木真菌
同生长。分布于
北温带。仅相
邻地区有见；
北方和热带地
区稀缺或无。



尺寸 子实体 4-15cm × 1-5cm 厚 2-5mm

科 牛舌菌科


| 种 *Stereum hirsutum*

+ 世界分布

毛刺革菌 (Hairy Leather Bracket)

子实体寿命期长，扇形，鲜黄至棕褐色，子实体
表面平滑，倒伏生长。子实体上表层多毛，有不明
显的向心性环带；边缘色泽较浅。菌肉色泽相似
而硬，不变色，孢子淀粉状。

• 生长分布：生于阔叶树上，特别是桦树
、橡树、山毛榉树；常长在树皮上或是和
木的朽布上，广泛分布于北温带，常见。
• 相似种：烟色血刺革菌 (*S. gausapatum*)
和皱纹刺革菌 (*S. rugosum*, 见第232页)
更为倒伏，变红色，绒毛刺革菌 (见
在插图)



子实体



绒毛刺革菌

尺寸 子实体 2-5cm × 3cm 厚 1-2mm

环境

可食用：否

科

种

生长季节

银叶菌 (PURPLE LEATHER-BRACKET)

这种革菌较容易识别：未成熟子实体紫色，且有多层波浪形边缘，上表层白褐色；下层平滑，紫褐色。干燥时一般呈角状，质肉似蜡，有点儿凝胶状。和同革菌属种类不同的是，与碘反应，孢子不变蓝色。

• 生长分布：寄生或腐生于许多阔叶树上；引起樱桃树、李子树银叶病，是茂林木白腐病。广泛分布于北温带，多数地区常见。



• 坚韧的革片

子实体边缘 40x

科

种

生长季节

褐壳刺革菌 (RGD LEATHER BRACKET)


为装良好的硬质多年生耳状真菌，波形，多层叠排列，上层呈向心性褐色环带，下层平滑，如用高倍放大镜仔细察看，可见同心环带。

• 生长分布：生于桦树或甜栗树树桩或倒木。分布于北温带。



• 下表层呈细硬小毛

子实体上层
褐色，余部
呈黄褐色



子实体柄部层叠

尺寸 子头径 6cm × 1-4cm 厚 1mm

孢子

显微图

子实体皮壳或壳状

木

科 皱褶革菌


种 *Stictium rugosum*

生长季节 全年

皱褶皱革菌 (COMMON LEATHER-BRACKET)

一种多见的林地真菌，可持续生长好几季，形成一种厚而扁平却无特征可言的浅灰色皮壳状物剥除树皮，难得支起。这种真菌表面刮擦下的碎屑很快就会产生血红色标记。孢子蓝粉屑。

- 生长分布：发生于阔叶树 | 见于松树、桦树、枞木的直立死木 | 广泛分布并常见于欧洲
- 相似种：血红皱革菌 (*S. sanguinolentum*) 受损也可变红色，但生于针叶树 | 剥除树皮，子实体明显支起



子实体

假多孔菌 (DECEIVING POLYPORE)

子实体扁平，但在表面可形成许多垂直细小瓶孔式结构。坚硬，白色至

- 假多孔子
- 白多子



子实体皮壳状。

- 生长分布：林地阔叶树上，特别是山毛榉树 | 广泛分布并常见于北温带；世界其他地区也有分布

粉孢革菌 (CELLAR FUNGUS)

这种质地松软的真菌子实体潮湿腐烂，四处延伸，铺陈于基质，决不直立形成层叠状。成熟孢子：中心变黄至橄榄褐色，边缘白色并有细毛。子实体表面的典型特征是老熟后变得起皱多疣。和多数倒伏状真菌不同的是，粉孢革菌是牢牢地固着于基质，需用刀缓慢剥离。

• 生长分布：可生于任何潮湿的木质材料，使木材明显、发生褐斑、腐烂。北温带地区的田野或建筑物都有分布。

• 相似种：干朽菌可渗出水滴，子实体可直立成层叠。



子实体紧贴基物



尺寸 子实体长5—100cm × 2—20cm厚0.5—1mm

厚垣孢褐腐干酪 (POWDER PUFF POLYPORUS)

和月有两个生长阶段而十分容易区分的多孔真菌。这两个阶段几乎同时发生。

基顷，呈壳状时为有性阶段，子实体边缘白色，中心奶油白色，管口2—3个/mm。管口老熟后脱落，释

• 特征
• 孢子堆

孢子。膨大呈球形如“马勃”，以爆裂的方式释放出大量粉末状褐色孢子。

• 生长分布：以小碎片的形式发生于针叶树倒木和树桩上；使木材发生褐色腐斑。在北温带分布广泛，局部分布不一，但常被忽视。

• 特征
• 孢子堆
• 孢子




子实体

通常可多群聚合生长

有刺齿真菌

本章介绍的真菌并非全是近缘种类
其共同特征是孢子形成细胞（担子）都位于齿状
或刺状表面。菌刺位于子实体菌盖下，
或附着于珊瑚菌分枝。有些扁平倒伏的真菌
则是全部表面呈显刺状突起。




科 种 生长季节

耳匙菌 (EAR PICK-FUNGUS)

耳匙菌是一种十分普通常见的真菌，因其褐色，使得这种真菌很难被发现。菌肉可食，不可食。

• 生长分布：主要生于成熟针叶林地或林场里的腐朽松木，其次也见于云杉球果等针叶树残骸。广泛分布于北温带的松树林和云杉林。



子实体单生或成双出现

科 种 分布

胶质刺银耳 (TOOTHED JELLY)

一种凝胶状果冻似的真菌，色泽多变：从近白色至深灰褐色全有；菌盖呈近半圆形，表面稍粗糙或


是侧生。菌柄短，无食用价值。

· 生长分布：多见于天然针叶树林地和林场，阔叶树林地少见。分布于北温带。



子实体
侧生

幼时似十
字形，一食



子实体多层几朵聚集 小群生



侧生

尺寸 菌盖 5—10cm | 菌柄 2—6cm 1—3cm 分布 北温带

红色烟白齿菌 (BLUSHING FENUGREEK-TOOTH)

一朵朵单独都像从地下硬挤出来而

色，比较松软的菌肉老熟后变浅

粉色

· 生长分布：和生长于干燥林地的松树形成菌核




上部附成多块状

侧生



子实体单生或小丛生干沙质地



尺寸

可食性

尺寸 菌盖 5—10cm | 菌柄 2—6cm 1—3cm

科 烟白菌属

种 *Phellodon niger*


生长季节

黑栓齿菌 (BLACK TOOTH)

菌盖中心凹陷，浅灰至紫黑色；未成熟子实体边缘的浅蓝色十分明显。菌盖下的菌褶初呈蓝灰色，渐变灰色。革质的黑色菌肉有股葫芦巴气味，特别是在干燥时。

• 生长分布：和碱性土壤林地或田野的针叶树形成菌根。有时在阔叶林下生长。分布于北温带，但只局部地区有见。

• 相似种：白栓齿菌 (*P. melaleucus*) 的气味相似，但子实体更薄，色泽较淡，菌毛不多；多发生于生长在瘦酸性土壤上的树木上。亚肉菌属 (*Hydnellum*) 的真菌孢子褐色。



子实体生 群生中，单生

尺寸 生长季节

反薄栓齿菌 (FUNNEL TOOTH)

菌盖中心凹陷，表面有褐色环带，底层是垂直菌刺。菌柄纤维质，深褐色，木质化。菌肉粗糙，薄，褐色，有粘合一处。

• 生长分布：和沙质土壤林地的针叶树形成菌根，少见在阔叶树下。分布于北温带，但仅是局部地区有见。

• 相似种：包括有褐色孢子的亚肉菌属的，系列有肉菌看来十分相似。联纹栓齿菌 (*P. confluent*) 菌盖表面多皱，少色环，色泽更淡，菌盖心状更不规则。



• 菌盖中心
• 菌盖边缘

菌柄纤维质



子实体生 群生

尺寸 生长季节

科 烟白齿菌

种 *Hydnellum peckii*

皮氏亚齿菌 (BILE TOOTH)

子实体：木栓质，有弹性，常呈“T”形，菌盖红色液体面色泽加深，很快变褐色，显深红色

菌柄：木质，有弹性，基部有深红色液体

• 生长分布：和生长于林地、田野

白木树、红杉、冷杉、云杉、松、杉、柏、等种植松树形成菌根。广泛分布于北温带，但只是局部地区有见。

• 相似种：锈肉菌 (*H. ferrugineum*) 口味清淡其他种类不渗出红色液体



尺寸 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

孢子

可食性

科

种

子实体

鳞盖肉齿菌 (BLUE-FOOTED SCALY-TOOTH)

子实体：木栓质，有弹性，常呈“T”形，菌盖深褐色，菌柄深褐色，基部呈铜蓝色，浅色调有可地低劣，粉粉气味。多数肉肉

呈脆脆味苦，但用盐腌制后可食用；这一类真菌极稀少，不主张食用

• 生长分布：与针叶树和阔叶树均可形成菌根，广泛分布于北

温带、亚热带、热带、寒带、高山、森林、田野、

几个种即将灭绝

• 相似种：蓝肉肉菌 (*S. glaucopus*) 菌盖较光滑，菌柄基部蓝色。和鳞盖肉菌的菌柄褐色



尺寸 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

孢子

可食性

黄卷须齿菌 (COMMON HEDGEHOG FUNGUS)

这种肉质齿菌菌柄厚重，轻度侧生；菌盖大，

菌盖表面平滑或有少许细纹，底面则是
易碎菌刺。色泽淡奶油色至赭色，整个子
实体老熟后或受潮变橙色。选择性可食，
肉质老熟后变得味苦，食用应彻底煮透。

• 生长分布：在林地里的阔叶树和针叶树均可形成系
根。广泛分布于包括寒冷地区在内的全部北温带地区。

• 相似种：白齿菌 (*H. albidum*) 菌盖白色，孢子较小，
生于碱性地。近缘种红齿菌 (*H. rufescens*) 较小，橙色。


● 黄卷须齿菌子实体
孢子印：白色

● 菌盖中心小孔

● 菌盖中心小孔

● 孢子印

子实体



△ 脐齿菌 (*H. umbilicatum*)

像齿菌相像，但较小，肉较厚，芦
型的橙色，菌盖中心有小孔或小
腔。分布于北美。|O|

尺寸 菌盖 5—15cm | 菌柄 3—7cm × 1—3cm

孢子 白色

可食性 |O|

科 牛肝菌科

种 珊瑚猴头菌

生长季节 夏、秋

珊瑚状猴头菌

(CORAL TOOTH-FUNGUS)

在倒木丛中发现珊瑚状猴头菌时，这种由无数易碎珊瑚状

子实体组成的菌体，

很可能已经菌枝残缺，

而且全非。子实体下

层有浓密的长而悬垂

的刺。菌肉米白色，

至奶油色。萝卜味。

虽然这是一种可食用菌，但因

为稀缺，不主张食用。

·生长分布：生于山毛榉、桦

木上。分布于北温带地

区，局部地区常见。



多分枝的珊瑚
状子实体

子实体在倒木上生长或新生

尺寸 子实体直径 10—20cm 高度 可达 10cm

科 牛肝菌科 种 卷须冠生刺菌 生长季节 夏、秋

卷须冠生刺菌 (LAYERED TOOTH-FUNGUS)

子实体由无数易碎的珊瑚状子实体组成，

子实体下层有浓密的长而悬垂的刺。

菌肉米白色，至奶油色。萝卜味。

虽然这是一种可食用菌，但因

为稀缺，不主张食用。

·生长分布：生于山毛榉、桦木上。

分布于北温带地区，局部地区常见。

·相似种：珊瑚猴头菌 (Coral Tooth-Fungus)

子实体由无数易碎的珊瑚状子实体组成，

子实体下层有浓密的长而悬垂的刺。

菌肉米白色，至奶油色。萝卜味。

虽然这是一种可食用菌，但因

为稀缺，不主张食用。

·生长分布：生于山毛榉、桦木上。


分布于北温带地区，局部地区常见。

·相似种：珊瑚猴头菌 (Coral Tooth-Fungus)

子实体由无数易碎的珊瑚状子实体组成，

子实体下层有浓密的长而悬垂的刺。

菌肉米白色，至奶油色。萝卜味。



子实体在倒木上生长或新生

尺寸 子实体直径 10—20cm 高度 可达 10cm

可食性 可

棒型真菌

本章介绍的真菌外形如棒。其最重要特征是有性孢子覆盖全部子实体表面。基部或许是不孕部。瓶形菌（见第245页）子实体表面的产孢面（子实层）则嵌入肉质棒形结构（子座）。



生出或多毛

以 有纤细的核菌属（*Typhula*），也有厚头薄脚 合而为

微其拟珊瑚菌（YELLOW SPINDLES）

生长于在 分布于包括东南亚在内的温暖地区；欧洲常见
相似种：梭形黄拟珊瑚菌（*C. fusiformis*）大棒形，假足浓密丛生。橙色拟珊瑚菌（*C. laeticolor*）
（*C. lateralis*）是杏黄色，气味难闻



子实体单生或小的群生



子实体略呈棒形

子座 茶平层

子 孢子 白色

棒瑚菌 (GIANT CLUB)

色，当孢子成熟散落于实体表面而老熟后变为棕褐色。如遇刮擦损坏变红褐色，白色菌肉初起坚硬，老熟后变松软多孔，气味好闻，但带点儿苦味。

• 生长分布：多见于林地的山毛榉树下，分布于北温带部分区域；在环境适合的阔叶地区常见。

• 相似种：小林瑚菌 (*C. ligula*)、粉囊棒瑚菌 (*C. sachalinensis*) 子实体较小，呈近棒形。二者都生于针叶林。棒形珊瑚菌 (*C. truncatus*) 顶端如




子实体生长于温带森林地的落叶残存堆上，群生

管棍菌 (PIPE CLUB)


茎上的叶柄，让人毫不在意。其外形细小、扭曲，较难识别。

• 生长分布：生于林地潮湿落叶残存的阔叶树埋木上；特别是山毛榉树林中，分布于北温带某些地区和亚北极地区；欧洲常见。

• 相似种：管棍菌 (*C. juncea*) 的子实体更为幼细，常见于



子实体生于枯木腐枝，单生



尺寸 子实体 $\updownarrow$ 5—20cm $\leftrightarrow$ 2—8mm


| 孢子 白色

| 可食性 不可食

红柄核瑚菌 (RED-STEMMED TUBER-CLUB)

红柄核瑚菌 (RED-STEMMED TUBER-CLUB) 是一种寄生在植物茎上的真菌。其子实体为球形，常成簇生长。颜色为深褐色至黑色。核瑚菌属真菌子实体极小，常被忽视。大多生长存秋季，从越冬小苗枝上长出。不同种类的真菌，其子实体的大小、形状、颜色等特征各异。红柄核瑚菌是某些植物的重要病害。

• 生长分布：多生于潮湿林地的岑树、枫、槭木的落叶主叶脉和叶柄上。广泛分布于北美带；欧洲常见。



茎秆外边缘
处，呈白色
从侧边观察，
呈扁平状。


假地毡菌 (SCALY EARTH-TONGUE)

假地毡菌 (SCALY EARTH-TONGUE) 是一种寄生在植物茎上的真菌。其子实体为球形，常成簇生长。颜色为深褐色至黑色。假地毡菌的生长。广泛分布并相当常见于全部欧洲和北美东部的一种真菌。

• 相似种：对相似种毛毡菌 (*Trichoglossum*) 的识别可通过观察菌体表面是否有嵌入或穿透菌体的直立硬毛来进行。



子实体
丛中，小群生



毛毡菌
(*Trichoglossum hirsutum*)
黑色子实体形似微球
体，表面密生
子囊；菌柄干性。

菌柄

阔骨锤菇菌 (JELLY BABIES)

绿色 不过,即使正常子实体在完全成熟后也有往往变为橄榄绿色


• 生长分布: 多见于潮湿林地的落叶残存和苔藓地上。分布并常见于北温带大部分地区; 世界其他地区也有生长



子实体往往成群生长

注: 本属包含
• 平脊侧多毛

• 平脊侧多毛
• 平脊侧多毛



• 平脊侧多毛
• 平脊侧多毛

• 平脊侧多毛
• 平脊侧多毛

侧面

可食用性

地灯菌 (BOG BEACON)

• 灯: 其子实体分化成橙色头部和圆柱形白色柄

• 子实层: 柄部无性。

生长分布

多见于北温带地区的北部地区和高海拔地区

• 相似种: 锤菇菌科的一些菌种生于较干燥地区。肖棚菇 (*Hevelia*) 种类子实体较小。多生于针叶树残渣 黄地勾菌 (*Spathularia flavida*)

周裂。




子实体小群或大群生

• 平脊侧多毛



• 平脊侧多毛

• 平脊侧多毛



可食用性

表面多突起或粉末状

本目下的真菌，其子实体多呈棒状，且表面多具突起或粉末状。此类真菌多寄生于昆虫幼虫或蛹上，其子实体多呈棒状，且表面多具突起或粉末状。此类真菌多寄生于昆虫幼虫或蛹上，其子实体多呈棒状，且表面多具突起或粉末状。

科 是柄菌 | 种 *Cordyceps militaris* | 生长季节 夏 秋

蛹虫草 (ORANGE CATERPILLAR-FUNGUS)

虫生真菌，瓶形，以称为“子座”的橙红色棒形复合子实体的形式从寄主体内长出。瓶内有产生孢子的子囊，如长钉刺状。棒形子座顶端，略显膨大。孢子长圆柱形，破裂成片，柄部平滑，色泽较浅。

- 生长分布：菌丝体侵入林地或草地虫蛹，使其感染致死，然后长出橙红色棒形子座，分布于北温带。
- 相似种：双梭孢虫草 (*C. bifusispora*) 同样寄生于虫蛹，色泽较黄，孢子呈尖头棒状。



尺寸 子座 2—5cm ↔ 2—5mm | 孢子 白色 | 可食性 可食

科 是柄菌 | 种 *Cordyceps militaris* | 生长季节 夏 秋

粉质拟青霉 (COTTON CATERPILLAR FUNGUS)

这种真菌侵入鳞翅目昆虫幼虫和蛹后消耗寄主，长出直立的橙色子座；但其黄色却可被散发。绒毛似白色无性孢子。

- 生长分布：生于开阔林地或草地的地下昆虫幼虫或蛹上。分布并常见于北温带。
- 相似种：蛹虫草表面多突起



尺寸 子座 2—5cm ↔ 2—5mm | 孢子 白色 | 可食性 可食

科 牛肝菌科

种

生长季节 夏—冬

大团囊虫草 (SLENDER TRUFFLE-CLUB)

这种瓶形真菌以黄色菌丝体与寄主的地下实体相连形成子座，棒形子座的顶端呈橄榄褐色至黑色；表面因产生孢子的瓶形子囊果埋生于黄褐色菌丝而变粗糙。

· 生长分布：寄生于针叶林和阔叶林地的粗粒大团囊菌 (*Elaphomyces*) 上。分布于北温带。局部地区常见。

· 相似种：球头虫草 (*C. capitata*) 和长段虫草 (*C. longisegmentatis*) 均为菌生，顶端，也可生于大团囊虫草等上。



菌丝体

子实体单生或簇生于地下块菌

尺寸 1-2cm

孢子

孢子

孢子

科 牛肝菌科

种 *Xylaria polymorpha*

生长季节 夏—冬

多型炭角菌 (DEAD MAN'S FINGERS)

这种瓶形菌还有一个令人毛骨悚然的名字：

死人指。具棒形复合子实体，即子座，复合子实体却有厚实的白色菌肉，内外黑白分明。

子座短柄圆柱形、圆头，子座里埋生

了从子囊壳顶端小孔喷发而出

· 生长分布：常生于地面的树桩腐根上，特别是山毛榉树和榆树多见，桦树、酸橙树桩腐根也有生长。广泛分布于北温带，相当常见。延伸

· 相似种：多型炭角菌 (*Xylaria polymorpha*) 和长段炭角菌 (*X. longisegmentatis*) 均为菌生，顶端，也可生于大团囊虫草等上。

· 相似种：多型炭角菌 (*Xylaria polymorpha*) 和长段炭角菌 (*X. longisegmentatis*) 均为菌生，顶端，也可生于大团囊虫草等上。

· 相似种：多型炭角菌 (*Xylaria polymorpha*) 和长段炭角菌 (*X. longisegmentatis*) 均为菌生，顶端，也可生于大团囊虫草等上。

· 相似种：多型炭角菌 (*Xylaria polymorpha*) 和长段炭角菌 (*X. longisegmentatis*) 均为菌生，顶端，也可生于大团囊虫草等上。

· 相似种：多型炭角菌 (*Xylaria polymorpha*) 和长段炭角菌 (*X. longisegmentatis*) 均为菌生，顶端，也可生于大团囊虫草等上。

· 相似种：多型炭角菌 (*Xylaria polymorpha*) 和长段炭角菌 (*X. longisegmentatis*) 均为菌生，顶端，也可生于大团囊虫草等上。

· 相似种：多型炭角菌 (*Xylaria polymorpha*) 和长段炭角菌 (*X. longisegmentatis*) 均为菌生，顶端，也可生于大团囊虫草等上。

· 相似种：多型炭角菌 (*Xylaria polymorpha*) 和长段炭角菌 (*X. longisegmentatis*) 均为菌生，顶端，也可生于大团囊虫草等上。

· 相似种：多型炭角菌 (*Xylaria polymorpha*) 和长段炭角菌 (*X. longisegmentatis*) 均为菌生，顶端，也可生于大团囊虫草等上。



菌丝体



菌丝体



子实体

尺寸 1-2cm

孢子

孢子

孢子

孢子

科 鬼笔

种 *Phallus impudicus*

生长季节

白鬼笔 (COMMON STINKHORN)

白鬼笔的菌柄粗壮，呈圆柱形，基部有根状菌索。菌柄上部有黏液，呈白色，有臭味。菌柄下部有根状菌索，呈白色，有臭味。菌柄上部有黏液，呈白色，有臭味。菌柄下部有根状菌索，呈白色，有臭味。

被破裂，菌柄伸出。可见菌柄部分可食，并可与“卵”脱离

• 生长分布：生于阔叶树和针叶树林地和沙丘地。广泛分布并常见于北温带

• 相似种：粉托鬼笔 (*P. hadriani*) 包被呈淡紫色，多生于沙丘地。其他种类，如包网鬼笔，有一裙状菌网从基部呈环状

剖面

◆ 菌柄上部有黏液，呈白色，有臭味。菌柄下部有根状菌索，呈白色，有臭味。



△包网鬼笔 (*P. duplicatus*)
子实体精致漂亮，粉嫩褶皱



子实体上生有根状菌索

角形、珊瑚形真菌

本章介绍的真菌是棒形真菌的细分。

有些种类仅有几个分枝，而有些结构则非常复杂。
绝大多数的角形、珊瑚形真菌分枝被孢子形成组织所
覆盖。不过，锈球菌（*Sphaeria*，见第252页）是
担子菌，而鹿角炭角菌（*Xylaria*）却是子囊菌。



科 炭角菌

种 *Xylaria hypoxylon*

生长季节 全年

鹿角炭角菌 (CANDLE SNUFF FUNGUS)

未成熟子座即复合了实体十分特别。生在阔叶树桩上的鹿角状分枝内分生孢子散落呈粉状，特别惹人注目。子座外层有细胞形子囊果，性孢子发育其中；晚秋季节，这些孢子

种类有灰白色

- 生长分布：生于阔叶树，特别在公园、林地的树桩上多见。广泛分布并常见于北温带地区。
- 相似种：典型的蜜炭角菌（*X. mellissa*）成熟时分枝更多，或子座更光滑；生长于温带和亚热带地区。



无性阶段

有性阶段

子实体小群生，呈簇

尺寸

孢子

可食性 [1-1]

科 珊瑚菌科 种 生长季节

角拟珊瑚菌 (MEADOW CORAL-FUNGUS)

子实体由许多分枝组成，分枝顶端钝圆，有时稍尖，分枝间常互相粘合，形成块状或团状。子实体颜色多为金黄色、黄褐色或暗褐色，有时带绿色。子实体生长在潮湿的草地、林缘或林下。子实体在干燥后会变硬，不易折断。


生长分布

• 相似种：克罗奇拟珊瑚菌 (*Ramariopsis crocea*) 的角形分枝顶端较尖锐，色泽金黄，对硫酸接触无反应；多见于林地



子实体中生成小菌生

子实体



子实体
子实体
子实体

子实体

子实体

子实体
子实体

科 珊瑚菌科 种 生长季节 夏—初秋


冠珊瑚菌 (CRESTED CORAL FUNGUS)

人，但由于大分枝顶端有显著丛生密生的细尖小枝，且常粘合一起，还是容易识别。典型冠珊瑚菌是白色和灰色，但因中间色型尚多，难于明确区别。肉质白色，相当脆弱。珊瑚菌科种类为数不多，担子相对较大，弯曲明显的角形担子小枝通常仅生两个孢子。

• 生长分布：生于林地与林、路边的潮湿环境。广泛分布并常见于北温带。

• 相似种：皱珊瑚菌 (*C. rugosa*) 一般比较高，起皱，分枝较少。白珊瑚菌 (*Ramariopsis kunzei*) 分枝顶端光滑无分枝。

子实体
子实体
子实体



子实体

尺↑ ↑ 子 子 子

葡萄酒色顶枝珊瑚 (PINK-TIPPED CORAL FUNGUS)

肉质真菌的识别 菌柄底部厚、短
白色，有好闻的水果香气；

不主张食用

• 生长分布：多见

于天然针叶林和

阔叶林地。广泛

分布于北温带和

温带地区；局部

地区相当少见

• 相似种：粉红枝

珊瑚呈鲜亮的粉色，无

菌柄

不少于20种。



△淡红丛枝珊瑚 (*R. auricollaris*)

味鲜美，其分枝厚而

密分枝表面常新

旧或破面出现红斑

分枝较密，如新

子实体以分枝

向地面延伸的
分枝更密

分枝
较密

密枝珊瑚 (STRAIGHT CORAL FUNGUS)

子实体分枝多在基部集，直立、高度大于宽度。
但大小、形态却有较大差异。分枝呈
橙黄色。

黄色。相当结实、味苦的菌肉

不主张食用

• 生长分布

阔叶林下，多见于山毛榉、橡

木林上也有生长。分布于

北温带地区，十分常见。

• 相似种：细枝珊瑚 (*R.*

gracilis) 色泽较淡，有明显香料气；

多见于针叶林边缘

多生于
阔叶林


• 粉嫩红珊瑚

分枝较密，如新

绣球菌 (CAULIFLOWER FUNGUS)

这种真菌让人过目难忘：多重瓣片构成的花球形子实体菌柄短似根，奶油色至浅黄褐色，多肉，瓣片分枝，扁平似带，相当结实。跟这个小科的所有成员一样，绣球菌的子实层仅位于瓣片一边。尽管难以清洗，好闻的香气和大而多汁的果实，让它成了家喻户晓的美味。

- 生长分布：多见于林场和天然林地的松树上，引发树木褐腐病，广泛分布于北温带；局部地区多见。
- 相似种：广叶绣球菌 (*S. brevipes*) 色泽较淡，质地较粗糙；多见于栎树、山毛榉或冷杉，北美的绿叶绣球菌 (*S. herbstii*) 形态相似，或是同种。



剖面

● 分枝瓣片
中具菌柄



形子实体

子实层仅位于
● 瓣片一边


子实体可食用
重1—2千克

子实体多生长于松树上，引发
褐腐病

球形真菌

本章介绍的各种真菌的子实体全是球形。

除粉褶菌（下图）外，马勃、灰疣硬皮马勃以及某些子囊菌是地上部球形，而许多以美味闻名的块菌（见第258—259页）种类则是地下部球形。



地上部球形

这... 子实体... 孢子... 包被老熟后孢子... 在子实体内产生孢子；包被老熟后孢子


科... 种... 生长季节

粉褶菌 (ABORTED PINK-GL)

先下... 的圆子实体，据认为这是粉褶菌寄生蜜环菌的结果。有菌盖（横径约10cm）、菌柄（高约10cm，宽1.5cm），子实体的产生属于偶然。粉褶菌灰色，延生菌褶粉红色。白色菌肉有黄瓜气味或新鲜粉气味；未成形粉褶菌有粉红色脉纹。

• 生长分布：生于开阔林地的阔叶树上。广泛分布并常见于北美东部

• 相似种... 粉褶菌可谓独一无二... 褶菌的有盖，有柄子实体形状却是和... 一般长于地面，非延生菌褶；多数有毒，所以，不加识别就随意进食成形粉褶菌（*E. abortivum*）是很危险的，



子实体... 生长季节... 相似种

大马勃 (GIANT PUFFBALL)

著名食用菌之一。巨大子实体足球形。白色或奶油色，往往可重4千克以上，甚至发现有20多千克的重量记录。孢子是子实体内体结构的最大组成部分；不孕基部极为缩减。菌肉质地结实，未成熟时呈白色。

• 生长分布：腐生；

生于田野、灌木丛林地边缘，公园的富肥土地。广泛分布于除北美洲西部以外的温带地区。

子实体

出现

孢子

可食性

科

种

生长季节

铅色灰球菌 (LEAD-GREY BOVIST)

1. 子实体：球形，直径 1-2 厘米，表面铅灰色，有细密的鳞片，基部有短柄。可食，但食用价值不大。

• 生长分布：腐生；仅生长于草地，特别是在十

• 相似种：黄褐色的，子实体较大，可食。颜色。



子实体



剖面

菌盖的
• 产菌



• 菌盖的基部

科 马勃

种 V

生长季节


草地横膜马勃 (MEADOW PUFFBALL)

1. 子实体：球形，直径 1-2 厘米，表面黄褐色，有细密的鳞片，基部有短柄。可食，但乏味。

• 生长分布：腐生；仅生长于草地，特别是在十




子实体多是小群生



• 菌盖的基部



• 菌盖的基部



剖面

• 菌盖的基部

R 1

1

1

1

可食性

科 种 生长季节

黄硬皮马勃 (COMMON EARTHBALL)

这种浅黄色有鳞包被覆盖的马铃薯块状地，是人们很熟悉的。菌体呈淡黄色、厚2—5mm，胞体里充满黑色孢子。整个子实体质地均匀，有大理石似的黑色感觉。有毒，不可食，有一股难闻的金属气味。

生长分布

与寄牛肝菌一起生长，广泛分布并常见于北温带地区。

· 相似种

261页)和块菌属真菌(见第258—259页)有外形、色泽、孢子形状等诸多差异。

不食马勃
不食马勃

块状上黄硬皮马勃



厚2—5 mm



1.5 cm

图 2

图 3

朱红乳菇 (CINNABAR MUSHROOM)

看似拟小菇的朱红乳汁块菌有许多松乳菇属(见第43—55页)的显微特征：和各种松乳菇一样，切割这种块菌将产生白色“乳汁”，乳汁味道清淡。干燥后不变色。孢子产生于柱黄色

之际孢子就开始扩散，动物吞食块菌而把孢子带向四方，也是孢子传播的一种方式。

· 生长分布：和开阔林地的松树形成菌根。广泛分布于北美东部，常见。

图 4

黄硬皮
不食马勃
不食马勃



干实体
土表，也可埋于土下

尺寸 子实体 3—5cm

孢子

可食性

黑轮层炭壳 (CRAMP BALLS)

子囊壳: 球形的
木或子座上, 菌肉被
同或层层环状

子座最终变黑、吸的

• 生长分布:

受腐木上

阔叶林地

阔叶树上也常见 分布于北

• 相似种



900x



尺寸 复合子实体 2—10cm

孢子 康位

生长季节

草莓牛蒡团菌 (BEECH WOODWART)

这种子囊壳的半球形复合子实体 (子月
粉红到暗红色都有; 老熟即变黑色 瘤形表
面, 下部是产生孢子的瓶形子囊壳 菌肉黑色

• 生长分布: 生于林地中新鲜的山毛榉倒木
见于北温带与毛榉分布区

• 相似种: 有孔炭团菌 (*H. howeianum*)

生于其他阔叶树上。脐孔炭团菌 (*H.*
umbonatum) 扁平、伸展

红褐色、紫棕炭团菌

(*H. fuscum*) 主要生

于榛树、栎木、紫

褐色



子实体 上 下 树皮上

尺寸 复合子实体 0.5—3cm

孢子

可食性 不可

地下部球形

木

266-267

Truffle

Truffle

的内部结构，并与盘菌属（*Peziza*，见

无

种

王世等

夏块菌（SUMMER TRUFFLE）

作为最便宜的可食性块菌，夏块菌子实体并非规则圆球形，表面覆盖粗糙的锥形黑色疣体，菌体菌肉坚硬，灰褐色而显白色脉纹，有一股明显的腐烂海草气和淡淡的坚果味，采菇者可借飞蝇小虫的指引寻

找块菌。

• 生长分布：生于山毛榉、橡、栎的树根中，分布于欧洲南部和中部，斯堪的纳维亚南部。



子实体生长于山毛榉、橡、栎的树根中



切面
切面显示内部白色脉纹

剖面



子实体生长于山毛榉、橡、栎的树根中

尺寸 子实体 2—5cm

孢子 卵圆形

可食性 100%

无

种

王世等

黑孢块菌（PER GORD TRUFFLE）

表面粗糙，炭黑色的黑孢块菌呈不规则圆球形，由无数多角形小瘤构成，被孢子染成褐色的结壳。

口味浓郁。有经验的采菇人使用训练过的狗或猪从深土荒野采集黑孢块菌；如今，块菌的商业性栽培已经成为可能。

• 生长分布：多见于地中海栎树和其他生长于碱性土和地中海红壤的奇针树下。黑孢块菌喜温暖，仅局限于法国、意大利、西班牙南部地区，年产量约300吨。

• 相似种：冬块菌（*T. hyemalis*）可见于远北乃至不列颠群岛。大孢块菌（*T. macrospora*）表面较平滑。

剖面



内部结构由成百个多角形小瘤构成

表面类型



子实体

尺寸 子实体 2—7cm

孢子 肾形

可食性 100%

白块菌 (WHITE TRUFFLE)

选择性可食的块菌子实体呈不规则圆形。

色，表面平滑。奶油色。

为的深奶油色区是孢子堆集所致。

以接种菌苗于适宜寄主树根的方法正。



· 生长分布

场树、枫树根丛中。主要产于意大利西部的皮埃蒙特地区及法国。

· 相似种：俄勒冈白块菌 (*T. gibbosum*) 产于北美，与白块菌、可食。



纸管块菌



子实体



剖面

尺寸 子实体 2—8cm

孢子

可食性 1

科

种

生长季节

粒状大团囊菌 (GRANULATED HART'S TRUFFLE)

致。子实体内产生粉状孢子。成熟时皮层破裂扩散孢子。



· 生长分布：和林地、公园的多种针叶树或阔叶树都能形成菌根；大团囊虫草就寄生于这种块菌。广泛分布并常见于欧洲；北美东亚也有发现。

· 相似种：并糙大团囊菌 (*E. muricatus*) 整个外表如大理石，下部外壳多疣，黄褐色。

剖面



剖面



子实体大小 在土壤中




尺寸 子实体 1.5—4.5cm

孢子 黄褐色

可食性 1

梨形、乳钵形真菌

本章介绍有短茎球形基部、圆形有性顶部特征的
马勃属和灰包属。这类真菌孢子成熟时
既可从顶部孔孔散发，也可因包被破裂扩散。
孢子或子实体的任何移动都有助于孢子传播。



科 马勃

种 *Lycoperdon pyriforme*

生长季节 秋—冬

梨形马勃 (STUMP PUFFBALL)


这是较容易识别的马勃菌之一：拉长的梨形子实体，成熟
时表面平滑，基部有白色菌束以及以木质为基底——其他

状包被。菌肉白色，坚硬时可食，除此之外都没有食用
价值。

• 生长分布：腐生；多生于林地、涵
育草木区、公园的腐朽阔叶木上，
有时木上罕见。除极地气候外，
世界各地几乎都有分布。

• 相似种：发现于开阔沙质
地的乳色马勃 (*L. lividum*)
也是平滑表面，但是较深灰

(比较平滑)。




子实体一般大丛生

刺猬马勃 (HEDGEHOG PUFFBALL)


这种马勃为球形表面长满褐色长刺，整个子实体从上到下逐渐变细，形如刺猬；长刺于成熟时脱落，在深褐色的菌盖上留下网状花纹。孢体白色，未成熟时坚硬；成熟时变呈淡紫色，巧克力褐色的孢子从孢体顶端小孔喷射而出；无性基部有与在老熟后色泽加深。

• 生长分布：腐生；生于碱性土，一般多见于山毛榉林；有时也可发现于比较

mammiforme) 周围。分布：欧洲温暖地区和邻近亚洲地区。



• 孢子于成熟时喷射而出




子实体几个聚生生长于山毛榉林

网纹马勃 (COMMON PUFFBALL)

球形，一般有明显菌柄，白色至黄褐色，表面被短刺覆盖，每个短刺都有细小颗粒和鳞片围绕。顶端的小突起是将来形成孔口的标记，孢子却从这中间向外扩散。成熟时，短刺脱落，在表面上留下规则的网状花纹，坚硬的白色菌肉幼体时可食，老熟后色泽加深，变味难吃。

• 生长分布：腐生；出现于地面，多见于林地，但也有见于草地。分布并常见于北温带。

• 相似种：黑刺马勃 (*L. nigrescens*) 的刺从更长，色泽更深，与上列的刺猬马勃相似；但刺猬马勃的刺还要长得更多。这两种刺状马勃在刺从脱落时都留下相似的网纹。



• 网纹马勃

子实体单生或偶密群生


科 马勃 | 种 *Holkeia exiguiformis* | 生长季节 秋

乳钵形马勃 (PESTLE-SHAPED PUFFBALL)

性顶部; 短柄子实体也有发生。成熟时, 包被微裂打开, 孢体內的灰褐色孢子散出, 借助风力和雨水四处传播。木味。成熟时柄部变得相当坚硬, 或许可。


生长分布
草皮上。广泛分布并常见于北温带的大部分地区, 并一直延伸至亚北极区和亚热带地区。
相似种: 莫尔马勃 (*Lycoperdon molle*), 种相似的短柄马勃, 需借助显微镜观察确定。

作欧洲食种时
已。最厚约 1 厘米
而肉的部分较薄。




• 生于苔草
或腐木丛中

菌柄基部



• 茎部不无中孢子



子实体多是小群生

科 白粉


种 *Handkea utiformis*

生长季节 夏 秋

龟裂马勃 (MOSAIC PUFFBALL)

■ 高度绝对不大于宽度，梨形相当粗糙，覆盖的粉状鳞片在成熟时有所消入。顶端包被破裂显露出褐色或橄榄色的粉状孢子群。不孕基部白色，老熟后变褐色。子实体幼体可食，但乏味。

• 生长分布：腐生；生长于旷野，南方地区多见。分布于北温带。



子实体多是小群生于草地、青苔地。

10

尺寸

♀

♂

孢子

1000x

科

种

生长季节

灰疣硬皮马勃 (SCALY EARTHBALL)

子实体很大，淡黄色至褐色，表面覆盖不规则形状的褐色鳞片。形如菌柄的基部

金属气味，白色，成熟时迅速变成紫褐色。子实体包被破裂后，孢子可借风力扩散。

• 生长分布：和生长于林地、公园的枞树、山毛榉树等阔叶树中成菌根。广泛分布并常见于南、北温带地区。



子实体多是小群生于草地、青苔地。

尺寸 子实体 ♀ 5-10cm ♂ 2-5cm

科 美锈

种 *Calostoma cinnabarinum*

生长季节

红皮美锈菌 (PUFFBALL-IN-ASPIC)

外包被凝胶态，内包被红色，破裂至柄部，形成有红色碎片点缀的厚果肉。围绕柄部，暴露的卵形顶端有红粉魔盖，消散时显露淡黄色球形孢子。

• 生长分布：生长于开阔林地地面。广泛分布并常见于北美东部。

• 相似种：土黄马勃 (*C. lutescens*) 外形相似，但呈黄色。草黄马勃 (*C. ravenelii*) 呈稻草黄色，没有凝胶可



子实体小群生于开阔林地。

尺寸 子实体 ♀ 2-5cm ♂ 1-2cm

孢子

1000x

科 柳盤菌

种 *Tarzetta cupularis*



生长季节 夏 秋

杯盘菌 (DENTATE ELF-CUP)

子实体酒杯形，杯边有小三角锯齿，短菌柄。和其他杯菌不同的是，杯盘菌子实体大小形状变化并不大。杯外表面有粉状质地，浅黄色；杯内表面的子头层呈灰奶油色。

·生长分布：生于富肥、碱性粘土的公园、林地。分布于北温带，相当常见。

·相似种：该属种类不多，都生于相同生长环境。子实体大，柄径可达5cm。除此之外，各种杯菌似乎难以区别，观察菌柄长短和菌盖微皱检查有助区别。



脐状皱盘菌 (CUP-LIKE MOREL)

深褐色子实体初起杯形，随之变坦平，老时可变球形。表面起皱，有明显脐状凹纹，特别是较大子实体更是明显。底面米白色，鳞片覆盖。大大缩短的菌柄厚，米白色；浅色菌肉味苦、厚、有股氨气，但可食；烹调可使气味消失。

·生长分布：生于公园、林地，常发现与半开羊肚菌相伴而生；这种真菌和蜂斗菜属 (*Petasites*) 植物关系密切。除极地山区和热带外，分布广泛。

菌肉厚，
白，味苦。

成簇子
实体较大




图例：1. 杯盘菌；2. 脐状皱盘菌

泡质盘菌 (BLADDER CUP)

边缘向内弯折，紧紧卷拢，整个子实体呈明显球形形态。外表面颗粒状、浅黄色；内表面子实层呈淡黄褐色。孢子释放量小。跟盘菌属其他多数种类不同。

这种真菌的子实体老熟后并不扩大，黄色菌肉是盘菌属中最早的，但味较苦。

· 生长分布：生长于公园、花园、农场建筑物周围的肥沃地底层，如：堆肥、花圃覆盖物、腐朽稻草。广泛分布并常见于北温带地区。



子实体在腐草中生长



疣孢褐盘菌 (PIG'S EARS)

其子实体的脏褐色内表面随成熟变深橄榄褐色，可

肉眼识别——显微镜下可见这种真菌孢子表面有木炭般的网纹图案。子实体无柄，外表面红褐色，粉粉状，湿润时，也是红褐色。

· 生长分布

· 相似种



老熟后

普通猪耳朵



子实体群生或小块生



· 本属特征

· 孢囊壳
状、红褐色



尺寸 菌盖 1.5—7cm 1.0—3cm

孢子 白色

同 时 1.4

黄乳盘菌 (YELLOW MILK CUP)

子实体杯形，黄至褐色或灰褐色的黄乳盘菌与其他盘菌的最大区别在于菌盖张开之时：黄褐色的薄菌肉将渗出黄色乳汁，渐变鲜黄色，菌杯老熟后扩张，形状不规则。

• 生长分布：多见于阔叶树生长的田野路边；常和马鞍菌 (*Helvella*) 和丝盖伞 (*Inocybe*) 类真菌相伴而生。广泛分布并常见于欧洲；也见于北美东部和中部。


• 相似种：其他有黄乳汁的盘菌包括：米歇尔盘菌 (*P. micheli*)，其子实体较小，淡紫色；口味盘菌 (*P. vin rosella*) 也是子实体较小，渗出液体呈绿黄色，小也了。



子实体单生或群生于黏土地



● 菌盖老熟后扩张



● 菌肉可刮切 ● 形成破洞黄汁

尺寸 菌盖 4~0.5-5cm 1 0.5-2cm


可食性 不可食

地孔菌 (COMMON EARTH-CUP)

杯形子实体还算大，褐色，外表面多细毛，内表面平滑，可能寄生瓶形小真菌菌根很有，和近缘种真菌作比，地孔菌孢子较大。

• 生长分布：生长在不朽发现，分布非常见于欧洲。
• 相似种：地孔菌和地孔菌相似，但地孔菌的菌盖更平，且菌盖边缘更厚。

星形 半球土盘菌 (*Humaria hemisphaerica*) 长于地面，许多相似种之间差异极小，难以识别。



子实体破土而出，群生



子实体埋土



● 菌盖微凸



● 菌盖微凸 ● 菌肉可刮切 ● 形成破洞黄汁

● 菌盖微凸 ● 菌肉可刮切 ● 形成破洞黄汁

尺寸 菌盖 4~0.5-2cm 1 2cm

孢子 白色

可食性 不可食

橙黄网孢盘菌

(ORANGE-PEEL FUNGUS)

外表多绒，色泽鲜艳的橙黄网孢盘菌是最可爱的一种杯形真菌。未成熟时实体菌盖边缘向内卷曲，随后呈波浪形，老熟后张开变平坦。处理后有时也可食用，菌肉薄、易碎，白色至苍白。


• 生长分布：生于多沙地上，散生可见于人行道石缝，车道路边、新开草坪，有些毛盘菌（见下）也可发现于相似环境。广泛分布并常见于整个北温带。

• 相似种：其他盘菌


缺：需要进行显微镜观察才能正确识别



橙黄网孢盘菌
幼体形态



幼体形态



子实体成群生长的生



红毛盘菌 (COMMON EYELASH CUP)

一种极有特色的杯形菌，鲜橙红色，盘形菌盖呈橙褐色。侧盘菌属有许多相似种，只有通过显微镜观察，并根据孢子形态和附属性状提供的最好线索才能正确识别。

• 生长分布：生于池塘附近的潮湿、多苔藓林木上，偶尔也见于腐殖质丰富土地。柳树和多沼泽地常见。该属的其他种类同样多发生于潮湿的碱性土，广泛分布并常见于北温带。



红毛盘菌
幼体形态



子实体常密集出现在木头上



幼体形态

幼体形态

驴耳状侧盘菌 (LEMON-PEEL FUNGUS)

黄橙色子实体漂亮好看，内表面多有粉红相映的特色使这种盘菌较为容易识别。菌盖耳状，开裂。

· 生长分布


例没有严格对应关系。北温带局部地区有见。

· 相似种：鸡油侧耳 (*O. cantharella*) 较小，无粉红色。


优雅侧耳 (*O. concinna*) 子实体略短，红褐色。

较深褐色的龟耳侧耳 (*O. leporina*) 子实体较小。

主要生长于针叶林地。



子实体小丛生于落叶或腐木



侧耳

科 侧耳科

种 *Chlorocibaria aeruginosa*

生长季节 全年

绿杯盘菌 (GREEN STAIN)

这种盘菌可在木质基质上留下蓝绿色痕。可在适宜条件下周生性发生。子实体蓝绿色，有时稍暗，杯形，表面平滑，偶尔出现波状形边缘。菌盖或菌柄幼时柄均是蓝绿色。变色木，有时可用来制作木制品。

· 生长分布：生于阔叶林，且多见于杨木或

松木的倒木落枝上。广泛分布于北温带，相当常见。

· 相似种：一些相似种也能产生绿色巧痕，但绿杯盘

菌 (*C. aeruginosa*) 孢子 $11.5 \times 3 \mu m$ ；绿杯盘菌孢



子实体



尺寸 菌盖 $\approx 0.2 - 1 cm$ 菌柄 $\approx 1 - 5 mm \times 1 - 3 mm$

子 2

1 菌 1 2 1


杜蒙盘菌 (ANEMONE CUP)

以子实体小群生于林地，
其根茎内形成菌核。分布广泛。

• 生长分布：寄生于银莲花属植物，
在其根茎内形成菌核。分布广泛。



子实体小群生于林地



栎树褐盘菌 (BROWN OAK DISC)


以子实体小群生于林地，
其根茎内形成菌核。分布广泛。

• 生长分布：生于栎树的倒木落枝和已变黑腐木
分布于欧洲，相当常见

• 相似种：暗红盘菌 (*R. bolaris*) 子实体较小，孢子较宽 ($18 \times 9 \mu\text{m}$)，而栎树褐盘菌 (*R. firma*) 孢子为 $17 \times 5.5 \mu\text{m}$ ，桦木盘菌 (*Ciboria batschiana*) 则长在橡实上。



子实体单生或成群生



紫螺菌 (BEECH JELLY-DISC)

体浅粉色、胶状、透明，子实体表面平滑，锯齿状边缘，向下急剧变细。横切面呈锥形。被划分成种的羊螺菌坚硬弹性强，长久暴露可使其溃烂，变薄，但仍可维持至冬季。

• 生长分布：生于相对新鲜的山毛榉倒木落枝。与草菇形炭团菌相伴为邻。分布于北温带；多见于山毛榉生长区。

• 相似种：胶鼓菌的生长环境相似，但质地较硬，呈褐色至黑色。



子实体
皮上



上表面切面，
* 子实体

尺寸 菌盖 $\approx 0.5-3\text{cm}$ $\downarrow$ 1cm

孢子

可食性 ~~不可~~

胶鼓菌 (POPE'S BUTTONS)

醒目的墨黑色和凸圆形使其另有雅号：主教纽扣。这种甘草根似的真菌成熟子实体盘形，黑色，但常带蓝色。作为锤舌菌的一员，胶鼓菌的不同寻常在于其孢子独特，漆黑扎眼。临近的树皮也可能对孢子的弹射而显得一塌糊涂，触摸时可在手指上吸。虽是8孢子囊，但只有顶部4孢子黑色。特殊的染色性能使胶鼓菌成为羊毛染料。


• 生长分布：生于山毛榉、栎树的新近倒木的树皮上；多见

• 相似种：黑耳 (*Exidia glandulosa*，见第283页)

• 子实体：子实体为凸圆形，黑色，常带蓝色。

• 孢子：孢子为椭圆形，黑色，有刺状突起。

• 生长：胶鼓菌在新鲜的山毛榉倒木上生长。



子实体常见于沼泽地的山毛榉或栎树皮上



孢子

可食性 ~~不可~~

尺寸 菌盖 $\approx 0.5-4\text{cm}$ $\downarrow$ 0.5-2cm

科 红汁菌科


| 种 *Ascocoryne cylichnium*

| 生长季节 秋-冬

紫棒盘菌 (LARGE PURPLE-DROP)

子实体盘形，凝胶状，红紫色；表面平滑，有光泽，边缘往往是不规则开裂。菌柄较短，使得从侧面看整个子实体呈倒锥形。

- 生长分布：广泛分布，潮湿处。
- 品质：相当常见。
- 相似种：脑形紫胶菌薄片狭窄，孢子较短。
- 属几个小种分布于北半球。识别的最好方式是显微镜观察孢子特征。



子实体密集成簇生长在树桩上



科 红汁菌科

| 种 *Ascocoryne sarcoides*

| 生长季节 秋-冬

脑形紫胶菌 (BRAIN PURPLE-DROP)

子实体盘形，胶质，红紫色，或许还有一个未长成的菌柄和未熟的盘形子实体一起出现的还有处于无性生殖态的脑形子实体，其色泽更淡，灰白色。

- 生长分布：主要生在桦木的落叶树桩或树干上，广泛分布，小片见于北温带部分地区。
- 相似种：紫棒盘菌在显微镜下最好识别：其孢子较大，子实体成熟时有丝隔膜。一般超过3隔。生在养蜂地的泥炭藓紫胶菌 (*A. nificola*) 稀缺，色泽较浓，脑形胶盘菌 (*Ascotremella*



子实体以生或单生，无性生殖和有性生殖两种状

孢子子实体

尺寸 菌盖 0.2-1cm 1-4mm

| 孢子 2-4

| 可食性 不可食

橘色小双孢盘菌 (LEMON DISC)

以便这种小盘形菌
上表面平滑、平坦或
白色, 较黄。也可能生白色子实体。无白
• 生长分布: 生于阔叶树倒木, 多见于山毛榉树
树、橡树; 长在没有树皮的树干部位。广泛分布于北
部等, 相当常见
• 相似种: 小双孢盘菌属 (*Bioporella*) 某些
子实体出现黑色粉状的人性形式 (*Biopora*), 此
种或许自朽, 而有的或许只
存在最微特征差异



子实体生于倒木上, 密集拥挤, 能入生肉



尺寸 菌盖 1-3mm

图 1 图 2 图 3 图 4 图 5 图 6 图 7 图 8 图 9 图 10 图 11 图 12 图 13 图 14 图 15 图 16 图 17 图 18 图 19 图 20 图 21 图 22 图 23 图 24 图 25 图 26 图 27 图 28 图 29 图 30 图 31 图 32 图 33 图 34 图 35 图 36 图 37 图 38 图 39 图 40 图 41 图 42 图 43 图 44 图 45 图 46 图 47 图 48 图 49 图 50 图 51 图 52 图 53 图 54 图 55 图 56 图 57 图 58 图 59 图 60 图 61 图 62 图 63 图 64 图 65 图 66 图 67 图 68 图 69 图 70 图 71 图 72 图 73 图 74 图 75 图 76 图 77 图 78 图 79 图 80 图 81 图 82 图 83 图 84 图 85 图 86 图 87 图 88 图 89 图 90 图 91 图 92 图 93 图 94 图 95 图 96 图 97 图 98 图 99 图 100

蛛丝盘菌 (ORANGE DISC-SKIN)

这种外形似蛛的菌质地较硬, 比其他许多
蛛形真菌更具革质。菌盖粉橙色, 粉状表面,
边缘多白色碎屑。以中心着点方式紧紧有
草叶。其最显的胶质、透
明, 白色斑点表明曾有诸
如栲栣银耳 (*T. simplex*)
银耳属 (*Tremella*)

• 生长分布

• 相似种: 精致毛杯座
(*Lachnellula subtilissima*)
多毛, 鲜橙色, 有显著菌柄



子实体

杯中有“卵”

本个菌有卵，与许多其他菌的孢子不同，它起时有上体保护壳，且特具杯状上体，体与有杯状老熟产大、小孢子，水中则名为“小包”的微细结构。小包里是产生扩散

科 鸟巢菌 种 *Crucibulum crucibuliforme* 生长季节

白蛋巢菌 (WHITE EGG BIRD'S NEST)

白蛋巢菌属的唯一成员。圆柱形的鸟巢状橘橙色子实体里装有10—15 (多至20) 个含有孢子的小扁口形白“卵”。每个“卵”都由细小的菌丝系附着于“鸟巢”。“鸟巢”的外表层多绒至平滑。不成熟“鸟巢”覆盖橘橙色皮层保护。皮层消失时，“卵”随雨水四处扩散

• 生长分布：生于林地、公园、草地的残食、覆盖层和锯末上。较常见于北温带。

• 相似种：白蛋巢菌 (C. *alba*) 成锥体形，“卵”的色泽较深



含有孢子且带“卵”

多绒至平滑的杯状壳



子实体群生于腐烂植物

尺寸 1-2 厘米 孢子 可食用性 不可食用

科 鸟巢菌 种 *Cyathus striatus* 生长季节 秋


隆纹黑蛋巢菌 (FLUTED BIRD'S NEST)

本个菌有卵，与许多其他菌的孢子不同，它起时有上体保护壳，且特具杯状上体，体与有杯状老熟产大、小孢子，水中则名为“小包”的微细结构。小包里是产生扩散

• 生长分布：生于林地、公园、草地的残食、覆盖层和锯末上。较常见于北温带。

• 相似种：赤黑蛋巢菌 (C. *olla*) 没有条纹，主要生于腐生、生于腐生、生于腐生

“卵”色泽较深，无条纹、北温带、生于腐生、生于腐生



鸟卵




子实体生于腐生植物

尺寸 1-2 厘米 孢子 可食用性 不可食用

喇叭形真菌

本章介绍的真菌以子实体喇叭形、中空、子实层排列于略显平滑的外表面为特征。这部分真菌多属鸡油菌科。其菌肉相当粗硬，生存期可维持好几个星期。



黑喇叭菌 (HORN OF PLenty)

子实体深褐色，喇叭形、中空，子实层排列于略显平滑的外表面。细嫩的灰色菌肉味清淡，有好闻香气。因色泽而不易被发现，不过它一般都是成群发生，采摘时一旦发现，收获颇丰。

- 生长分布：生长于肥沃碱性土，多有林地阔叶树形成菌根。广泛分布于北美东部。
- 相似种：假喇叭菌 (*C. fallax*) 的北美单菇更是气味芳香。



● 黄褐色
子实层肉质

剖面



子实体群生或小丛生

淡黄鸡油菌 (GOLDEN CHANTERELLE)

- 喇叭形，子实体平滑，与喇叭菌属种类（如↑例）相似。
- 生长分布：广泛分布于北美东部，相当有限的局部地区有见。
 - 相似种：淡黄管形鸡油菌 (*C. tubaeformis* var. *lutescens*) 外表面有明显脉纹网络。



子实体

薄黄鸡油菌 (SMOOTH CHANTERELLE)

子实体：喇叭形，波浪形，主要外表：外表平滑至微显脉纹。薄黄鸡油菌一般长得比较密集，不过其香味和口味却毫不逊色。看起来和喇叭菌的淡黄型差不多。这种鸡油菌最初被命名为“喇叭鸡油菌”。

- 生长分布：生于桦树下。分布于北美东部，常见。
- 相似种：鸡油菌外表有成片分叉的鳞片状折叠。芳香喇叭菌 (*C. odoratus*) 则是浓汁从牛蒡花束状



子实体生于林地和公园空地的桦树下，单生或成群生

尺寸 子实体长 2.5—10cm 宽 0.5—2.5 孢子 可食性 可食

喇叭陀螺菌 (ORANGE PIG SEAR)

子实体：喇叭形，波浪形，主要外表：林间空，菌盖红，颜色至橙黄色，表面点缀着奇形怪状的鳞片；菌肉也是同样的颜色。一层表面凹陷，奶油白色至赭色，有脉纹。因可引起肠胃不适，不建议食用。

- 生长分布：针叶树和混交林地而多见；分布非常见于北美。
- 相似种：同样是鲜红的波阿柳钉菇 (*G. bonarii*) 子实层表面呈乳白色，考夫曼柳钉菇 (*G. kauffmanni*) 子实体较大，多鳞粗糙，黄褐色。



子实体生于林地，单生或成群生

尺寸 子实体长 2.5—10cm 宽 0.5—2.5 孢子 可食性 可食

星形、笼形真菌

这些种类的真菌因其产孢组织（产孢体）长于子实体内，所以又被称为“腹菌”。本章介绍的两种笼头菌（见下和280页）都和鬼笔真菌有关，地星的子实体开裂呈星形，内含孢子球。



佛手菌 (DEVIL'S FINGERS)

由伞菌帮助传播。它的子实体有4—

“臂”内。所有的笼头菌都有中空笼形；

几乎所有种类都是红色或白色至米白色。

• 生长分布：生于林地、公园、苗圃的泥堆、锯末、木屑中。澳洲和欧洲均有分布或栽培。

• 相似种：细皱鬼笔 (*Pseudocolus fusiformis*)

多生于北美，仅有3或4条

“臂”。星头菌属真菌鬼笔珊瑚

珊瑚 (*Asero coccinea*) 基部

似佛手。

• 鬼笔菌 (上页)
其子实体可食



子实体和... (Amanita muscaria)

尺

孢子

可食性

硬皮地星 (BAROMETER EARTHSTAR)

子实体圆形，红褐色，有霉味，成熟时外包被开裂呈星形，内包被胶质不开裂。外包被灰褐色孢子球显露在外。地星有异常的吸湿性，即使从菌丝体开裂的外包被也能迅速吸收水分：1小时内有1mm时吸水铺地菌。孢子球顶端有小孔，孢子借由雨水溅打从小孔中散出传播。

- 生长分布：阔叶林：多见于生长在干燥的开阔林地。分布广泛，世界各地，但不见于热带和北极地区。
- 相似种：地星属各种地星的显微特征均有差异，如：孢子囊菌丝的粗细长度就各有不同。



• 孢子球不开裂，子实体1群生，多见于沙地。

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 尺寸 子实体 4-5cm 菌丝 1-2cm 5-3cm | 孢子 褐色 | 可食性 不可 |
| 科 牛肝菌科 | 种 <i>astrum triplex</i> | 生长季节 秋 |

尖头地星 (COLLARED EARTHSTAR)

分布很广泛的地星——有尖头地星较广。子实体形如蘑菇，成熟时外包被开裂分为两层，外层如子，内层如裙边围绕中心孢体小球。小球顶端有孔，球内孢子可借由雨水冲激从孔中散出。

- 生长分布：草原、公园和林地均可生长。世界各带都有分布，尤常见于温带和寒温带。
- 相似种：黑头毛地星 (*Trichaster melanosporus*) 的菌球无包被或一孔。多口地星 (*Myriostoma californae*) 有多个孔以供孢子扩散。



子实体群生或在肥沃地上生长

| | | |
|----------------------------|----------|---------|
| 尺寸 子实体 4-12cm 内球 2-4cm | 孢子 红褐色 | 可食性 可 |
|----------------------------|----------|---------|

科

种

生长季节

毛嘴地星 (SESSILE EARTHSTAR)


• 球状 干燥时收缩成星形
外包被张开，开裂成星形。内包被不打开，包裹孢子，球形，浅

棕色。干燥时，内包被会使其收缩，压迫孢子从长满细毛（有毛缘）的顶端小孔散出

• 生长分布：多见于生长于碱性土的针叶树和阔叶树残渣上。广泛分布于北温带

• 相似种：尖头地星通常也生长在相似区域；外包被开裂呈星形，有球

星阶色泽不同外，干燥时内球顶上可长出卷状物



尺寸

科

种

生长季节


矮地星 (DWARF EARTHSTAR)

这种地星的识别主要在于其生活环境——开阔、多草，以及大小。另外，还可观察子实体开裂暴露的孢子球。小内球有形似鸟嘴，起皱多条纹的孔口，不成熟的子实体近球形，通常和沙子碎片结成薄壳；肉质外包被开裂成5—8个圆裂，成熟时变纸状，内球灰褐色。

• 生长分布：生于碱性沙地的田地粪堆，或

相似种

柄部较明显



尺寸

孢子

可食性

条纹地星 (STRIATED EARTHSTAR)

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

七、十分坚硬 打开后，肉质，灰褐色的圆裂很快
就变成了薄纸状

• 生长分布：生于肥土，常见于菜园，公园及林下；也见于混合林和杂木林地。分布于欧洲；世界分布区域不广。

子實體多在混合堆疊上長成性
形排列 環形。在几處散置



紅籠大菰 (RED CAGE FUNGUS)


从广,色变淡黄色
破的,字体) 1 本

成熟时变成 一个近球形网格状孢 “**棚**”
由 “**网格**” 被橄榄褐色孢体粘成胞品。并发
出恶臭气味。吸食昆虫则来粘吸散孢子

·生长分布：生于公园、茅地的落叶和木质铁
 质：温暖地区多见 分布广泛，但以少数种类
 但不常见；多见于地中海地区 希腊的“P”●

• 相似种：笼头兰属自南大
约有17种，主要生长于热
带；有鲜红色和白色两种
类型

斗牛



耳形、脑形胶质真菌

本章介绍的多数真菌都有胶质菌肉
天气干燥时可脱水变干，湿润时可吸水恢复
原状，继续进行孢子扩散。其形状多样
脑形子实体的子实层铺陈全部菌体
耳形子实体的子实层只长在下表面。



黑木耳 (JEW'S EAR)

子实体的耳朵状，性温，新鲜子实体胶质，干燥时变硬。

人认为这种青麦口味的真菌仅可食用，在中国人则把木耳和相关菌类既当美食又当药用。

- 生长分布：生于阔叶木上，多见于潮湿林地的老树上，广泛分布于北温带至暖地区。
- 相似种：毛木耳 (*A. polytricha*) 外形相似，色泽相同或更深，上表面多毛；主要生长于热带地区。



子实体单生或层层拥挤成竹

科

种 *Hydnangium*

生长季节

金耳 (YELLOW BRAIN-FUNGUS)

假担子，子实体，黄色至橙黄色，子实体球形。长期降雨可导致色泽变白，但偶尔也会产生白化类型。干燥气候可致使子实体起皱，但在潮湿环境下又可吸水恢复原样。口味清淡，但仍可用于烹调。

• 生长分布：寄生于长在阔叶树枝杈上的皮壳菌科真菌上；往往多见于矮灌木丛中分布并常见于北温带。



• 干燥气候下

• 全部表面都可产生孢子



子实体叶状，多为小群生。

尺寸

子实体

孢子

子实体

可食性

科

种

生长季节

茶耳 (LEAFY BRAIN-FUNGUS)

假担子，子实体，高度胶质的褐色子实体无柄，直接依附在树皮上。这些特征使得这种真菌的识别比较容易。

子实体呈叶状，全部子实体。

• 生长分布：寄生于公园、林地的阔叶树的阔叶菌类和皮壳菌科真菌上。也见于松树，分布于北温带。

• 相似种：脑形胶质菌和紫耳菌都和茶耳相似，其特征都是：子实体紫色、叶片状、脑形。



干燥子实体
颜色变黑



子实体 孢子 可食性

尺寸 子实体 $4-12\text{cm} \times 3-7\text{cm}$

孢子 白色

可食性

科 胶耳

种 *Exidia glandulosa*

生长季节 夏秋

黑耳 (BLACK BRAIN-FUNGUS)

看起来像焦油块，这种果冻质真菌较硬，其胶黏

且 脆，入口

更脆架，较 脆，入口

且 脆，入口

生长分布

相似种：截形黑耳 (*E. truncata*) 也较常见

在阔叶类阔叶树。子实体更像：

外表面多毛，子实层表面多突起



尺寸 联合子实体 2-10cm 直径

孢子

生长季节 夏秋

脑形胶盘菌 (BRAIN-LIKE JELLY-DISC)

种暗紫色真菌，其最常见形式是：有光泽，

形如大块果冻，群生，直径可达10cm，子

实体由许多不规则形状的胶块构成，整体看

起来似脑形。整个子实体由短小的柄状支着

点附于基质，虽说看起来像是

胶质真菌，但显微镜观察却发现孢子产生于圆柱形子囊，应

属盘菌

生长分布：一般生于山毛榉

死木，但其他阔叶树也有生

长，分布于北美东

多数地区，局部地区

孢子

孢子囊



子实体

尺寸 子实体 1-2cm 直径 2-4cm

孢子 白色

可食性 不可食

孢子表

1. f is a function from X to Y .
 2. f is a function from X to Y .
 3. f is a function from X to Y .
 4. f is a function from X to Y .
 5. f is a function from X to Y .
 6. f is a function from X to Y .
 7. f is a function from X to Y .
 8. f is a function from X to Y .
 9. f is a function from X to Y .
 10. f is a function from X to Y .

[illegible][illegible]

[illegible]

术语表

• KOH

氢氧化钾 可在某些种类真菌中产生。

• 子实体

高等真菌支持菌丝体，产生有性孢子的结构。

• 子座

某些真菌形成的一种保护性组织。如担子菌类一般子座为木栓状。

• 子囊

子囊菌中产生性孢子的囊状器官。

• 小纤维

线头状纤维束。

• 孔口

管状结构，如担子菌类的子实体边缘的毛状体。

• 毛霉

一种子实体边缘的毛状体，如毛霉。

• 水浸状

通常指伞菌类真菌盖中心部位开始干燥，直至整个子实体变干燥；而在湿润时，菌盖边缘出现黑色并向中心扩展。这类真菌的菌盖边缘将出现刺细胞。

• 牛肝菌

一种子实体多肉的大型真菌，有盖下有无数小孔和松软菌管。

• 丝膜

一种网状膜状物，可见于丝膜。

• 凹生菌褶

菌褶与菌柄之间形成凹口。

• 产孢体

马勃、臭角菌、地星、地包、鸟巢菌类真菌的菌体内产生孢子的结构。

• 伞菌

有菌盖，菌柄且形似小伞的真菌；菌盖、菌柄组成子实体，有盖下有菌褶。

• 刚毛

出现在菌盖、菌柄、菌柄表面或菌肉内的坚硬毛状物。

• 延生菌褶

菌褶下行延伸至菌柄。

• 有皱纹

菌盖表面有皱纹。

• 伞菌

有菌盖，菌柄且形似小伞的真菌；菌盖、菌柄组成子实体，有盖下有菌褶。

• 间隔

有丝体或孢子被分隔成多个小格。

• 附生菌褶

菌褶与菌柄连接处有狭窄附着面。

• 孢子

真菌的微小繁殖细胞。

• 担子

担子菌中产生性孢子的棒状细胞。

• 寄生菌

菌体外形弯曲。

• 玻璃体

菌体内无色质地。

• 倒伏

菌体倒伏。

• 瓶形真菌

子实体小，形如细瓶，并且往往埋生于子座里而得到保护。

• 离生菌褶

菌褶与菌柄无连接。

• 部分菌幕

某些伞菌幼期子实体具有的一种薄而的膜状或线状结构，由菌盖边缘伸向菌柄，包被保护菌褶或管口。子实体成熟时破裂，残留在菌盖边缘或绕菌柄形成菌环。

• 假根

真菌的似根状延伸菌丝体。

• 基质

土壤、树皮等植物与真菌赖以生存的附着面。

• 淀粉

多糖类物质，广泛分布于植物体内，是人类的主要能量来源；特有的遇碘呈蓝色反应可用于检测淀粉。

• 菌丝

包括子实体在内的构成真菌营养体的丝状结构。

• 菌丝束

某些真菌具有的一种附属子实体的圆柱形或似锥形结构；如灰色球盖菇。

• 菌核

某些真菌具有的营养贮藏器官，内有紧密交错的无色菌丝体，外有黑色保护外壳。其内含养可帮助真菌在恶劣条件下生长。

• 菌柄

真菌与植物根的共生复合体，互相受益。

• 菌盖

伞菌的盖。

• 菌管

牛肝菌等真菌菌盖下的管状结构，可产生孢子。菌盖下片口。

• 菌褶

伞菌菌盖下的放射状刀片状结构。

• 隆起

有之鳞片。

• 联生菌褶

菌褶与菌柄连接。

• 溶解性菌褶

孢子、像露水一样的液状物；为鬼伞类真菌独有特性。

• 管口

可释放孢子的菌管开口，如牛肝菌。

• 菌盖

一种特殊的不孕细胞，担子菌子实体各部位均可发现。菌褶、菌柄特征是识别菌盖伞、丝盖伞种类的重要依据。

索引

二画

大马勃

Giant puffball

Calvatia gigantea 254

大白桩菇

Giant funnel-cap

Leucopaxillus giganteus 32

人面蕈虫草

Slender truffle-chub

Cordyceps ophioglossoides
245

人抱花棚伞

Fringed mantle-gill

Panaeolus papilionaceus
107

人耳棚伞

Shaggy parasol

Macromphala rhacodes 166

人脚棚伞

Pavement mushroom

Agaricus bitorquis 161

人面蜡伞

Weeping fairy cake

Hebeloma crustuliniforme
67

大球盖菇

Burgundy slime-head

Stropharia rugoso-annulata
89

大紫菇

The prince

Agaricus augustus 158

F 小

Dry-rot fungus

Serpula lacrymans 229

小毒红菇

Fragile russule

Russula fragilis 129

小假鬼伞

Fairies' bonnets

Coprinus disseminatus 143

小盆孢菇

Tiny pixie cap

Galerina calyptrata 140

山丝膜伞

Coffin web-cap

Cortinarius orellanus 73

四画

人字草丝膜伞

Pelargonium web-cap

Cortinarius pileaceus 71

人耳菇

Red-staining mushroom

Agaricus sylvaticus 163

木蹄层孔菌

Tinder fungus

Fomes fomentarius 219

口多孔菌

Black-staining polypore

Meripilus giganteus 214

瓜香菇

Cucumber-scented toadstool

Macrocyttidia cucumis 108

Veiled fairy cake

Hebeloma mesopharum 93

红头乳菇

Red-staining parasol

Leucocoprinus budhami
170

贝壳状小香菇

Cockleshell fungus

Lentinellus cochleatus 179

贝壳侧孢侧耳

Angel's wings

Pleurocybella porrigens 180

水粉杯伞

Clouded funnel-cap

Clitocybe nebularis 40

毛头乳菇

Woolly milk cap

Lactarius torminosus 45

律师假伞

Lawyer's wig

Coprinus comatus 174

毛柄革菌

Hairy leather bracket

Stereum hirsutum 230

毛柄片伞

Two-toned wood tuft

Kuehneromyces mutabilis

木

木

Hairy bracket

Leucetia hirsuta 224

无柄乳菇

Sessile earthstar

Geastrum tuberosum 229

长根菇

Rooting shank

Oudemansiella radicata 117

长根滑锈伞

Rooting fairy cake

Hebeloma radicosum 82

火木层孔菌

Grey fire bracket

Phellinus igniarius 218

双孢蘑菇

Cultivated mushroom

Agaricus bisporus 101

五画

平田头菇

Common field-cap

Agaricus pedioides 106

平菇灵芝

Artist's fungus

Ganoderma applanatum 217

平菇

Common oyster mushroom

Pleurotus ostreatus 178

古巴裸盖菇

San isidro liberty-cap

Psilocybe cubensis 84*Agaricus bisporus**Strobilurus esculentus*

133

史密斯鹅膏

Smith's agaric

Agaricus smithii 48

丛生金钱菌

Clustered tooth-bone

Clitocybe nidulenta 11

田头菇

Spring field-cap

Agaricus praecox 85

丛生栎树伞

Clustered oak-bonnet

Mycena inclinata 133

白块菌

White truffle

Tuber magnatum 259

白乳菇

Peppery milk-cap

Lactaria stipitata 11

白林伞菇

Wood mushroom

Agaricus silvicola 156

白环蘑

Smooth parasol

Leucogasterus leucothites

164

白鬼伞

Snow-white ink-cap

Coprinus niveus 176

白鬼笔

Common stinkhorn

Phallus impudicus 247

白蛋巢菌

White egg-nest

Clathromorphum nereostrum

274

白黄小脆柄菇

White brittle-head

Peziza coccinea 95

白黄侧耳

Trunk-side mushroom

Peziza coccinea 29

白腐菌

Many-zoned bracket

Polyporus squamosus 11

白蜡伞

Satin wax-cap

Hygrophorus eburneus 106

白喇叭伞

Lawn funnel-cap

Clitocybe dealbata 34

白喇叭菇

Salt-loving mushroom

Agaricus bernardii 102

冬生多孔菌

Winter polypore

Polyporus brumalis 205

半开羊肚菌

Half-free morel

Morchella semivolvata 11*Agaricus bisporus*

Shiny mottle-gill

Panaeolus semiovatus 95

半圆球盖菇

Dome-shape head

Stropharia semiglobata 90*Agaricus bisporus*

Lactaria stipitata

Omphalotus olearius 29

丝柄小菇

Luteiform bonnet

Mycena lutipes 136

弗氏灵芝

Coppery Lacquer Bracket

216

Blue tooth

Hydnellum peckii 237

六画

亚侧耳

Olive oyster

Panellus vermicularis 180

灰光柄菇

Fawn shield-cap

Pluteus cervinus 171

灰树伞

Hen-on the woods

Cortola frondosa 216

灰地侧耳马字

Scaly earthball

Scleroderma verrucosum

263

灰假侧耳

The goblet

Pseudoclaviceps cyathiformis

32

灰褐纹蹄伞

Grey and yellow knight-cap

Tricholoma partentosum 61

灰黄栓孔菌

Funnel tooth

Phellodon tomentosus 236

耳匙菌

Ear pick fungus

Auriscalpium vulgare 234

地孔菌

Common earth-cup

Geopora arenicola 267

地生鳞伞

Charcoal scale-head

Pholiotia highlandensis 93

地柱菌

Bog beacon

Mitrula paludosa 243

网纹马勃

Common putiban

Lycoperdon perlatum 261

网面光柄菇

Velvety shield-cap

Pluteus umbrosus 172

网柄牛肝菌

Summer bolete

Boletus reticulatus 189

白色杯伞

Ricksome funnel-cap

Clitocybe gentopae 33

肉色香蘑

Strong scented blewit

Lepista irina 57

肉色香蘑

Dull milk-cap

Lactarius subdulcis 51

叉头地丁

Collared earthstar

Geastrum triplex 278

叉头地丁

Common milk-cup

Lactarius stipitatus 50

叉头地丁

Sandy milk-cup

Lactarius stipitatus 50*Cortinarius splendens* 77

叉头地丁

White grey-gill

Lyophyllum connatum 42

多汁乳菇

Tawny milk-cap

Lactarius volemus 54

名耳靴耳

Varied slipper

Crepidotus variabilis 183

名耳靴耳

Tufted brittle head

Psathyrella multipedata 108

名耳靴耳

Dead-man's fingers

Xylaria polymorpha 245

名耳靴耳

Common grey saddle

Helvella lacunosa 208

名耳靴耳

Cup-axe model

Discosis venosa 265

名耳靴耳

Pine spike cap

Chroogomphus rutilus 37

血红牛肝菌

Red-capped bolete

Boletus rubellus 193

血红丝盖伞

Green and pink fibre-cap

Inocybe haemacta 98

血红丝盖伞

Blood-red russule

Russula sanguinaria 136

血红丝盖伞

Cinnabar milk-cap truffle

Zelleromyces cinnabarinus

256

朱红虫孔菌

Cinnabar bracket

Pycnoporus cinnabarinus

225

朱红蜡伞

Hygrocybe miniata

143

玄络小皮伞

Horseshoe mushroom-cap

Marasmius androsaceus 138

安奈尔丝膜菌

Plum-scented web-cap

Cortinarius anserinus 74

巧目丝盖伞

White fibre-cap

Inocybe geophylla 100

羊肚菌

Common morel

Morchella esculenta 200

杂色多孔菌

Varied polypore

Polyporus varius 205

冬毛蕈肉

Scutellaria scutellata

268

红汁小菇

Bleeding bonnet

Mycena haematopus 136

红皮美锈菌

Puffball-in-aspic

Culostoma cinnabarina 263

红色烟白齿菌

Blushing fenugreek-tooth

Bankera fuliginosaalba 235

红孢牛肝菌

Purple-black bolete

Porphyrellus porphyrosporus

184

红柄小皮伞

Red-stemmed tough-shank

Collybia erythropus 112*Collybia erythropus*

Red-stemmed tuber-club

Typhula erythropus 242

红点牛肝菌

Dotted-stem bolete

Boletus luridiformis 189

红笼头菌

Red cage fungus

Clathrus ruber 280

红黄环柄菇

Orange-girdled parasol

Leptota ignivolvata 168

红黄褶牛肝菌

Gilled bolete

Phylloporus rhodoxanthus

42

红喇叭菌

Cinnabar chanterelle

Cantharellus cinnabarinus

30

红蜡蜡伞

Crimson wax-cap

Hygrocybe punicea 56

红蜡蘑

Common deceiver

Laccaria laccata 115

红褶丝膜菌

Red-gilled web-cap

Cortinarius semisanguineus 70

七画

HH柄牛肝菌

Scarlet-stemmed bolete

Boletus calopus 190

块茎多孔菌

Tuberous polypore

Polyporus tuberarius 203

块柄灰柄菇

Stout agaric

Amantia spissa 148

红茎鹿耳

Anemone cup

Dumontinia tuberosa 270

马兜铃状

Beechwood sickener

Russula mouretii 129

花斑球盖菇

Crested shime-head

Stropharia coronata 89

苍白乳菇

Pallid milk-cap

Lactarius pallidus 49

皂味粘滑

Soap-scented knight-cap

Lactarius stipitatus 40

肝色牛排菌

Beefsteak fungus

Leccinum scabrum 149

角拟珊瑚菌

Meadow coral-fungus

Clathrus cornutus 249

佛手菌

Devil's fingers

Clathrus archeri 277

毗尼西斑褶菇

Hay cap

Panuelus foenisecti 141

龟裂马勃

Mosaic puffball

Hamkea utiformis 263

和格牛肝菌

Legal's bolete

Boletus legaliae 191

条纹地星

Striated earthstar

Geastrum striatum 280

冷杉黄乳菇

Conifer purple-pore

Trichaptum abietinum 226

沟柄小菇

Roof-nail bonnet

Mycophelia rostrata 14

辛辣牛肝菌

Peppery bolete

Conocybe conopsea 155

阿瑞尼排盖伞

Ringed cone-cap

Conocybe arrhenii 96

柠檬状侧盘菌

Lemon-peel fungus

Ondea onotica 269

鸡油菌

Common chanterelle

Cantharellus cibarius 28

灵芝

Varnished polypore

Ganoderma lucidum 206

八画

巴罗牛肝菌

Barrow's bolete

Boletus barrowsii 186

杯盘菌

Dentate elf-cup

Tarzetta cupularis 265

杯乳菇

Delicious milk-cap

Lactarius deliciosus 46

松根异担子

Conifer-base polypore

Heterobasidium annosum 222

松塔牛肝菌

Old-man-of-the-woods

Strobilomyces strobilaceus

185

枝生微皮伞

Twig mummy-cap

Marasmius rotula 39

枣红小脆柄菇

Cone brittle-head

Pseudoclitocybe conica 11

欧洲松茸伞

Brown matsutake

Tricholoma caligatum 81

刺猬马勃

Hedgehog puffball

Lycoperdon echinatum 261

玫红铆钉菇

Rosy spike-cap

Gomphidius roseus 38

玫瑰红菇

Firm-fleshed russule

Russula rosea 126

环带乳菇

Puckle milk-cap

Lactarius trivialis 49

苦红菇

Bitter russule

Russula fellea 122

苦味丫酪菌

Bitter bracket

Tyromyces stipiticus 211

苦味丝膜菌

Bitter lilac web-cap

Cortinarius sodagnitus 76

苦粉孢牛肝菌

Bitter bolete

Tylopilus felleus 186

轮枝小皮伞

Common wheel mummy-cap

Marasmius rotula 177

青绿蜡伞

Parrot wax-cap

Hygrocybe psittacina 105

青黄蜡伞

Herald of winter

Hygrophorus hypothermus 37

绘皮乳牛肝菌

Painted bolete

Suillus spraguei 201

昆文菇

Tiger saw-gill

Lentinus tigrinus 35

乳白锥盖伞

Milky cone-cap

Conocybe lactea 140

乳足小菇

Milk-drop bonnet

Mycena galopus 137

乳钵长马勃

Pestle-shaped puffball

Handkea excipuliformis 262

乳酪金钱菇

Buttery tough-shank

Collybia butyracea 112

金毛鳞伞

Golden scale-head

Pholiota aurivellus 78

金目

Yellow brain-fungus

Fremella mesenterica 282

金针菇

Velvet shank

Flammulina velutipes 114

金粉蕈

Pink fair-head

Calocybe carnea 116

金盖鳞伞

Golden cap

Phaeolepiota aurea 83

金黄光柄菇

Golden-green shield-cap

Pluteus chrysophaeus 173

金黄拟蜡伞

False chanterelle

Hygrophoropsis aurannax

29

金黄蜡伞

Golden wax-cap

Hygrocybe chlorophana 104

金黄褶伞

Sandy knight-cap

Tricholoma auratum 63

木爱菇

Wood-loving pixie-cap

Galerina unicolor 91

卷曲发髻菇

Curly-haired elf-cup

Sarcoscypha austriaca 264

层叠齿生刺菇

Layered tooth-fungus

Creolophus cetratus 239

在嘴树菇

Brown roll-rim

Paxillus involutus 35

乳味乳菇

Oak milk-cap

Lactarius quietus 52

沼泽腐腐伞

Sphagnum greyling

Lyophyllum palustre 132

沼泽红菇

Tall russule

Russula paludosa 128

泡质盘菌

Bladder cup

Peziza vesiculosa 266

铅中毒者

Lead poisoner

Entoloma sinuatum 68

皮纹褶伞

Corrugated roll-rim

Tupinella corrugata 182

浅灰香乳菇

Coconut-scented milk-cap

Lactarius glyciosmus 54

灰绿纤维伞

Grey and lilac fibre-cap

Inocybe griseolilacina 101

复质绿杯伞

Blue-green funnel-cap

Citocybe odora 39

烟头小菇

Nitrous lawn bonnet

Mycena leptocephala 135

细网牛肝菌

Satan's bolete

Boletus satanas 191

粗环柄菇

Shaggy-stalked parasol

Lepiota clypeolaria 168

细质乳菇

Mild milk-cap

Lactarius mildisimus 50

锯齿乳菇

Saw-gilled blue-cap

Entoloma serruatum 144



九画

厚环柄菇属 (Lecanora)

Larch Bolete

Suillus grevillei 189

灰抱菇属 (Hypoglypha)

Powder-puff polypore

Oboloporus rennyi 233

伞菌属 (Cantharellus)

Common bonnet

Mycena galericulata 116

栎树鹿菇属 (Lactarius)

Brown oak dew

Rulstroemia firma 270

红乳菇属 (Lactarius)

Red oak bolete

Leccinum quercinum 198

栎树乳菇属 (Lactarius)

Thick maze gill

Dardulea quercina 226

栎树鹿菇属 (Lactarius)

Common stump brittle-head

Psathyrella ptiliformis 94

毒红菇 (Amanita phalloides)

The sickener

Russula emetica 128

毒红菇 (Amanita phalloides)

Death cap

Amanita phalloides 151

Fly agaric

Amanita muscaria 146

珊瑚状猴头菇 (Hericium coraloides)

Coral tooth fungus

Hericium coraloides 239

Cinnabar powder cap

Cystoderma terrei 96

羊耳菌 (Tremella foliacea)

Leafy brain fungus

Tremella foliacea 282

羊色牛肝菌 (Leptista flaccida)

Tawny funnel-cap

Leptista flaccida 31

羊耳菌 (Poplar field cap)

Poplar field cap

Agrocybe cylindracea 85

羊耳鹿菇属 (Amanita fulva)

Tawny grisette

Amanita fulva 152

草地环柄菇 (Leptista oreoformis)

Grassland parasol

Leptista oreoformis 167

草地乳菇 (Hygrocybe pratensis)

Buff wax-cap

Hygrocybe pratensis 38

草地蘑菇 (Vascellum pratense)

Meadow puffball

Vascellum pratense 255

Field mushroom

Agaricus campestris 160

Beech woodwart

Hypoxylon frugiforme 257

草黄菇 (Erichotoma lascivum)

Oak knight-cap

Erichotoma lascivum 62

Field bonnet

Mycena olivaceomarginata

134

带红色丝膜牛 (Cortinarius rubellus)

Foxy-orange web-cap

Cortinarius rubellus 72

星抱丝膜牛 (Inocybe asterospora)

Star-spored fibre cap

Inocybe asterospora 102

星抱乳菇 (Entoloma confereundum)

Star-spored pink-gill

Entoloma confereundum 110

Dotted stalk bolete

Suillus granulatus 200

色木耳 (Auricularia mesenterica)

Tape fungus

Auricularia mesenterica 230

Lactarius rufus 红乳菇 (Lactarius rufus)

Rufous Milk-cap 53

Stinking parasol

Leptista cristata 169

冠珊瑚菇 (Clavulina cristata)

Crested coral-fungus

Clavulina cristata 249

- St george's mushroom
Cutocybe gambosa 58
香菇(松茸)
Scented bracket
Citrophylum odoratum 222
夏红伞盖伞
Reddish fibre-cap
Inocybe erubescens 49
变色料伞
Grey-brown funnel-cap
Citocybe metachroa 34
变黑蜡伞
blackening wax-cap
Hygrocybe conica 104
白伞
White bonnet
Mycena pura 118
白蜡伞
Snowy wax-cap
Hygrocybe virginea 39
肉伞(小菇)
Camphor-scented milk-cap
Lactarius camphoratus 53
猪(猪)耳菇
Pig's ears
Peziza badia 266
土牛肝
Common earth fan
Thelephora terrestris 229
黄斑牛肝菌
Yellow staining russule
Russula puellaria 126
美丽牛肝菌
Pretty poison bolete
Boletus pulcherrimus 191
美味牛肝菌
Penny bun
Boletus edulis 187
乳白乳菇
Milk white russule
Russula delica 171
美洲松茸
White matsutake
Tricholoma magnivelare 81
夜毛兜伞
Weeping widow
Lactaria velutina 102
乳白乳菇
Fleecy milk cap
Lactarius vellereus 44
电音牛肝菌
Yellow-cracking bolete
Boletus subfomentosus 193
+画
肉伞(小菇)
White and red fibre-cap
Inocybe geodaei 99
夏菇
Summer truffle
Tuber aestivum 258
栗伞
Chestnut parasol
Leptota castanea 169
栗伞
Chestnut bolete
Gyroporus castaneus 194
栗伞多孔菌
Liver-brown polypore
Polyporus badius 204
栗伞暗孔菌
Pine dye polypore
Phaeolus schwenkii 220
栗伞
Brick tuft
Hypholoma sublateritium 87
抱子环锈伞
Alder scale head
Pholiotia atricola 91
母刺等伞
Razor-strop fungus
Piptoporus betulinus 212
栎树乳伞
Gill polypore
Lenzites betulina 227
何叶鹿菇伞
Clustered grey gill
Lycophyllum decastes 41
牛肝菌
Thumble cap
Verpa conica 209
晚季小菇
Late season bonnet
Mycena aranzachana 134
牛肝菌(小菇)
Stump puffball
Lycoperdon pyriforme 260
鹿马鞍
Common white saddle
Helveta crispa 207
皱褶拟羊肚菌
Common leather-bracket
Stereum rugosum 232
皱褶罗伞
Gypsy

- Rozites caperatus* 87
被盖囊皮菌
- Saffron powder-cap
Cystoderma amianthinum 97
胶质刺银耳
- Toothed jelly
Pseudohydnum gelatinosum 235
胶晶脉射菌
- Jelly bracket
Pilebia tremellosa 228
胶盘菌
- Pope's buttons
Bulgaria inquinans 271
脑上胶盘菌
- Brain-like jelly-disc
Ascrothemella faginea 283
脑上紫胶盘
- Brain purple drip
Ascocoryne sarcoides 272
臭小脑菇
- Foetid mummy-cap
Micromphale foetidum 139
臭脑菇
- Foetid russule
Russula foetens 121
V.
- The panther
Amanita pantherina 149
饭孔菌
- Funnel polypore
Coltricia perennis 206
铅色灰球菌
- Lead grey bovis
Bovista plumbea 255
高羊肚菌
- Black morel
Morella elata 210
高环柄菇
- Parasol mushroom
Macrolepiota procera 165
宽柄菇类
- Broad-gilled agaric
Megacollybia platyphylla 66
宽柄多孔菌
- Dryad's saddle
Polyporus squamosus 203
Jelly babies
- Leotia lubrica* 243
烟色管孔菌
- Smoky polypore
Herkeneria adusta 225
粉灰色囊皮菌
- Pink grey powder-cap
Cystoderma carcharias 97
粉灰紫伞
- Pink wax-cap
Hygrocybe calyptraeformis 103
Cellar fungus
- Coniophora puteana* 233
Cotton caterpillar fungus
- Paecilomyces farinosus* 244
Blackening bolete
- Boletus pulverulentus* 192
粉紫香菇
- Blue legs
Lepista personata 58
粉褶乳菇
- Willow milk-cap
Lactarius controversus 45
粉褶菌
- Aborted pink gill
Entoloma abortivum 253
秀球乳
- Cauliflower fungus
Sparassis crispa 252
十一画
- Red-dappled web-cap
Cortinarius bolaris 69
委红菇
- Bare-toothed russule
Russula vesca 125
柄柄金钱菇
- Spindle-shank
Collybia fusipes 111
Yellow-pored scaber-stalk
- Leccinum tessellatum* 195
Yellow-white bunnet
- Mycena flavoalba* 138
黄白红菇
- Yellow-ochre russule
Russula ochroleuca 123
黄色湿地红菇
- Yellow swamp russule
Russula claroflava 123
黄乳盘菌
- Yellow-milk cup
Peziza succosa 267

黄苍绿菇属

- Common hedgehog fungus
Hydnum repandum 238

蟹甲菇属

- Crab russule
Russula xerampetina 127

其他紫菇

- Indefinite-scented russule
Russula tincta 127

黄环丝膜菌

- Yellow-girdled web-cap
Cortinarius triumphans 75

黄环柄菇

- Yellow parasol
Leucoagaricus luteus 170

黄伞小菇

- Yellow-stemmed bonnet
Mycena epipterygia 135

嵌齿侧耳属

- Gemmed agaric
Amanita gemmata 149

拟绿头牛肝

- Deceiving knight-cap
Tricholoma sejunctum 63

黄斑侧耳

- Yellow-staining mushroom
Agaricus xanthoderma 159

黄地衣马勃

- Common earthball
Scleroderma citrinum 256

正褐柄牛肝

- Birch knight-cap
Tricholoma fulvum 64

蛇头乳

- Dog stinkhorn
Mutinus caninus 246

野丝膜菌

- Sheathed web-cap
Cortinarius torvus 74

野牛肝

- Horse mushroom
Agaricus arvensis 157

Scaly earth-tongue

- Geoglossum fallax* 242

假多孔菌

- Deceiving polypore
Hyphodontia paradoxa 232

假毒鹅膏

- False death cap
Amanita mappa 150

无茎环牛肝

- Ringless honey fungus
Armillaria tabescens 42

侧耳侧耳

- Beech bracket
Trametes gibbosa 223

侧耳小菇

- The miller
Clitopilus prunulus 41

猪苓

- Umbrella polypore
Polyporus umbellatus
202

拟绿头牛肝

- Verdigris russule
Russula aeruginea 125

锈柄牛肝

- Common cavalet
Melanoleuca polioleuca
65

丝绒草菇

- Silky volvar
Volvariella bombycina 154

假叶牛肝

- Purple leather-bracket
Chondrostereum purpureum
231

Silvery violet web-cap

- Cortinarius alboviolaceus*
73

寄生牛肝菌

- Parasitic bolete
Boletus parasiticus 194

寄生牛肝菌

- Pick a back toadstool
Asterophora parasitica 142

* 较细侧耳

- Straight coral fungus
Ramaria stricta 251

* 黄斑侧耳

- Golden chanterelle
Cantharellus luteocens 275

* 黄斑侧耳

- Liquorice milk-cap
Lactarius helvius 55



淡褐乳菇

Hazel milk-cap

Lactarius hortensis 48

深凹杯伞

Common funnel-cap

Clitocybe gibba 31

粒状大团囊菌

Granulated hart's truffle

Elaphomyces granulatus

259

粗毛针孔菌

Shaggy polypore

Inonotus hispidus 221

粘环鳞伞

Beech-litter scale-head

Pholiota lenta 92

粘胶角菌

Jelly antler

Calocera viscosa 250

粘盖牛肝菌

Jersey cow bolete

Suillus bovinus 200

粘盖草菇

Stubble-field volvar

Volvariella gloiocephala

155

粘绿乳菇

Slimy milk-cap

Lactarius blennius 47

粘锈耳

Soft slipper

Crepidotus mollis 183

鹿花菌

False morel

Gyromitra esculenta 208

鹿角炭角菌

Candle-snuff fungus

Xylaria hypoxylon 248

绯红蜡伞

Scarlet wax-cap

Hygrocybe coccinea 105

绵毛盖多孔菌

Sheep polypore

Albatrellus ovinus 202

绿丛枝菌

Greening coral-fungus

Ramaria abietina 250

绿红菇

Green russule

Russula virescens 131

绿色粉褶菇

Green pink-gill

Entoloma incanum 144

绿杯盘菌

Green stain

Chlorociboria aeruginascens

269

隆纹黑蛋巢菌

Fluted bird's nest

Cyathus striatus 274

十二画

雅致丝膜菌

Elegant web-cap

Cortinarius elegantissimus

77

斑金钱菌

Spotted tough-shank

Collybia maculata 67

斑点红褶伞

Freckled flame-cap

Gymnopilus penetrans 94

斑粘伞

Weeping slime-veil

Limacella guttata 164

斑粘盖牛肝菌

Variegated bolete

Suillus variegatus 201

斑褶锈蘑

Fleck-gill knight-cap

Tricholoma sciodes 60

棒柄杯伞

Club-footed funnel-cap

Clitocybe clavipes 40

棒瑚菌

Giant club

Clavariadelphus pistillaris

241

棕灰锈蘑

Grey knight-cap

Tricholoma terreum 59

硫黄色锈蘑

Gasworks knight-cap

Tricholoma sulphureum 64

硫黄菌

Chicken-of-the-woods

Laetiporus sulphureus 215

硬皮地星

Barometer earthstar

Astrucius hygrometricus 278

硬柄小皮伞

Fairy ring champignon

Marasmius oreades 117

翘鳞环锈伞

Shaggy scale-head

Pholiota squarrosa 79

葡萄色顶枝珊瑚菌

Pink-tipped coral-fungus

Ramaria botrytis 251

葱柄蜜环菌

Fine-scaly honey fungus

Armillaria cepistipes 80

裂丝盖伞

Straw-coloured fibre-cap

Inocybe rimosa 100

裂拟连孔菌

Thin maze-gill

Daedaleopsis confragosa 227

裂盖红牛肝菌

Red-cracking bolete

Boletus pascuus 192

裂褶菌

Split-gill fungus

Schizophyllum commune

181

蛛丝盘革菌

Orange disc-skin

Aleurodiscus amorphus 273

喇叭陀螺菌

Orange pig's ear

Gomphus floccosus 276

喇叭鸡油菌

Trumpet chanterelle

Cantharellus tubaeformis 30

晶粒鬼伞

Glistening ink-cap

Coprinus micaceus 176

紫丁香蘑

Wood blewit

Lepista nuda 57

紫红丝膜菌

Red and olive web-cap

Cortinarius rufoolivaceus 76

紫色多孔菌

Purple-dye polypore

Hapalopilus rutilans

213

紫绒丝膜菌

Violet web-cap

Cortinarius violaceus 71

紫粉褶菌

Porphyry pink-gill

Entoloma porphyrophaeum

69

紫晶蜡蘑

Amethyst deceiver

Laccaria amethystina 115

紫棒囊菌

Large purple-drop

Ascocoryne cylichnium 272

紫螺菌

Beech jelly-disc

Neobulgaria pura 271

紫蘑菇

Porphyry mushroom

Agaricus porphyrius 163

锈黄乳菇

Yellow-staining milk-cap

Lactarius theiogalus 50

锐鳞环柄菇

Sharp-scaled parasol

Lepiota aspera 167

稀褶乳菇

Distant-gilled milk-cap

Lactarius hygrophoroides

52

腥乳菇

Liver milk-cap



Lactarius hepaticus 51

绿盖牛肝菌

Spindle-stemmed bolete

Boletus appendiculatus 188

十三画

辐射状纤孔菌

Alder bracket

Inonotus radiatus 221

靴状金钱菌

Wood woolly-foot

Collybia peronata 113

蒜叶小皮伞

Wood garlic mummy-cap

Marasmius alliaceus 114

蓝空柄牛肝菌

Cornflower bolete

Gyroporus cyanescens 195

蓝绿球盖菇

Blue-green slime-head

Stropharia cyanea 88

蓝黄红菇

Charcoal burner

Russula cyanoxantha 124

黑木耳

Jew's ear

Auricularia auricula-judae

281

黑毛桩菇

Velvet roll-rim

Tapinella atrotomentosus

182

黑白鬼伞

Magpie ink-cap

Coprinus picaceus 175

黑红菇

Blackening russule

Russula nigricans 122

黑耳

Black brain-fungus

Exidia glandulosa 283

黑孢块菌

Perigord truffle

Tuber melanosporum 258

黑轮层炭壳

Cramp balls

Daldinia concentrica 257

黑栓齿菌

Black tooth

Phellodon niger 236

黑喇叭菌

Horn of plenty

Craterellus cornucopioides

275

黑紫红菇

Blackish-purple russule

Russula undulata 130

黑蓝小菇

Serrated bonnet

Mycena pelianthina 118

黑鳞活蘑

Dark-scaled knight-cap

Tricholoma atrosquamosum

60

黑鳞蘑菇

Dark-scaled mushroom

Agaricus moelleri 160

暗毛丝盖菌

Torn fibre-cap

Inocybe lacera 101

暗蓝光盖伞

Blue-rimmed liberty-cap

Psilocybe cyaneuscent 107

暗蓝粉褶菌

Steel-blue pink-gill

Entoloma nitidum 110

暗褐乳菇

Sooty milk-cap

Lactarius fuliginosus 48

蛹虫草

Orange caterpillar-fungus

Cordyceps militaris 244

微黄拟锁瑚菌

Yellow spindles

Clavulinopsis helvola 240

矮地星

Dwarf earthstar

Geastrum schmidelii 279

鼠尾小孢菌

Cone-cap

Baeospora myosura 132

裸盖菇

Liberty cap

Psilocybe semilanceata 141

十四画

赫活囊蕈

Ochre-gilled cavalier

Melanoleuca cognata 65

管棍菌

Pipe club

Macrotyphula fistulosa 241

瘦脐菇

Orange navel-cap

Rickenella fibula 36

蜜色粉褶菌

Honey-coloured pink-gill

Entoloma cetratum 109

蜜环丝膜菌

Red-banded web-cap

Cortinarius armillatus 72

蜜环菌

Honey fungus

Armillaria mellea 80

褐云斑鹅膏菌

Porphyry false death cap

Amanita porphyria 151

褐赤刺革菌

Rigid leather-bracket

Hymenochaete rubiginosa

231

褐环乳牛肝菌

Slippery jack

Suillus huteus 198

褐虎柄牛肝菌

Brown birch scaber stalk

Leccinum scabrum 196

褐盖牛肝菌

Bay bolete

Boletus badius 188

褐盖粉褶菌

Woodland pink-gill

Entoloma rhodopolium 68

褐黄金钱菌

Russet tough-shank

Collybia dryophila 111

褐黄鹅膏菌

Orange grisette

Amanita crocea 153

褐黑铍蘑

Borat knight-cap

Tricholoma ustale 62

辣红菇

Lemon-gilled russule

Russula sardonia 131

十五画及以上

橄榄褶乳菇

Ugly milk-cap

Lactarius necator 47

赭红拟铍蘑

Plums-and-custard

Tricholomopsis rutilans 66

赭盖鹅膏菌

The blusher

Amanita rubescens 147

赭绿鳞伞

Ochre-green scale-head

Pholiota gummosa 92

墨汁鬼伞

Common ink-cap

Coprinus atramentarius 175

薄黄鸡油菌

Smooth chanterelle

Cantharellus lateritius 276

橘色小双孢盘菌

Lemon disc

Bisporella citrina 273

橘黄裸伞

Giant flame-cap

Gymnopilus junonius 83

橘红光柄菇

Flame shield-cap

Pluteus aurantiorugosus 173

橙色疣柄牛肝菌

Orange birch bolete

Leccinum versipelle 197

橙色粘质丝膜菌

Orange slime web-cap

Cortinarius mucosus 75

橙盖小菇

Orange-capped bonnet

Mycena acicula 137

橙盖鹅膏菌

Caesar's mushroom

Amanita caesarea 145

橙黄小菇

The stainer

Mycena crocata 119

橙黄阿孢盘菌

Orange-peel fungus

Aleuria aurantia 268

橙黄球盖菇

Orange slime-head

Stropharia aurantiaca 88

橙黄褐韧伞

Conifer tuft

Hypholoma capnoides 86

雕纹铍蘑

Yellow-staining knight-cap

Tricholoma sculpturatum 59

糙质毛皮伞

Shaggy-foot mummy-cap

Crinipellis scabella 142

褶纹鬼伞

Little japanese umbrella

Coprinus plicatilis 177

簇状黄韧伞

Sulphur tuft

Hypholoma fasciculare 86

黏小奥德蘑

Porcelain fungus

Oudemansiella mucida 79

鳞丝膜菌

Scaly web-cap

Cortinarius pholideus 70

鳞皮扇菇

False oyster

Panellus stypticus 181

鳞柄白毒鹅膏

Destroying angel

Amanita virosa 150

鳞柄裸盖菇

Scaly-stalked psilocybe

Psilocybe squamosa 84

鳞盖肉齿菌

Blue-footed scaly-tooth

Sarcodon scabrosus 237